

タイラン水溶散（腐蛆病予防薬）が使いやすくなります

- ❁ 代用花粉に混ぜる投与方法（代用花粉投与）でも、捨て蜜が不要になります。
- ❁ これまでどおり、投与期間中に貯まった蜜は出荷できません。
ただし、今までどおり次のことは守ってください
 - ・ 用法用量を厳守してください
 - ・ 育児箱に使ってください
 - ・ 本剤を投与した育児箱内のはちみつ、ローヤルゼリーは食用にはできません（抗生物質が残留している恐れがあるため）
 - ・ 腐蛆病の治療は出来ません（発生したら家畜保健衛生所に速やかに通報してください）



詳しくは裏面

腐蛆病とは・・・

腐蛆病は蜜蜂の子（蛹と幼虫）が腐る病気です。原因は細菌で、アメリカ腐蛆病とヨーロッパ腐蛆病があり、家畜伝染病予防法で家畜（法定）伝染病に指定されています。タイラン水溶散はアメリカ腐蛆病の予防薬として承認を受けている動物用医薬品です。

アメリカ腐蛆病（原因菌：Paenibacillus larvae）

- ・ 感染した幼虫は、蛹になるために巣房に蓋がされた後に死ぬことが多い。
 - ・ 死んだ幼虫は原因菌によって分解され、ネバネバとした状態になり、色が次第に茶色から黒色へと変化する。
 - ・ 巣房の蓋は黒ずみ、張りを失ってへこみ、膠（にかわ）臭がする。
- ※膠：木竹工芸の接着剤に使用される動物の骨，皮，腱などから抽出したゼラチンを主成分とする物質。

神奈川県湘南家畜保健衛生所

〒259-1215 平塚市寺田縄 345

TEL 0463-58-0152 FAX 0463-58-5679

養蜂農家の皆様へ



タイラン水溶散が使いやすくなります



代用花粉に混ぜる投与方法(**代用花粉投与**)でも、**捨て蜜が不要**になります。


投与方法は2とおりです

代用花粉投与

タイラン水溶散200 mgを代用花粉250 gに
混ぜて巣箱に設置
(成虫の数に関わらない)

粉糖投与

成虫1万匹あたりタイラン水溶散50 mgを
粉砂糖 5 gに混ぜて巣箱の上から散布
(成虫の数で調整が必要)



注意点

これまでどおり、投与期間中に貯まった蜜は出荷できません。

正しく使って残留事故を防ぎましょう！