

第5節 光化学オキシダント (O_x)

**光 化 学
オキシダント** 光化学オキシダントは、オゾン (O₃)、パーオキシアセチルナイトレート (PAN) など酸化性物質の総称であり、大気中の窒素酸化物 (NO_x) と炭化水素 (HC) が光化学反応して生成する。

光化学反応生成物としては、このほかにもホルムアルデヒド (HCHO)、アクロレイン (CH₂CHCHO) などの還元性物質や無水硫酸 (SO₃)、二酸化窒素 (NO₂) などがあるが、これらは含めない。

光化学スモッグ 光化学スモッグは、特殊な気象条件下で光化学反応生成物がエアロゾル（煙霧質）等となり発生するスモッグ (Smoke + Fog → Smog) のことである。したがって、光化学スモッグ中には、光化学オキシダントだけでなく、他の光化学反応生成物もすべて含まれることになる。

環 境 濃 度 県内のO_x濃度は、昼間の日最高1時間値の全局平均値でみると、最近10年間では、ほぼ横ばいである。環境基準は全測定期局(61測定期局)で達成していない。平成19年度の注意報発令日数は20日間であった。


気 象 条 件 光化学スモッグは、春(4月)から発生し、6、7、8月に多い。日射が強く、気温が高く、大気が上空へ拡散されにくい風の弱い日に多く発生する。特に、日中に陸風や東京湾海風、相模湾海風がぶつかり合う風の弱い地域でO_xが高濃度となることが多い。

測 定 方 法 吸光光度法、紫外線吸収法による。環境大気の測定では、吸光光度法で得られたO_x濃度と紫外線吸収法によるO₃濃度ときわめてよく一致する。このため、O₃濃度とO_x濃度は同等に扱う。

吸 光 光 度 法 試料大気を2%中性ヨウ化カリウム溶液中に通すと、ヨウ化カリウムが酸化されてヨウ素を遊離し呈色することを利用してO_x濃度を測定する。

紫外線吸収法 試料大気中のO₃が吸収する紫外線を照射し、透過光の紫外線強度を測定することによってO₃濃度を測定する。

5. 1 O_x 濃度の地域分布（一般環境大気測定局の昼間の日最高 1 時間値の年平均値）




数値は、一般環境大気測定期局で測定されたO₃の昼間の日最高1時間値の年平均値を示している。ここでいう「昼間」とは5時から20時までの時間帯をいう。

県内でのO₃濃度は、相模湾と東京湾から吹く海風が互いにぶつかる三浦半島から横浜内陸部にかけて高くなっている。

環境基準は全測定期で達成しなかった。(環境基準はp. 4、p. 5参照)


5. 2 O_x濃度の推移（昼間の日最高1時間値の年平均値）

一般環境大気測定局で測定したO_xの昼間の日最高1時間値の年平均値から求めた全局の平均値、最高値、最低値を図及び表に示す。



5. 3 O_xの月別濃度（昼間の日最高1時間値の月平均値）


一般環境大気測定局で測定したO_xの昼間の日最高1時間値の月平均値から求めた全局の平均値、最高値、最低値を図及び表に示す。



月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
最高値 (ppm)	0.068	0.080	0.063	0.064	0.075	0.052	0.052	0.038	0.035	0.034	0.044	0.058
最低値 (ppm)	0.044	0.052	0.041	0.034	0.042	0.029	0.029	0.017	0.011	0.017	0.022	0.038
平均値 (ppm)	0.056	0.066	0.055	0.051	0.058	0.042	0.043	0.031	0.025	0.028	0.037	0.050

5. 4 O_xの曜日別濃度（昼間の1時間値の年平均値）


O_x濃度の年間測定結果から曜日別に求めた一般環境大気測定局の全局平均値を図及び表に示す。



曜日別にみた昼間の1時間値の年平均値では、土・日曜日の濃度がやや高くなっています。他のNO_x、SPM、NMHC等の曜日変化とは逆の関係がみられます。

5. 5 O_xの時刻別濃度（局最高1時間値の全局平均値）

一般環境大気測定局で測定したO_x濃度の年間測定結果から時刻別に求めた最高1時間値を全局で平均したものと図及び表に示す。



時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
一般環境大気 (ppm)	0.068	0.066	0.066	0.064	0.064	0.061	0.059	0.061	0.064	0.075	0.092	0.111	0.132	0.144	0.144	0.126	0.116	0.104	0.090	0.081	0.077	0.073	0.071	0.069
時刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
一般環境大気 (ppm)	0.132	0.144	0.139	0.126	0.116	0.104	0.090	0.081	0.077	0.073	0.071	0.069												

日射が強く、気温の高い日中に濃度が高くなっている。


また、日中は陸風や東京湾海風や相模湾海風がぶつかり合うため高くなる。

夜間から早朝にかけては自動車排出ガスのNOによって分解されて低濃度となる。

昭和50年以前は、炭化水素濃度が高かったことからO_x生成速度が速く、東京湾海風が進入する午前中に川崎、横浜臨海部でO_xの高濃度がみられたが、最近では、炭化水素濃度が低濃度となつたためO_x生成速度は遅くなり、午前中に高濃度となることは少なくなった。

5. 6 O_xの地域別濃度（昼間の1時間値の年平均値）

一般環境大気測定局で測定した昼間の1時間値の年平均値を地域別に平均して求めたものを図及び表に示す。




地域別にみた昼間の1時間値の年平均値は、12年度までは横須賀及び横浜地域が他に比べ高い傾向にあった。しかし、13年度以降は、横浜地域、川崎地域及び横須賀地域の3地域の差が小さくなってきた。

年度	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
横浜 (ppm)	0.026	0.027	0.026	0.024	0.023	0.025	0.026	0.026	0.026	0.027
川崎 (ppm)	0.022	0.023	0.021	0.024	0.024	0.025	0.027	0.027	0.027	0.028
横須賀 (ppm)	0.030	0.029	0.027	0.028	0.027	0.027	0.028	0.028	0.029	0.030
その他 (ppm)	0.021	0.022	0.022	0.023	0.022	0.024	0.024	0.025	0.027	0.029

5. 7 O_x濃度の推移（年平均値）

一般環境大気測定局で測定したO_xの1時間値の年平均値から求めた全局の平均値、最高値、最低値を図及び表に示す。



年平均値は、平成15年頃からやや上昇傾向が見られる。

年度	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
最高値 (ppm)	0.030	0.031	0.028	0.030	0.028	0.027	0.030	0.029	0.030	0.031
最低値 (ppm)	0.012	0.012	0.013	0.014	0.014	0.014	0.015	0.016	0.017	0.019
平均値 (ppm)	0.021	0.021	0.021	0.021	0.020	0.021	0.022	0.022	0.023	0.024
測定局数	56	57	56	56	57	60	60	61	61	62

5. 8 ○×濃度の測定局順位

各一般環境大気測定局における昼間の日最高1時間値の年平均値の順位と共に、1時間値の最高値及び1時間値が0.12ppm以上（光化学スモッグ注意報発令基準値）を示した日数を示す。

順位	局名	昼間の日最高1時間値の年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.12ppm以上を示した日数	前3年度順位		
		(ppm)	(ppm)		18	17	16
1	横須賀市西行政センター	0.052	0.137	4	3	6	2
1	小田原市役所	0.052	0.179	10	27	14	40
3	平塚市旭小学校	0.051	0.169	6	19	19	19
4	座間市役所	0.050	0.182	10	6	53	56
4	藤沢市役所	0.050	0.159	6	6	6	7
4	藤沢市明治市民センター	0.050	0.171	7	4	2	5
4	秦野市役所	0.050	0.140	8	34	53	54
4	伊勢原市役所	0.050	0.163	7	1	24	40
9	緑区三保小学校	0.049	0.159	7	1	2	5
9	厚木市役所分庁舎	0.049	0.155	7	11	9	31
9	南足柄市生駒	0.049	0.134	3	52	39	48
12	南区横浜商業高校	0.048	0.148	10	19	33	15
12	高津区生活文化会館	0.048	0.170	13	6	9	2
12	宮前平小学校	0.048	0.162	10	6	9	1
12	横須賀市追浜行政センター	0.048	0.156	7	27	33	31
12	逗子市役所	0.048	0.137	4	19	39	25
12	平塚市神田小学校	0.048	0.165	5	14	24	40
18	金沢区長浜	0.047	0.153	5	14	19	19
18	港南区野庭中学校	0.047	0.151	4	27	19	7
18	登戸小学校	0.047	0.143	8	19	2	7
18	麻生区弘法松公園	0.047	0.181	7	48	1	25
18	三浦市三崎中学校	0.047	0.111	0	37	24	40
18	愛川町角田	0.047	0.133	4	34	39	40
18	平塚市役所	0.047	0.153	7	43	39	48
25	保土ヶ谷区桜丘高校	0.046	0.144	5	57	36	25
25	瀬谷区南瀬谷小学校	0.046	0.140	5	11	14	15
25	泉区総合庁舎	0.046	0.139	5	14	28	31
25	幸スポーツセンター	0.046	0.166	9	48	39	-
25	中原区役所保健福祉センター	0.046	0.154	9	27	24	25
25	横須賀市衣笠行政センター	0.046	0.119	0	14	14	12
25	鎌倉市役所	0.046	0.147	3	34	59	53
25	相模原市橋本	0.046	0.171	6	27	19	19
33	西区平沼小学校	0.045	0.148	8	43	28	23
33	栄区上郷小学校	0.045	0.136	3	48	9	2
33	横須賀市久里浜行政センター	0.045	0.128	1	14	28	15
33	相模原市相模台	0.045	0.166	2	19	9	7
33	平塚市花水小学校	0.045	0.180	6	6	39	-
33	藤沢市御所見小学校	0.045	0.149	6	27	28	12
39	都筑区総合庁舎	0.044	0.179	9	11	14	15
39	横須賀市役所	0.044	0.133	1	37	28	31
39	大和市役所	0.044	0.157	3	59	57	55
39	海老名市役所	0.044	0.122	2	37	50	48
39	藤沢市湘南台文化センター	0.044	0.146	3	19	14	52
39	茅ヶ崎市役所	0.044	0.155	5	27	57	57
45	中区本牧	0.043	0.149	5	52	48	25
45	川崎市公害監視センター	0.043	0.187	7	37	33	19
45	田島養護学校	0.043	0.209	8	43	36	40
45	津久井中野	0.043	0.111	0	54	50	37
49	鶴見区生麦小学校	0.041	0.169	5	48	39	31
49	神奈川区総合庁舎	0.041	0.168	4	55	50	40
49	磯子区総合庁舎	0.041	0.150	2	57	39	40
49	戸塚区汲沢小学校	0.041	0.111	0	4	6	12
49	旭区鶴ヶ峰小学校	0.041	0.126	4	19	2	7
49	川崎区役所大師分室	0.041	0.179	4	43	36	31
49	相模原市役所	0.041	0.143	1	43	55	25
49	相模原市田名	0.041	0.154	3	55	55	48
57	青葉区総合庁舎	0.040	0.149	5	19	19	23
58	鶴見区潮田交流プラザ	0.039	0.181	4	37	39	37
59	綾瀬市役所	0.038	0.112	0	61	60	57
60	神奈川県庁	0.036	0.134	3	59	60	59
61	港北区総合庁舎	0.036	0.147	3	37	48	37

5. 9 全国における光化学スモッグ注意報等発令日数の推移

年度 都府県	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
宮城									1			1							
福島												3		1		2	1	1	
茨城	5	21	19	14	7	14	16	10	9	5	11	23	12	13	14	18	13	10	15
栃木	3	7	5	19	2	10	2	6	4	4	9	21	15	11	8	7	14	8	16
群馬	3	12	2	9	8	18	16	18	8	6	4	16	6	15	2	15	10	5	8
埼玉	6	25	14	19	4	19	13	10	16	12	18	40	30	21	19	23	26(1)	16	32
千葉	6	17	20	19	6	14	22	6	13	8	9	18	23	21	11	28	28	11	17
東京	7	23	15	14	5	12	19	6	11	11	5	23	23	19	8	18	22	17	17
神奈川	3	12	12	14	9	15	13	7	4	10	4	10	13	11	6	16	7	14	20
新潟																		1	
山梨	4	23	9	20	7	8	5	4	2	7	6	14	13	12	5	5	9	12	15
静岡	7	6	2	3	8	2	3	4	6	2	9	6	4	1	5	9	9	7	
岐阜												4	3		3	1	4	2	
愛知		2	1		1			1						1		1	2	5	
三重	1	10	1	4		9	2	1	1	2	1	9	4		1	1	2	2	
富山							1							1	2			1	
福井		3												1					
滋賀	4	5	3	9	1		1			1	2	3	6	4	2	2	7	6	5
京都	2	6	7		1			1	1	3	1	3	1	5	3	7	7	10	
大阪	10	27	8	11	11	15	8	10	3	25	11	23	20	11	14	10	10	17	11
兵庫	2	7	4	1	4	13	3	4	2	4	7	17	5	8	7	6	9	8	4
奈良	2	6			1		3			1	8	2	5	2	5	7	3		
和歌							1	1	1	1	2	1	1			1	1		
岡山	1	8		1	2	6	6	3	4	4	2	1	2	3	1	1	8	6	
広島	3	14	1			9	3	6	4	15	3	8	5	9	4	13	8	9	6
山口												2	1	5	4	1	3	1	2
徳島							3	2	3	6	3	2	2	1	1	3	1	3	
香川	1																	1	
愛媛	3			1	1			3	1	1				1	1			3	
福岡								1	1									4	
長崎																	1	3	
熊本																	1	4	
大分																		1	
計	63	242	121	164	71	175	139	99	95	135	100	259	193	184	108	189	185(1)	177	220

※ () 内は警報発令日数（内数）

(出典：環境省平成19年光化学大気汚染関係資料)

5. 10 全国における被害届出者数の推移

年度 都府県	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
宮城												1149							
福島												104							
茨城													140						
栃木													13						
群馬														5					
埼玉	3	36	4			58				22	1	5	466	218	3	883	36	4	
千葉	3	315	11			197	16	3		311	23	1	46	290	1	71	13	1	
東京	16	4	103			183	5	3		333		16	52	410	12	159	247	2	
神奈川	2	1007	205	3	53	46	1		7	48	1	124	17	4	276	199	4		
山梨		4				69			104	3	18	54							
静岡			9	89			5	237	7			9				3	204		
愛知															2		771		
岐阜			9		53		4		52			48				9		3	
三重														6					
福井																352			
新潟																			
京都	13		3			1		45		2	161	55	2	4	1	3	41		
大阪	5									209			38						
兵庫																			
奈良																			
岡山																	26	3	
広島																		1	
愛媛																	513		
福岡																	28		
長崎																	3		
熊本																			
計	35	58	1454	307	93	564	192	64	315	1270	402	1479	343	1347	254	393	1495	289	1910

(出典：環境省平成19年光化学大気汚染関係資料)

