



# 防除情報(病害虫情報 号外 第3号)

平成28年5月31日  
神奈川県農業技術センター

## 果樹加害性カメムシ類の誘殺数が増加中 ウメ・ナシ・キウイフルーツへの加害に注意！

- 本年4月に、7月までの被害はやや少ないと予想していましたが(防除情報(病害虫情報 号外 第1号)平成28年4月1日発表)、その後の状況をお知らせします。
- フェロモントラップや予察灯へ誘殺されるチャバネアオカメムシ成虫の数が、5月上中旬から増加しており、多くの調査地点で平年よりも多くなっています(図1、2)。なお、今後の最新の状況は、当所のホームページで確認してください。



### 防除のポイント

☆園によって飛来状況が異なるので、園内外を注意深く見回り、発生を認めたら直ちに防除を行う。

☆防除薬剤は病害虫情報等を参考にし使用する。

☆カメムシは園外から飛んで来るため、物理的な防除法(防虫ネットの設置、袋掛け、忌避灯の早期点灯など)と組み合わせた防除対策を行う。

病害虫防除部 TEL 0463 - 58 - 0333

インターネット <http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f450002/>

○ 農業使用の際は、必ずラベルの記載事項を確認し、使用基準を遵守するとともに飛散防止に努めましょう。