

カミキリムシ科 Cerambycidae

深田晋一¹⁾・高桑正敏²⁾

Shin-ichi Fukada & Masatoshi Takakuwa

要約

甲虫の種数の多い科の中ではもっともよく調査されている群で、神奈川県は従来 290 種が記録されてきた(平野, 2004 とその後の知見による)。ただし、この数は外来種(国内からの外来種を含む)を含んでおり、自然分布と考えられるものは 272 種程度である。

丹沢山地としては以下に挙げた 252 種(確実な外来種 3 種を含む)が知られる。これらはブナ帯に生息するものが大部分であるが、一部にはシイ・カシ帯の要素も含まれている。今回の丹沢大山総合調査によって新たに 2 種(フタスジカタビロハナカミキリとタケウチホソハナカミキリ)が追加されたように、今後の調査によってはなお丹沢山地から未知の種が発見されるかもしれない。一方で、キベリカタビロハナカミキリのように過去に多数記録されながら、今回の調査でも確認できなかった種もいくつかある。これら衰亡の可能性のあるものについては、生息状態の把握が急務と思われる。

なお、前回総合調査に基づく「丹沢大山自然環境総合調査報告書」(露木ほか, 1997)以降に丹沢産カミキリとして 13 種が追加された。追加種は以下の通り。

ベーツヒラタカミキリ *Eurypoda (Neoprion) batesi* Gahan
 フタスジカタビロハナカミキリ *Brachyta bifasciata japonica* (Matsushita) (県新)
 タケウチホソハナカミキリ *Strangalia takeuchii* Matsushita et Tamanuki (県新)
 アオスジカミキリ *Xystrocera globosa* (Olivier)
 タイワンメダカカミキリ *Stenomachus taiwanus* Matsushita
 クロツヤヒゲナガコバネカミキリ *Glaphyra hattorii* (Ohbayashi)
 クビアカトラカミキリ *Xylotrechus rufilius rufilius* Bates
 ムネマダラトラカミキリ *Xylotrechus grayii grayii* (White)
 クリチビカミキリ *Sybra (Microzotale) kuri* Ohbayashi et Hayashi
 ミヤマチビコブカミキリ *Miccolamia (Isomiccolamia) glabricula glabricula* Bates
 クリイロチビケブカカミキリ *Terinaea atrofusca* Bates (県新)
 イボタサビカミキリ *Sophronica obrioides* (Bates)
 シナカミキリ *Eutetrappa sedecimpunctata* (Motschusky)

凡例

1. 種の配列は原則として平野 (2004) に従った。
2. 調査における現地採集データについては文中に個体数、採集地、採集日、採集者の順に示した。また各採集データに該当する標本はすべて神奈川県立生命の星・地球博物館に収蔵されている。
3. 文献のデータはおおむね平野 (2004) に依拠し、それ以降の文献の収集についても平野幸彦氏のお力をお借りした。
4. 調査対象地域の範囲は基本的には丹沢大山自然環境総合調査報告書 (1997) と同じであるが、愛川町の経ヶ岳、仏果山、高取山、津久井町の仙洞寺山を範囲に含める一方、秦野市の震生湖、渋沢丘陵、栲窪、山北町の畑と峠、津久井町の青山を範囲外とした。
5. それぞれの種におけるデータの配列の順序もおおむね平野 (2004) に従い、採集地の市町村に基づいて愛川町、厚木市、伊勢原市、津久井町、山北町、松田町、秦野市、清川村の順とした。ただし市町村の境界上に位置する地名(山や峠等)については、できるだけ地図上の近隣地域と連続して配列されるように工夫した。
6. 市町村界上に位置する山や峠は全て主稜線上に並んでいる。以下に列記する。
(県西端部より北東方面へ) 三国山→鉄砲木ノ頭→切通峠→高指山→大棚ノ頭→菰釣山→加入道山→大室山→犬越路→大箕→熊笹ノ峰→檜洞丸→白ヶ岳→蛭ヶ岳→鬼ヶ岩ノ頭→棚沢ノ頭→不動ノ峰→丹沢山→竜ヶ馬場→塔ノ岳→鍋割山

ホソカミキリ亜科 Disteniinae

ホソカミキリ *Distenia gracilis gracilis* (Blessig)
 愛川町高取山(苧部ほか, 1999); 厚木市七沢(猪又, 1968); 厚木市七沢不動尻(平野ほか, 2006); 大山山頂(平野ほか, 2006); 津久井町鳥屋奥野林道水沢橋(有井・守屋, 2004); 津久井町鳥屋早戸川伝道(有井・守屋, 2004); 津久井町音久和(露木ほか, 1981); 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上(有井・守屋, 2004); 山北町大石山(小林・山口, 1972); 山北町熊木沢(露木ほか, 1981); 山北町箒沢(露木ほか, 1981); 山北町皆瀬川(東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 清川村札掛(守屋, 1994b); 蛭ヶ岳(露木ほか, 1981)。

ノコギリカミキリ亜科 Prioninae

ベーツヒラタカミキリ *Eurypoda (Neoprion) batesi* Gahan
 シイ・カシ帯の代表的な要素であり、県内では海岸近くでの採集例が多い。とくにスダジイの古木・枯死木に依存することから、内陸部でもスダジイ林があれば発見される可能性があり、調査範囲からはわずかに外れるが愛川町八菅山でも記録されているほか、伊勢原市の記録もある。
 秦野市堀西(館野, 2004); 秦野市堀川(館野, 2004)。
 ウスバカミキリ *Megopis (aegosoma) sinica sinica* (White)
 津久井町鳥屋伊勢沢林道(有井・守屋, 2004); 津久井町鳥屋早戸川林道三日月橋(有井・守屋, 2004); 津久井町神ノ川林道矢駄沢橋(有井・守屋, 2004); 犬越路(露木ほか, 1981); 山北町白石沢(露木ほか, 1997); 山北町西丹沢自然教室(露木ほか, 1997); 山北町棚沢(露木ほか, 1981); 山北町皆瀬川(東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 山北町舟沢(西, 1997)。
 ノコギリカミキリ *Prionus insularis* Motschulsky
 厚木市七沢(高橋, 1987); 大山山頂(平野ほか, 2006); 津久

1) 神奈川県昆虫談話会 2) 神奈川県立生命の星・地球博物館

井町鳥屋松茸山（守屋，1994b）；津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋，2004）；津久井町青根長者舎（有井・守屋，2004）；山北町箒沢（露木ほか，1981）；山北町水ノ木林道（露木ほか，1997）；山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班，1972）；秦野市弘法山（露木ほか，1997）；清川村札掛（守屋，1994b）；清川村堂平（露木ほか，1997）；1ex.，丹沢山～竜ヶ馬場，5. VIII. 2006，藤田裕採集。

ニセノギリカミキリ *Prionus sejunctus* Hayashi

東丹沢（露木，1985b）；山北町中川（露木ほか，1997）。

コバネカミキリ *Psephactus remiger remiger* Harold

津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋，2004）；津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋，2004）；犬越路（露木ほか，1981）；山北町箒沢（木下，1981）；山北町地藏平（露木ほか，1997）；山北町大門沢（西，1997）；1ex.，鍋割山（南丹沢），16. VII. 2005，松原豊採集；清川村札掛（守屋，1994b）；清川村堂平（露木ほか，1997）；蛭ヶ岳（露木ほか，1981）。

クロカミキリ亜科 Spondyliinae

クロカミキリ *Spondylis buprestoides* (Linnaeus)

愛川町経ヶ岳（苅部ほか，1999）；厚木市七沢山の神（平野ほか，2006）；伊勢原市日向（上田，1986）；津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋，2004）；津久井町青根（小林・山口，1972）；1ex.，山北町ゴーラ沢～檜洞丸，1. VIII. 2004，川上翔平採集；山北町箒沢（露木ほか，1997）；丹沢湖（露木ほか，1981）；山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班，1972）；山北町大門沢（西，1997）；山北町山北キャンプ場（露木ほか，1997）；清川村煤ヶ谷（露木ほか，1997）；清川村宮ヶ瀬（露木ほか，1997）；清川村札掛（中村，1964）；1ex.，清川村堂平，31. VII. 2005，藤田裕採集；1ex.，丹沢山頂，22. VII. 2005，深田晋一採集；塔ノ岳（相模原市立博物館，2001）。

オオクロカミキリ *Megasemum quadricostulatum* Kraatz

ブナ帯に生息し、モミなどマツ科針葉樹に依存するため、その衰退が著しい稜線部などでは生息が危ぶまれる。

大山下社（露木ほか，1997）；山北町西丹沢自然教室（露木ほか，1997）；1ex.，山北町ゴーラ沢～檜洞丸，1. VIII. 2004，川上翔平採集；清川村札掛（露木ほか，1981）；清川村堂平（露木ほか，1997）；1ex.，西峰（太礼ノ頭）～丹沢山頂，1. VIII. 2005，深田晋一採集；清川村天王寺尾根（露木ほか，1981）。

ツシムムナクボカミキリ *Cephalallus unicolor* (Gahan)

愛川町高取山（苅部ほか，1999）；厚木市七沢（平野ほか，2006）；大山山頂（平野ほか，2006）；津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋，2004）；1ex.，加入道山～大室山，30. VII. 2005，高橋和弘採集；山北町西丹沢自然教室（露木ほか，1997）；山北町箒沢（木下，1981）；山北町大門沢（西，1997）；清川村堂平（露木ほか，1997）；1ex.，丹沢山頂，2. VIII. 2005，深田晋一採集。

サビカミキリ *Arhopalus coreanus* (Sharp)

厚木市七沢（平野ほか，2006）；山北町箒沢（露木ほか，1981）；丹沢湖（露木ほか，1997）；山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班，1972）；山北町舟沢（西，1997）。

シナノサビカミキリ *Arhopalus tobirensis* Hayashi

本種もブナ帯のマツ科針葉樹に依存するため、その衰退が著しい稜線部などでは生息が危ぶまれる。

山北町箒沢（木下，1981）；清川村札掛（岸田，1982）；清川村堂平（露木ほか，1997）。

オオマルクビヒラタカミキリ *Asemum striatum* (Linnaeus)

丹沢における記録は下記のみ。あるいは国内の他の場所から持ち込まれたものに起因しているのかもしれない。神奈川県レッドリストで情報不足 B とされている。

秦野市菩提（露木ほか，1997）。

ハナカミキリ亜科 Lepturinae

テツイロハナカミキリ *Encyclops olivacea* Bates

1ex.，山北町ユースン，8. V. 2005，小林敏男採集；山北町畦ヶ丸山（露木ほか，1997）；清川村堂平（西，1997）；1ex.，清川村堂平 1050m，3. VI. 2004，中山和昭採集；棚沢ノ頭（露木ほか，1981）。

ホンダハイイロハナカミキリ *Rhagium (Rhagium) femorale* N. Ohbayashi

丹沢ではきわめて少ないようで、いままでの記録は下記のみ。モミ

などマツ科針葉樹に依存する。

檜洞丸（丸山，1972c）；清川村堂平（西，1997）。

ヒラヤマコブハナカミキリ *Enoploderes bicolor* Ohbayashi

津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋，2004）；津久井町寺入沢（苅部，2001d）；菰釣山（露木ほか，1997）。

フタコブルリハナカミキリ *Stenocorus coeruleipennis* (Bates)

秦野市名古木など山麓部の個体は通常の色彩であるが、丹沢山など主稜部の個体はその大部分が多少とも黒化傾向を示す。

厚木市七沢（高橋，1987）；厚木市七沢唐沢峠（平野ほか，2006）；大山登山道（露木ほか，1981）；津久井町姫次（小林・山口，1972）；加入道山（露木ほか，1997）；犬越路～大室山（露木ほか，1997）；檜洞丸（加藤，1969a）；山北町畦ヶ丸（露木ほか，1997）；菰釣山（露木ほか，1997）；8exs.，山北町切通峠～鉄砲木の頭，21. VII. 2005，藤田裕採集；1ex.，山北町切通峠 1050m，12. VI. 2005，中山和昭採集；秦野市弘法山（露木ほか，1981）；3exs.，秦野市名古木，4. VI. 2006，加賀玲子採集；清川村堂平（露木ほか，1997）；6exs.，丹沢山頂，17. VII. 2005，高桑正敏採集；1ex.，塔ノ岳～丹沢山，26. VI. 2005，高桑正敏採集。

モモグロハナカミキリ *Toxotinus reini* (Heyden)

神奈川県レッドリストで準絶滅危惧とされている。低地では衰亡が著しいが、丹沢のものはまだ健全だと思われる。

厚木市七沢（相模原市立博物館，2001）；大山（Bates，1884；林・平野，1987b）；津久井町長者舎大谷（守屋，1994b）；加入道山（露木ほか，1997）；犬越路～大室山（露木ほか，1997）；山北町白石沢（平野，1998f）；山北町三国峠（露木ほか，1997）；秦野市県民の森（露木ほか，1997）；秦野市大倉（露木ほか，1981）；秦野市菩提（中村，1964）；清川村堂平（露木ほか，1997）；塔ノ岳（相模原市立博物館，2001）。

キベリカタビロハナカミキリ *Pachyta erebia* Bates

1980年頃は蛭ヶ岳など主稜部ではきわめて個体数が多かったが、最近の記録はまったくない。ブナ帯上部のマツ科針葉樹に依存することが確実な種であるが、高標高地においては針葉樹の衰退が著しいため、生息が危ぶまれている。神奈川県レッドリストで絶滅危惧 I 類に選定されている。

加入道山（苅部，1996b）；丹沢山（露木ほか，1981）；蛭ヶ岳（草間・高桑，1984）。

フタスジカタビロハナカミキリ *Brachyta bifasciata japonica* (Matsushita)

かねてより神奈川県内での生息が期待されてきたところ、今回の調査で確認することができた。成虫はヤマシャクヤクの花を訪れ、その花びらを食べるので、生息はヤマシャクヤクの群落の有無に左右される。切通峠周辺はヤマシャクヤクがまばらな群落を形成しているが、神奈川側での生育株は多くない。

山北町切通峠（木下・中山，2006）。

クビアカハナカミキリ *Gaurotes (Carilia) atripennis* Matsushita

県内における記録は下記のみ。マツ科針葉樹に依存するが、丹沢の高標高地においては針葉樹の衰退が著しいため、生息が危ぶまれている。神奈川県レッドリストで情報不足 B に選定されている。蛭ヶ岳（露木ほか，1981）。

カラカネハナカミキリ *Gaurotes (Paragaurotes) doris* Bates

山麓から主稜部まで広く分布する。丹沢産は色彩変化が著しく、緑～青～紫～銅色などの鞘翅をもつ個体が現れる。

厚木市七沢（平野ほか，2006）；厚木市七沢不動尻（平野ほか，2006）；大山北尾根（平野ほか，2006）；津久井町鳥屋（有井・守屋，2004）；津久井町犬越路隧道～犬越路（有井・守屋，2004）；大箕～熊笹ノ峰（露木ほか，1997）；1ex.，檜洞丸山頂，26. VI. 2005，宮谷秀明採集；1ex.，山北町ユースン，8. V. 2005，小林敏男採集；山北町畦ヶ丸山（露木ほか，1997）；山北町大又沢（露木ほか，1981）；1ex.，山北町大棚沢，5. V. 2006，新堀豊彦採集；1ex.，山北町切通峠 1030m，12. VI. 2005，中山和昭採集；山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班，1972）；1ex.，鍋割山～小丸（南丹沢），21. VI. 2005，高桑正敏採集；清川村札掛（露木ほか，1997）；清川村堂平（露木ほか，1997）；1ex.，丹沢山頂付近，26. VI. 2005，高桑正敏採集；1ex.，塔ノ岳～丹沢山，17. VII. 2005，中村進一採集；丹沢山～棚沢の頭（露木ほか，1997）；蛭ヶ岳（平野，1999f）。

キバネニセハムシハナカミキリ *Lemula decipiens* Bates

愛川町経ヶ岳 (苜部ほか, 1999); 厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 大山山頂 (平野ほか, 2006); 大山追分付近 (遠藤, 1970); 津久井町鳥屋越路峠 (有井・守屋, 2004); 1ex., 津久井町伊勢沢林道, 1. V. 2005, 新堀豊彦採集; 4exs., 津久井町早戸川林道, 1. V. 2005, 新堀豊彦採集; 1ex., 津久井町黍殻山 1180m, 22. V. 2004, 中山和昭採集; 1ex., 津久井町姫次 1350m, 12. VI. 2004, 中山和昭採集; 津久井町青根日陰沢新道大室山 (有井・守屋, 2004); 津久井町青根犬越路隧道~犬越路 (有井・守屋, 2004); 山北町白石沢 (新堀, 1992); 1ex., 山北町ユーシン溪谷, 8. V. 2005, 平野幸彦採集; 山北町玄倉~小川谷出合 (露木ほか, 1997); 山北町畦ヶ丸山 (露木ほか, 1997); 2exs., 山北町大又沢林道, 5. V. 2005, 新堀豊彦採集; 1ex., 山北町土沢上流 (世附), 4. VI. 2006, 新堀豊彦採集; 3exs., 山北町大棚沢 (世附), 4. VI. 2006, 新堀豊彦採集; 山北町水ノ木沢 (露木ほか, 1981); 1ex., 山北町切通峠 1030m, 5. VI. 2005, 中山和昭採集; 山北町市間 (倉形, 1971); 1ex., 鍋割山~小丸 (南丹沢), 21. VI. 2005, 高桑正敏採集; 清川村札掛~宮ヶ瀬 (露木ほか, 1981); 清川村堂平 (西, 1997); 1ex., 丹沢山頂付近, 25. VI. 2005, 高桑正敏採集.

ニセハムシハナカミキリ *Lemula japonica* Tamanuki

1979年に蛭ヶ岳山頂付近で9頭が確認されて以来, 追加記録がない. プナ帯上部に生息する種であるが, 高標高地においては植生環境の荒廃が著しいため, 生息が危ぶまれている. 神奈川県での絶滅危惧I類に選定されている.

蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

アカイロニセハムシハナカミキリ *Lemula nishimurai* Seki

県内では津久井から清川村・愛川町にかけて記録されており, 南丹沢や西丹沢での記録を欠く.

愛川町経ヶ岳 (苜部ほか, 1996); 津久井町東野 (露木ほか, 1981); 津久井町青根犬越路隧道~犬越路 (有井・守屋, 2004); 清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (露木ほか, 1997); 清川村堂平 (西, 1997).

ピックニセハムシハナカミキリ *Lemula rufithorax* Pic

西丹沢方面では個体数も多い一方で, 東丹沢方面ではほとんど記録されていない.

津久井町鳥屋伊勢沢林道 (高桑・新堀, 2005); 津久井町鳥屋早戸川林道魚止橋付近 (高桑・新堀, 2005); 1ex., 津久井町黍殻山 1180m, 22. V. 2004, 中山和昭採集; 1ex., 津久井町日陰沢, 7. V. 2004, 新堀豊彦採集; 山北町白石沢 (新堀, 1992); 山北町熊木沢 (露木ほか, 1981); 1ex., 山北町ユーシン溪谷, 8. V. 2005, 平野幸彦採集; 山北町玄倉~小川谷出合 (露木ほか, 1997); 山北町箒沢 (露木ほか, 1981); 3exs., 山北町大又沢林道, 5. V. 2005, 新堀豊彦採集; 14exs., 山北町大棚沢, 8. V. 2005, 高桑正敏採集; 山北町水ノ木沢 (露木ほか, 1981); 清川村堂平 (西, 1997); 1ex., 竜ヶ馬場~塔ノ岳, 26. VI. 2005, 藤田裕採集.

ヒナリハナカミキリ *Dinoptera minuta* (Gebler)

愛川町高取山 (苜部ほか, 1999); 愛川町経ヶ岳 (苜部ほか, 1999); 厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 大山山頂 (平野ほか, 2006); 大山追分付近 (遠藤, 1970); 津久井町鳥屋 (相模原市立博物館, 2001); 2exs., 津久井町早戸川林道, 1. V. 2005, 新堀豊彦採集; 津久井町青野原焼山 (相模原市立博物館, 2001); 1ex., 津久井町黍殻山 1100m, 22. V. 2004, 中山和昭採集; 津久井町青根神ノ川広河原 (有井・守屋, 2004); 津久井町犬越路隧道~犬越路 (有井・守屋, 2004); 山北町白石沢 (平野, 1998f); 2exs., 山北町ユーシン, 8. V. 2005, 小林敏男採集; 山北町玄倉~小川谷出合 (露木ほか, 1997); 山北町畦ヶ丸山 (露木ほか, 1997); 山北町大又沢 (露木ほか, 1981); 1ex., 山北町土沢上流 (世附), 4. VI. 2006, 新堀豊彦採集; 2exs., 山北町大棚沢, 5. V. 2006, 新堀豊彦採集; 山北町水ノ木沢 (露木ほか, 1981); 山北町大棚ノ頭~高指山 (露木ほか, 1997); 1ex., 山北町切通峠 1040m, 12. VI. 2005, 中山和昭採集; 1ex., 山北町切通峠 1090m, 22. V. 2005, 中山和昭採集; 山北町明神峠 (露木ほか, 1997); 山北町市間 (倉形, 1971); 1ex., 鍋割山 (南丹沢), 5. V. 2006, 磯輪亮太採集; 秦野市弘法山 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (平野, 1987h); 1ex., 清川村堂平 1160m, 3. VI. 2004, 中山和昭採集; 2exs., 清川村堂平~西峰 (太礼ノ頭)~丹沢山, 10-11. VI. 2006, 高桑正敏採集; 蛭ヶ岳 (平野, 1999f).

チャイロヒメコブハナカミキリ *Pseudosieversta japonica* (Ohbayashi)

カツラ大木の周辺から発見されるが, 県内では現在までのところ, 堂平周辺でしか確認されていない.

清川村堂平 (露木ほか, 1997); 1ex., 清川村堂平~西峰 (太礼ノ頭), 5. VII. 2005, 高桑正敏採集; 清川村天王寺尾根 (露木ほか, 1997).

オオヒメハナカミキリ *Pidonia (Pidonia) grallatrix* (Bates)

大山 (露木ほか, 1997); 津久井町鳥屋奥野 (守屋, 1994b); 1ex., 津久井町黍殻山 1210m, 12. VI. 2004, 中山和昭採集; 加入道山 (露木ほか, 1997); 犬越路~大室山 (平野, 1998f); 1ex., 熊笹ノ峰, 21. VII. 2004, 河合秀樹採集; 山北町ユーシン休泊所付近 (露木ほか, 1981); 1ex., 山北町切通峠 1030m, 5. VI. 2005, 中山和昭採集; 三国山~三国峠 (露木ほか, 1997); 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 清川村堂平 (露木ほか, 1997); 2exs., 清川村堂平, 11. VI. 2005, 小林敏男採集; 1ex., 西峰 (太礼ノ頭)~丹沢山, 16. VII. 2005, 藤田裕採集; 2exs., 丹沢山頂付近, 25. VI. 2005, 高桑正敏採集; 1ex., 竜ヶ馬場~塔ノ岳, 26. VI. 2005, 藤田裕採集; 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

キベリクロヒメハナカミキリ *Pidonia (Pidonia) discoidalis* Pic

1ex., 加入道山~大室山, 12. VI. 2005, 高橋和弘採集; 犬越路~大室山 (平野, 1998f); 檜洞丸 (草間・高桑, 1984); 山北町畦ヶ丸山 (露木ほか, 1997); 山北町地蔵平 (露木ほか, 1997); 菰釣山 (露木ほか, 1997); 1ex., 山北町切通峠 1020m, 12. VI. 2005, 中山和昭採集; 山北町明神峠 (露木ほか, 1997); 清川村札掛 (露木ほか, 1981); 1ex., 清川村堂平 1160m, 3. VI. 2004, 中山和昭採集; 4exs., 丹沢山頂付近, 26. VI. 2005, 高桑正敏採集; 丹沢山~不動ノ峰 (平野, 1999f); 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

ツマグロヒメハナカミキリ *Pidonia (Pidonia) maculithorax* Pic

1ex., 津久井町黍殻山 1210m, 12. VI. 2004, 中山和昭採集; 津久井町姫次 (小林・山口, 1972); 加入道山 (露木ほか, 1997); 犬越路~大室山 (有井・守屋, 2004); 菰釣山 (露木ほか, 1997); 1ex., 鍋割山~小丸 (南丹沢), 21. VI. 2005, 高桑正敏採集; 清川村堂平 (露木ほか, 1997); 1ex., 西峰 (太礼ノ頭)~丹沢山, 16. VII. 2005, 藤田裕採集; 4exs., 丹沢山頂付近, 25. VI. 2005, 高桑正敏採集; 3exs., 塔ノ岳~丹沢山, 17. VII. 2005, 中村進一採集.

ミヤマヒメハナカミキリ *Pidonia (Pidonia) sylvicola* Kuboki

県内での採集例はきわめて少なく, 下記が知られるのみ. 棚沢ノ頭 (露木ほか, 1997); 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

マツシタヒメハナカミキリ *Pidonia (Pidonia) matsushitai* Ohbayashi

県内での採集例はきわめて少なく, 下記が知られるのみ. 丹沢山 (露木, 1985b); 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

ホンガタヒメハナカミキリ *Pidonia (Pidonia) semiobscura* Pic

犬越路~大室山 (平野, 1998f); 清川村堂平 (露木ほか, 1997); 1ex., 丹沢山頂付近, 25. VI. 2005, 高桑正敏採集; 清川村天王寺尾根 (露木ほか, 1997); 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

フトエリマキヒメハナカミキリ *Pidonia (Pidonia) himehana* S. Saito

1ex., 加入道山~大室山, 3. VII. 2005, 高橋和弘採集; 犬越路~大室山 (平野, 1998f); 1ex., 山北町ユーシン, 8. V. 2005, 小林敏男採集; 1ex., 山北町大棚沢, 8. V. 2005, 高桑正敏採集; 1ex., 山北町切通峠 1030m, 5. VI. 2005, 中山和昭採集; 1ex., 清川村堂平 1160m, 3. VI. 2004, 中山和昭採集; 5exs., 丹沢山頂付近, 25. VI. 2005, 高桑正敏採集; 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

ナガバヒメハナカミキリ *Pidonia (Pidonia) signifera* (Bates)

愛川町経ヶ岳 (苜部ほか, 1999); 厚木市広沢寺奥 (露木ほか, 1981); 大山 (Bates, 1884; 露木ほか, 1997); 津久井町鳥屋越路峠 (有井・守屋, 2004); 津久井町鳥屋奥野林道大平~黍殻山 (有井・守屋, 2004); 1ex., 津久井町黍殻山 1180m, 22. V. 2004, 中山和昭採集; 1ex., 津久井町黍殻山 1210m, 12. VI. 2004, 中山和昭採集; 津久井町青根神ノ川広河原 (有井・守屋, 2004); 加入道山 (露木ほか, 1997); 犬越路~大室山 (露木ほか, 1997); 山北町ユーシン付近 (露木ほか, 1981); 山北町畦ヶ丸山 (露木ほか, 1997); 3exs., 山北町大又沢 (世附), 4. VI. 2006, 新堀豊彦採集; 山北町浅瀬 (露木ほか, 1981); 14exs., 山北町土沢上流 (世附), 4. VI. 2006, 新堀豊彦採集; 5exs., 山北町大棚沢 (世附), 4. VI. 2006, 新堀豊彦採集; 山北町水ノ木林道 (露木ほか, 1997); 菰釣山 (露木ほか, 1997); 1ex., 山北町切通峠 1030m, 12. VI. 2005, 中山和昭採集; 1ex., 山北町切通峠 1090m, 22. V.

2005 中山和昭採集；三国山（露木ほか，1997）；4exs. 鍋割山～小丸（南丹沢），21. VI. 2005, 高桑正敏採集；秦野市県民の森（露木ほか，1997）；秦野市二ノ塔（露木ほか，1997）；清川村中津川溪谷（露木ほか，1981）；清川村札掛（露木ほか，1981）；1ex., 清川村塩水林道 660m, 3. VI. 2004, 中山和昭採集；清川村堂平（平野，1999f）；5exs., 清川村堂平，11. VI. 2005, 小林敏男採集；2exs., 丹沢山頂付近，25. VI. 2005, 高桑正敏採集；蛭ヶ岳（露木ほか，1981）。

フジヒメハナカミキリ *Pidonia (Pidonia) fujisana* Obika et Kusama
加入道山（露木ほか，1997）；犬越路～大室山（平野，1998f）；山北町東沢～檜洞丸（露木ほか，1997）；山北町石棚山（鈴木・峰，1978）；山北町同角の頭（露木・鈴木，1975）；山北町畦ヶ丸山（露木ほか，1997）；清川村堂平（露木ほか，1997）；丹沢山（西，1997）；蛭ヶ岳（露木ほか，1981）。

ヨコモヒメハナカミキリ *Pidonia (Cryptopidonia) insuturata*
insuturata Pic

加入道山（露木ほか，1997）；犬越路～大室山（平野，1998f）；清川村堂平（露木ほか，1997）；丹沢山（西，1997）；蛭ヶ岳（露木ほか，1981）。

ムネアカヨコモヒメハナカミキリ *Pidonia (Cryptopidonia) masakii*
Hayashi

1ex., 津久井町姫次 1400m, 12. VI. 2004, 中山和昭採集；犬越路～大室山（平野，1998f）；菰釣山（露木ほか，1997）；清川村堂平（露木ほか，1997）；1ex., 西峰（太礼ノ頭）～丹沢山頂，2. VIII. 2005, 深田晋一採集；蛭ヶ岳（露木ほか，1981）。

ニセヨコモヒメハナカミキリ *Pidonia (Cryptopidonia) similima*
Ohbayashi et Hayashi

大山（露木ほか，1997）；1ex., 津久井町青根，22. V. 2004, 中山和昭採集；津久井町此間沢（露木ほか，1981）；1ex., 津久井町姫次 1400m, 12. VI. 2004, 中山和昭採集；2exs., 加入道山～大室山，3. VII. 2005, 高橋和弘採集；1ex., 犬越路トンネル付近（北丹沢），3. VII. 2004, 新堀豊彦採集；山北町東沢～檜洞丸（露木ほか，1997）；山北町熊木沢（露木ほか，1981）；山北町畦ヶ丸山（露木ほか，1997）；2ex., 山北町大又沢（世附），4. VI. 2006, 新堀豊彦採集；2ex., 山北町土沢上流（世附），4. VI. 2006, 新堀豊彦採集；4exs., 山北町水の木沢（世附），4. VI. 2006, 新堀豊彦採集；菰釣山（露木ほか，1997）；1ex., 山北町切通峠 1040m, 5. VI. 2005, 中山和昭採集；山北町三国峠（露木ほか，1997）；1ex., 三国山（西丹沢），20. VII. 2005, 平野幸彦採集；1ex., 鍋割山～小丸（南丹沢），21. VI. 2005, 高桑正敏採集；清川村札掛（露木ほか，1981）；1ex., 清川村塩水林道 820m, 3. VI. 2004, 中山和昭採集；清川村堂平（平野，1999f）；2ex., 丹沢山頂付近，25. VI. 2005, 高桑正敏採集；蛭ヶ岳（露木ほか，1981）。

セズジヒメハナカミキリ *Pidonia (Cryptopidonia) amentata amentata*
(Bates)

愛川町経ヶ岳（苅部ほか，1999）；大山（Bates, 1884）；津久井町鳥屋（露木ほか，1981）；山北町用木沢（露木ほか，1997）；山北町ユーン（露木ほか，1981）；山北町玄倉（露木ほか，1981）；山北町地蔵平（露木ほか，1997）；1ex., 山北町大又沢，5. V. 2006, 新堀豊彦採集；山北町世附川（露木ほか，1981）；清川村宮ヶ瀬（露木ほか，1981）；清川村中津溪谷（露木ほか，1981）；清川村札掛（露木ほか，1997）；清川村堂平（露木ほか，1997）。

コトヒメハナカミキリ *Pidonia (Cryptopidonia) hyra* Kuboki et Suzuki

大山（露木ほか，1997）；1ex., 津久井町黍殻山 1030m, 12. VI. 2004, 中山和昭採集；1ex., 津久井町黍殻山 1170m, 22. V. 2004, 中山和昭採集；津久井町日陰沢新道大室山（有井・守屋，2004）；1ex., 加入道山～大室山，12. VI. 2005, 高橋和弘採集；犬越路（露木ほか，1997）；檜洞丸（窪木・鈴木，1979）；山北町石棚山（窪木・鈴木，1979）；1ex., 山北町ユーン，8. V. 2005, 小林敏男採集；山北町箒沢（窪木・鈴木，1979）；山北町畦ヶ丸（窪木・鈴木，1979）；山北町大又沢（窪木・鈴木，1979）；1ex., 山北町土沢上流（世附），4. VI. 2006, 新堀豊彦採集；菰釣山（露木ほか，1997）；三国山（窪木・鈴木，1979）；三ヶ峰（窪木・鈴木，1979）；1ex., 鍋割山～小丸（南丹沢），21. VI. 2005, 高桑正敏採集；秦野市諸戸（窪木・鈴木，1979）；清川村宮ヶ瀬（窪木・鈴木，1979）；清川村札掛（窪木・鈴木，1979）；1ex., 清川村塩水林道 570m, 3. VI. 2004, 中山和昭採集；清川村堂平（露木ほか，1997）；丹沢山（西，1997）；蛭ヶ岳（露木ほか，1981）。

木，1979）；清川村札掛（窪木・鈴木，1979）；1ex., 清川村塩水林道 570m, 3. VI. 2004, 中山和昭採集；清川村堂平（露木ほか，1997）；丹沢山（西，1997）；蛭ヶ岳（露木ほか，1981）。

フタオビノミハナカミキリ *Pidonia (Omphalodera) puziloi* (Solsky)

愛川町高取山（苅部ほか，1999）；愛川町経ヶ岳（苅部ほか，1999）；厚木市七沢（平野ほか，2006）；大山山頂（平野ほか，2006）；伊勢原市日向（相模原市立博物館，2001）；津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋，2004）；津久井町鳥屋とづら峠（有井・守屋，2004）；津久井町青根音久和（有井・守屋，2004）；津久井町青根神ノ川広河原（有井・守屋，2004）；加入道山（露木ほか，1997）；犬越路～大室山（有井・守屋，2004）；山北町東沢～檜洞丸（露木ほか，1997）；山北町玄倉（露木ほか，1981）；山北町畦ヶ丸山（露木ほか，1997）；菰釣山（露木ほか，1997）；三国山～三国峠（露木ほか，1997）；山北町市間（倉形，1971）；秦野市県民の森（露木ほか，1997）；清川村札掛（露木ほか，1981）；清川村堂平（露木ほか，1997）；丹沢山（西，1997）。

チャイロヒメハナカミキリ *Pidonia (Mumon) aegrota aegrota* (Bates)

厚木市七沢（平野ほか，2006）；大山三峰南尾根（平野ほか，2006）；大山山頂（平野ほか，2006）；1ex., 津久井町青根 730m, 22. V. 2004, 中山和昭採集；1ex., 津久井町黍殻山 1210m, 12. VI. 2004, 中山和昭採集；津久井町青根神ノ川広河原（有井・守屋，2004）；大室山（露木ほか，1997）；1ex., 加入道山～大室山，3. VII. 2005, 高橋和弘採集；犬越路隧道（有井・守屋，2004）；1ex., 檜洞丸（西丹沢自然教室～ゴウラ沢出合），20. VI. 2004, 宮谷秀明採集；山北町東沢～檜洞丸（露木ほか，1997）；山北町熊木沢（露木ほか，1981）；山北町ユーン（露木ほか，1981）；2exs., 山北町土沢上流（世附），4. VI. 2006, 新堀豊彦採集；1ex., 山北町大棚沢（世附），4. VI. 2006, 新堀豊彦採集；1ex., 山北町水の木沢（世附），4. VI. 2006, 新堀豊彦採集；菰釣山（露木ほか，1997）；1ex., 山北町切通峠 1030m, 5. VI. 2005, 中山和昭採集；2exs., 鍋割山（南丹沢），16. VII. 2005, 松原豊採集；南丹沢西山林道（露木ほか，1997）；清川村札掛（露木ほか，1981）；1ex., 清川村塩水林道 560m, 3. VI. 2004, 中山和昭採集；2exs., 清川村堂平，11. VI. 2005, 小林敏男採集；1ex., 丹沢山頂付近，25. VI. 2005, 高桑正敏採集。

チビハナカミキリ *Alosterna chalybeella* (Bates)

神奈川県での採集例はきわめて少なく，堂平から小数の個体が得られているにすぎない。

清川村堂平（露木ほか，1997）；2exs., 清川村堂平，18. VI. 2005, 小林敏男採集。

ヘリグロホソハナカミキリ *Ohbayashia nigromarginata nigromarginata* (Hayashi)

丹沢を東限とする種類で，タンナサワフタギを寄主植物とする。主稜部に広く分布し，個体数も多い。

加入道山（露木ほか，1997）；犬越路～大室山（露木ほか，1997）；3exs., 鍋割山～小丸（南丹沢），21. VI. 2005, 高桑正敏採集；1ex., 清川村堂平，17. VI. 2006, 河合秀樹採集；清川村天王寺尾根（露木ほか，1997）；1ex., 塔ノ岳～丹沢山，17. VII. 2005, 中村進一採集。

ヘリウスハナカミキリ *Pyrrhona laeticolor laeticolor* Bates

加入道山（露木ほか，1997）；1ex., 檜洞丸山頂，7. VIII. 2005, 宮谷秀明採集；1ex., 檜洞丸山頂～金山谷乗越，26. VI. 2005, 宮谷秀明採集；1ex., 山北町切通峠 1050m, 14. V. 2005 材採，11. III. 2006 羽脱，中山和昭採集；1ex., 清川村堂平 1160m, 3. VI. 2004, 中山和昭採集；1ex., 丹沢山頂付近，25. VI. 2005, 高桑正敏採集；清川村天王寺尾根（露木ほか，1997）。

ヒゲトハナカミキリ *Pachypidonia bodemeyeri* (Pic)

広葉樹の樹洞内に生息するが，一般に少ない。今回の調査ではシオジの樹洞内から次種とともに得られた。

菰釣山（苅部，2000b）；清川村堂平（苅部・蕨沢，1995）；1ex., 清川村堂平～西峰（太礼ノ頭），5-6. VIII. 2006, 高桑正敏採集。

チャボハナカミキリ *Pseudalosterna misella* (Bates)

全国的には個体数の多い種であるが，箱根から記録がなく，丹沢でもなぜか個体数が少なく，今回も堂平周辺でわずかな個体が確認されたにすぎない。

大山山頂（平野ほか，2006）；津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋，2004）；津久井町神ノ川（露木ほか，1997）；加入道山（露

木ほか, 1997); 犬越路~大室山 (有井・守屋, 2004); 清川村堂平 (露木ほか, 1997); 清川村堂平~丹沢山 (中山, 1985a).

キヌツヤハナカミキリ *Corennys sericata* Bates

加入道山 (露木ほか, 1997); 犬越路~大室山 (露木ほか, 1997); lex., 熊笹ノ峰, 21. VII. 2004, 河合秀樹採集; 白ヶ岳 (露木ほか, 1981); 山北町畦ヶ丸山 (露木ほか, 1997); 清川村堂平 (露木ほか, 1997); 丹沢山 (西, 1997); lex., 塔ノ岳~丹沢山, 17. VII. 2005, 中村進一採集.

ヤマトキモンハナカミキリ *Judolia japonica* (Tamanuki)

県内では採集例が少なく, 下記が知られるのみ.

山北町玄倉林道 (露木ほか, 1997); 丹沢山頂 (露木ほか, 1981).

マルガタハナカミキリ *Pachytodes cometes* (Bates)

全国的には個体数の多い種であるが, 箱根に記録がなく, 丹沢でもなぜか個体数が少ない.

大室山~犬越路 (露木ほか, 1997); lex., 檜洞丸山頂, 7. VIII. 2005, 宮谷秀明採集; 山北町三国峠 (露木ほか, 1981); lex., 清川村堂平~西峰 (太礼ノ頭)~丹沢山, 16. VII. 2005, 高桑正敏採集; lex., 丹沢山頂, 2. VIII. 2005, 深田晋一採集; 棚沢ノ頭 (露木ほか, 1981); 蛭ヶ岳 (草間・高桑, 1984).

ヌバタマハナカミキリ *Judolidia bangi* (Pic)

愛川町半原越~仏果山 (藤田, 1995a); 津久井町青根神ノ川広河原~源蔵新道 (有井・守屋, 2004); 山北町板小屋ノ頭 (小谷, 1983); 清川村札掛 (露木ほか, 1997); lex., 丹沢山頂付近, 17. VII. 2005, 深田晋一採集; lex., 塔ノ岳~丹沢山, 17. VII. 2005, 中村進一採集.

ミヤマルリハナカミキリ *Kanekoa azumensis* (Matsushita et Tamanuki)

県内では津久井と丹沢に分布するが, 丹沢での記録は下記が知られるのみ.

清川村堂平 (露木ほか, 1997); 清川村天王寺尾根 (高橋, 1989a).

ミヤマクロハナカミキリ *Anoploderomorpha excavata* (Bates)

全国的には個体数の多い種であるが, 丹沢ではなぜか個体数が少ない.

津久井町風巻ノ頭 (露木ほか, 1997); 秦野市大倉 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (Okui, 1952); 清川村堂平 (露木ほか, 1997); lex., 西峰 (太礼ノ頭)~丹沢山頂, 2. VIII. 2005, 深田晋一採集.

ツヤケシハナカミキリ *Anastrangalia scotodes* (Bates)

厚木市七沢大沢 (平野ほか, 2006); 大山 (相模原市立博物館, 2001); 津久井町鳥屋とづら峠 (有井・守屋, 2004); 津久井町姫次 (小林・山口, 1972); 津久井町青根鐘撞山 (有井・守屋, 2004); 加入道山 (露木ほか, 1997); 犬越路~大室山 (有井・守屋, 2004); 山北町箒沢 (猪又, 1968); 山北町地蔵平 (小林・山口, 1972); 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); lex., 鍋割山~小丸 (南丹沢), 21. VI. 2005, 高桑正敏採集; 秦野市弘法山 (露木ほか, 1997); 清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (露木ほか, 1997); 清川村堂平 (露木ほか, 1981); lex., 塔ノ岳~丹沢山, 17. VII. 2005, 中村進一採集.

アカハナカミキリ *Corymbia succedanea* (Lewis)

愛川町仏果山 (苧部ほか, 1999); 厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 大山山頂 (平野ほか, 2006); 津久井町鳥屋伊勢沢林道 (有井・守屋, 2004); 津久井町青根 (小林・山口, 1972); 津久井町焼山尾根 (原・山内, 1972); 津久井町姫次 (小林・山口, 1972); 大室山~犬越路 (露木ほか, 1997); 山北町ユーシン (露木ほか, 1997); 山北町箒沢 (露木ほか, 1997); 山北町地蔵平 (露木ほか, 1997); 山北町大又沢 (露木ほか, 1981); 山北町水ノ木沢 (露木ほか, 1997); 山北町高指山 (露木ほか, 1981); 山北町三国峠 (露木ほか, 1981); 山北町大野山 (露木ほか, 1997); 山北町八丁 (露木ほか, 1981); 山北町大門沢 (西, 1997); 秦野市菩提 (中村, 1964); 清川村宮ヶ瀬 (大林ほか, 1992); 清川村札掛 (露木ほか, 1997); lex., 清川村長尾尾根, 2. VIII. 2005, 新堀豊彦採集; 清川村堂平 (露木ほか, 1997); lex., 西峰 (太礼ノ頭)~丹沢山頂, 1. VIII. 2005, 深田晋一採集; 塔ヶ岳大倉尾根 (露木ほか, 1981); 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

ベニバハナカミキリ *Paranaspia anaspoides* (Bates)

広葉樹とくにケヤキの樹洞内に生息することで知られるが, 丹沢での記録は少ない. 今回の調査では3頭が得られたが, そのうち秦野市名古木ではクヌギから, 堂平ではカツラからのものである.

厚木市七沢 (露木ほか, 1997); lex., 秦野市名古木, 13. VI. 2005, 高桑正敏採集; 清川村堂平 (露木ほか, 1997); lex., 塔ノ岳~丹沢山, 4. VIII. 2005, 飯嶋一浩採集.

ムネアカクロハナカミキリ *Leptura dimorpha* Bates

神奈川県レッドリストで準絶滅危惧とされている. 低地では衰退が著しく, 丹沢のものも最近の採集例をあまり聞かない.

愛川町高取山 (苧部ほか, 1999); 厚木市七沢 (相模原市立博物館, 2001); 津久井町鳥屋 (露木ほか, 1997); 津久井町鳥屋越路峠 (有井・守屋, 2004); 津久井町姫次 (小林・山口, 1972); 山北町箒沢 (露木ほか, 1981); 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 秦野市大倉 (露木ほか, 1981); 秦野市弘法山 (露木ほか, 1997); 丹沢山 (西, 1997); 清川村天王寺尾根 (露木ほか, 1997); 塔ノ岳 (中村, 1964; 相模原市立博物館, 2001); 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

ヤツボシハナカミキリ *Leptura mimica* Bates

丹沢においては, 山麓部の個体はほとんどツマグロハナカミキリ型であるのに対し, 高標高地の個体は全体的に黒化が著しい特有の型を示す.

愛川町檜原 (苧部ほか, 1999); 厚木市七沢大沢 (平野ほか, 2006); 大山山頂 (平野ほか, 2006); lex., 津久井町姫次 1330m, 12. VI. 2004, 中山和昭採集; 津久井町風巻ノ頭 (露木ほか, 1997); lex., 熊笹ノ峰, 21. VII. 2004, 河合秀樹採集; lex., 山北町切通峠 1030m, 12. VI. 2005, 中山和昭採集; 山北町市間 (倉形, 1973); 松田町寄沢 (露木ほか, 1997); lex., 鍋割山 (南丹沢), 16. VII. 2005, 松原豊採集; 秦野市弘法山 (露木ほか, 1981); 秦野市諸戸~札掛 (露木ほか, 1981); 清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1981); 清川村堂平 (露木ほか, 1997); lex., 丹沢山頂付近, 26. VI. 2005, 高桑正敏採集; lex., 塔ノ岳~丹沢山, 26. VI. 2005, 飯嶋一浩採集; lex., 不動ノ峰~鬼ヶ岩ノ頭, 6. VIII. 2006, 藤田裕採集; 蛭ヶ岳 (中村, 1964).

ハネビロハナカミキリ *Leptura latipennis* (Matsushita)

県内では津久井と丹沢から局地的に知られるにすぎない.

清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1997).

ヨツスジハナカミキリ *Leptura ochraceofasciata ochraceofasciata* (Motschulsky)

愛川町仏果山 (苧部ほか, 1999); 厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 大山山頂 (平野ほか, 2006); 加入道山 (露木ほか, 1997); 山北町白石沢 (露木ほか, 1997); lex., 熊笹ノ峰, 21. VII. 2004, 河合秀樹採集; lex., 檜洞丸山頂, 6. VIII. 2005, 宮谷秀明採集; 山北町箒沢 (猪又, 1968); 山北町世附~地蔵平 (露木ほか, 1997); 菰釣山 (平野, 2001e); 山北町高指山 (露木ほか, 1981); lex., 山北町三国峠, 6. VIII. 2005, 松本和馬採集; lex., 山北町大野山, 9. VII. 2004, 河合秀樹採集; 山北町市間 (倉形, 1971); 松田 (猪又, 1968); 秦野市大倉 (露木ほか, 1981); 清川村谷太郎谷 (露木ほか, 1981); 清川村物見峠 (芦沢, 1977); 清川村宮ヶ瀬~石小屋 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (露木ほか, 1981); lex., 清川村長尾尾根, 2. VIII. 2005, 新堀豊彦採集; 清川村堂平 (露木ほか, 1997); lex., 丹沢山頂, 21. VII. 2005, 深田晋一採集; 塔ノ岳 (相模原市立博物館, 2001); 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

ヒメヨツスジハナカミキリ *Leptura kusamai* Ohbayashi et Nakane

県内では下記の2例だけが知られる. 今回の調査ではイワガラミの花から得られた.

丹沢山山頂 (小畑, 1995a); lex., 丹沢山頂付近, 2. VIII. 2005, 高桑正敏採集.

ヤマトヨツスジハナカミキリ *Leptura subtilis* Bates

一般に個体数の少ない種であるが, 丹沢山周辺ではリョウブの花などに比較的多く見られる.

加入道山 (露木ほか, 1997); 犬越路~大室山 (露木ほか, 1997); 清川村堂平 (露木ほか, 1997); 5sex., 清川村堂平~西峰 (太礼ノ頭)~丹沢山, 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏採集; lex., 丹沢山頂, 22. VII. 2005, 深田晋一採集; lex., 不動ノ峰~鬼ヶ岩, 6. VIII. 2006, 藤田裕採集; 棚沢ノ頭 (草間・高桑, 1984).

オオヨツスジハナカミキリ *Megaleptura regalis* (Bates)

モミなど針葉樹を主な寄主植物とする。丹沢ではもともと個体数が多くないが、最近とはくに確認される例が少ない。

愛川町高取山（荻部ほか、1999）；厚木市七沢水辺の広場（平野ほか、2006）；大山（相模原市立博物館、2001）；大山ケーブル駅（露木ほか、1981）；加入道山（露木ほか、1997）；山北町水ノ木林道（露木ほか、1997）；菰釣山学術考証林（露木ほか、1981）；山北町大門沢（西、1997）；清川村札掛（露木ほか、1981）。

フタスジハナカミキリ *Nakanea vicaria* (Bates)

リュウブの花や針葉樹の立ち枯れ木に多く集まる。丹沢の個体はすべてハスジハナカミキリ型で、触角の先端数節以外は全体黒色のものももっとも多く、フタスジハナカミキリ型のものも少数現れるが黒色部は広がる。

加入道山（露木ほか、1997）；1ex., 犬越路トンネル付近（北丹沢）、3. VII. 2004, 新堀豊彦採集；山北町熊木沢（露木ほか、1981）；2exs., 山北町切通峠～鉄砲木の頭、21. VII. 2005, 藤田裕採集；清川村堂平（露木ほか、1997）；2exs., 西峰（太礼ノ頭）～丹沢山、16. VII. 2005, 藤田裕採集；3exs., 丹沢山頂、21. VII. 2005, 深田晋一採集；清川村天王寺尾根（露木ほか、1997）；4exs., 塔ノ岳～丹沢山、17. VII. 2005, 中村進一採集；棚沢ノ頭（露木ほか、1981）。

カタキハナカミキリ *Pedostrangalia femoralis* (Motschulsky)

神奈川県レッドリストで準絶滅危惧とされている。低地では壊滅状態と推定されるが、丹沢のものは今回の調査でも得られているので健全だと思われる。

檜洞丸（露木ほか、1997）；秦野市弘法山（露木ほか、1981）；3exs., 清川村堂平～西峰（太礼ノ頭）～丹沢山、1-2. VIII. 2005, 高桑正敏採集；丹沢山（西、1997）。

カエデノヘリグロハナカミキリ *Eustrangalis distenioides* Bates

県内ではこれまで堂平での1例しか知られていなかったが、今回の調査で三ッ峰～丹沢山頂におけるセンノキ立ち枯れ木から多数を確認できた。

清川村堂平（露木ほか、1997）；3exs., 清川村堂平～西峰（太礼ノ頭）、5. VII. 2005, 高桑正敏採集；1ex., 清川村堂平～西峰（太礼ノ頭）～丹沢山、10-11. VI. 2006, 高桑正敏採集；2exs., 丹沢山頂付近、25. VI. 2005, 高桑正敏採集。

ヒゲジロハナカミキリ *Japanostrangalia dentatipennis* (Pic)

西峰の個体はベイトトラップに入っていたもの。

犬越路～大室山（露木ほか、1997）；1ex., 檜洞丸、1. VIII. 2004, 河合秀樹採集；臼ヶ岳（露木ほか、1981）；山北町箒沢（露木ほか、1981）；山北町高指山（露木ほか、1981）；三国山～三国峠（露木ほか、1997）；2exs., 西峰（太礼ノ頭）、17. VII. 2005, 高桑正敏採集。

アオバホソハナカミキリ *Strangalomorpha tenuis aenescens* Bates

加入道山（露木ほか、1997）；犬越路～大室山（露木ほか、1997）；山北町畦ヶ丸山（露木ほか、1997）；1ex., 鍋割山～小丸（南丹沢）、21. VI. 2005, 高桑正敏採集；1ex., 清川村堂平 1200m, 3. VI. 2004, 中山和昭採集；4exs., 西峰（太礼ノ頭）～丹沢山、25. VI. 2005, 藤田裕採集；清川村天王寺尾根（露木ほか、1997）；蛭ヶ岳（平野、1999f）。

ホソハナカミキリ *Leptostrangalia hosohana* (Ohbayashi)

1ex., 津久井町姫次 1420m, 12. VI. 2004, 中山和昭採集；犬越路～大室山（平野、1998f）；山北町白石沢～加入道山（露木ほか、1997）；臼ヶ岳（露木ほか、1981）；三国山（露木ほか、1997）；清川村堂平（露木ほか、1997）；1ex., 清川村堂平～西峰（太礼ノ頭）、5. VII. 2005, 高桑正敏採集。

ニフホソハナカミキリ *Parastrangalis nymphula* (Bates)

愛川町仏果山（荻部ほか、1999）；厚木市七沢（平野ほか、2006）；大山山頂（平野ほか、2006）；津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋、2004）；津久井町鳥屋奥野林道大平～黍穀山（有井・守屋、2004）；津久井町風巻ノ頭（露木ほか、1997）；津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋、2004）；加入道山（露木ほか、1997）；檜洞丸（露木ほか、1997）；山北町箒沢（露木ほか、1981）；山北町地蔵平（露木ほか、1997）；菰釣山（平野、2001e）；1ex., 山北町切通峠 1030m, 5. VI. 2005, 中山和昭採集；三国山～三国峠（露木ほか、1997）；松田町寄沢（露木ほか、1997）；2exs., 鍋割山（南丹沢）、16. VII. 2005, 松原豊採集；清川村タライゴヤ沢（露木ほか、1981）；清川村堂平（露木ほか、1997）；1ex., 西峰（太礼ノ頭）～丹沢山頂、2. VIII. 2005, 深田晋一採集；1ex., 竜ヶ馬場～塔ノ岳、26. VI. 2005, 藤田裕採集。

タテジマホソハナカミキリ *Parastrangalis shikokensis* (Matsushita)

山北町玄倉林道（露木ほか、1997）；山北町高指山（露木ほか、1981）；山北町舟沢（西、1997）；清川村堂平（露木ほか、1997）；蛭ヶ岳（露木ほか、1981）。

ニョウホウホソハナカミキリ *Parastrangalis lesnei* (Pic)

津久井町原小屋～八丁坂ノ頭（露木ほか、1981）；加入道山（露木ほか、1997）；犬越路～大室山（露木ほか、1997）；山北町東沢橋（西、1997）；山北町ユースン（草間・高桑、1984）；山北町高指山（露木ほか、1981）；三国山～三国峠（露木ほか、1997）；2exs., 鍋割山（南丹沢）、16. VII. 2005, 松原豊採集；6exs., 清川村長尾尾根、2. VIII. 2005, 新堀豊彦採集；清川村堂平（露木ほか、1997）；1ex., 清川村堂平～西峰（太礼ノ頭）～丹沢山、16-17. VII. 2005, 小林侑樹採集；1ex., 丹沢山頂、2. VIII. 2005, 深田晋一採集；蛭ヶ岳（草間・高桑、1984）。

ジャコウホソハナカミキリ *Mimostrangalia dulcis* (Bates)

丹沢での記録は少なく、下記が知られるのみ。今回の調査ではマメグミの花から得られた。

津久井町姫次（小林・山口、1972）；菰釣山（露木ほか、1997）；清川村堂平（露木ほか、1981）；1ex., 丹沢山頂付近、17. VII. 2005, 高桑正敏採集；蛭ヶ岳（露木ほか、1981）。

ミヤマホソハナカミキリ *Idiostrangalia contracta* (Bates)

厚木市七沢大沢（平野ほか、2006）；津久井町姫次（小林・山口、1972）；津久井町神ノ川（露木ほか、1997）；加入道山（露木ほか、1997）；山北町ユースン（草間・高桑、1984）；山北町三国峠（露木ほか、1981）；清川村宮ヶ瀬（西、1997）；清川村堂平（露木ほか、1997）；1ex., 西峰（太礼ノ頭）～丹沢山頂、1. VIII. 2005, 深田晋一採集；1ex., 塔ノ岳～丹沢山、4. VIII. 2005, 飯嶋一浩採集；蛭ヶ岳（露木ほか、1981）。

ハコネホソハナカミキリ *Idiostrangalia hakonensis* (Matsushita)

西峰（太礼ノ頭）～丹沢山頂ではアセビおよびシロヤシオの立ち枯れ木から発見され、本種のものと思われる脱出孔も確認できた。また産卵行動も確認された。

大室山（露木ほか、1997）；臼ヶ岳（露木ほか、1981）；山北町ユースン（草間・高桑、1984）；山北町玄倉林道（露木ほか、1981）；1ex., 鍋割山（南丹沢）、16. VII. 2005, 松原豊採集；1ex., 西峰（太礼ノ頭）～丹沢山頂、28. VII. 2005, 深田晋一採集；1ex., 丹沢山頂、21. VII. 2005, 深田晋一採集；清川村天王寺尾根（露木ほか、1997）；棚沢ノ頭（露木ほか、1981）；蛭ヶ岳（露木ほか、1981）。

タケウチホソハナカミキリ *Strangalia takeuchii* Matsushita et Tamanuki

今回の調査によって神奈川県から初めて発見された種で、リュウブの花に飛来した1例だけが知られる。

丹沢山頂（深田、2006）。

ホソコバナカミキリ亜科 *Necydalinae*

トガリバナホソコバナカミキリ *Necydalis (Eonecydalis) formosana niimurai* Hayashi

大山山頂（平野ほか、2006）；加入道山（露木ほか、1997）；大室山～犬越路（露木ほか、1997）；1ex., 山北町切通峠 1050m, 12. VI. 2005, 中山和昭採集；三国山（露木ほか、1981）；清川村堂平（西、1997）；1ex., 西峰（太礼ノ頭）～丹沢山、16. VII. 2005, 藤田裕採集；蛭ヶ岳（露木ほか、1981）。

クロホソコバナカミキリ *Necydalis (Necydalisca) harmandi* Pic

加入道山（露木ほか、1997）；1ex., 熊笹ノ峰、24. VII. 2004, 河合秀樹採集；菰釣山（平野、2001e）；1ex., 鍋割山頂、16. VII. 2005, 松原豊採集；清川村堂平（露木ほか、1997）；1ex., 西峰（太礼ノ頭）～丹沢山頂、28. VII. 2005, 深田晋一採集；丹沢山（西、1997）；1ex., 塔ノ岳～丹沢山、17. VII. 2005, 中村進一採集。

オオホソコバナカミキリ *Necydalis (Necydalisca) solida* Bates

大室山（露木ほか、1997）；加入道山（露木ほか、1997）；1ex., 檜洞丸山頂、26. VI. 2005, 宮谷秀明採集；清川村堂平（露木ほか、1997）；2exs., 清川村堂平～西峰（太礼ノ頭）、5. VII. 2005, 高桑正敏採集；2exs., 丹沢山頂、21. VII. 2005, 深田晋一採集；1ex., 丹沢山～塔ノ岳、17. VII. 2005, 藤田裕採集；棚沢ノ頭（露木ほか、1981）；蛭ヶ岳（露木ほか、1981）。

カミキリ亜科 *Cerambycinae*

アオスジカミキリ *Xystrocera globosa* (Olivier)

ネムノキを寄主植物とし、シイ・カシ帯を生息環境とする。県内では最近の確認例がごく少なく、神奈川県レッドリストでは絶滅危惧Ⅱ類に選定されている。

津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋，2004）。

ミヤマカミキリ *Massicus raddei* (Blessig)

厚木市七沢（相模原市立博物館，2001）；山北町玄倉（露木ほか，1981）；山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班，1972）。

キマダラカミキリ *Aeolesthes (Pseudaolesthes) chrysothrix chrysothrix* (Bates)

愛川町仏果山（苅部ほか，1999）；愛川町経ヶ岳（苅部ほか，1999）；厚木市七沢（高橋，1987）；大山（露木ほか，1981）；山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班，1972）；秦野市弘法山（露木ほか，1997）；lex.，秦野市名古木，13. VI. 2005，高桑正敏採集。

マルクビケマダラカミキリ *Trichoferus campestris* (Faldermann)

上記の3種はいずれもシイ・カシ帯を生息環境とするので、山麓部に少数の記録があるのみ。本種は神奈川県レッドリストで準絶滅危惧とされている。

愛川町檜原（苅部ほか，1999）；厚木市七沢（露木ほか，1997）；清川村宮ヶ瀬（堀井，2003a）。

トビロカミキリ *Allotraeus (Allotraeus) sphaerioninus* Bates

愛川町高取山（苅部ほか，1999）；愛川町経ヶ岳（苅部ほか，1999）；厚木市七沢（平野ほか，2006）；大山山頂（平野ほか，2006）；津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋，2004）；津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋，2004）；犬越路隧道～犬越路（有井・守屋，2004）；三国山（露木ほか，1997）；山北町市間（倉形，1971）；山北町舟沢（西，1997）；lex.，鍋割山～小丸（南丹沢），21. VI. 2005，高桑正敏採集；清川村堂平（露木ほか，1997）；lex.，丹沢山頂～西峰（太礼ノ頭），2. VIII. 2005，深田晋一採集；蛭ヶ岳（露木ほか，1981）。

ヨツボシカミキリ *Stenygrinum quadrinotatum* Bates

ブナ帯にも産するが、主にシイ・カシ帯に生息する種。原因は不明だが全国的に衰退傾向が見られ、神奈川県では1999年の下記厚木市の採集例を最後に記録がなく、レッドリストでは絶滅危惧Ⅰ類に選定されている。

厚木市七沢林道（平野ほか，2006）；山北町ユースン（露木ほか，1997）；山北町箒沢（猪又，1968）；山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班，1972）；山北町市間（倉形，1971）；秦野市大倉（露木ほか，1981）；秦野市渋沢駅付近（中村，2005）；秦野市栄町（中村，2005）；清川村札掛（中村，1964）。

アメイロカミキリ *Stenodryas clavigera clavigera* Bates

愛川町檜原（苅部ほか，1999）；厚木市七沢（平野ほか，2006）；津久井町青根（有井・守屋，2004）；津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋，2004）；津久井町青根犬越路隧道（有井・守屋，2004）；山北町東沢橋（西，1997）；山北町玄倉林道（露木ほか，1997）；山北町皆瀬川（露木ほか，1981）。

トワダムモンメダカミキリ *Stenhomalus lighti* Gressitt

愛川町高取山（露木ほか，1997）；厚木市鐘ヶ嶽（露木ほか，1997）；厚木市七沢唐沢峠（平野ほか，2006）；大山山頂（平野ほか，2006）；津久井町神ノ川（露木ほか，1997）；清川村物見峠（露木ほか，1981）；lex.，清川村堂平～西峰（太礼ノ頭）～丹沢山，10-11. VI. 2006，高桑正敏採集；丹沢山～清川村堂平（平野，1999f）。

タカオメダカミキリ *Stenhomalus takaosanus* Ohbayashi

県内での採集例は少なく下記のみ。
山北町箒沢（山口，1970a）；清川村堂平（露木ほか，1997）；lex.，清川村堂平，18. VI. 2005，小林敏男採集。

キイロメダカミキリ *Stenhomalus nagaoi* Hayashi

県内での採集例は少なく下記のみ。
津久井町青根犬越路隧道（有井・守屋，2004）；清川村札掛（露木ほか，1997）。

タイワンメダカミキリ *Stenhomalus taiwanus* Matsushita

ブナ帯にも産するが、主にシイ・カシ帯に生息する種。丹沢での採集例は少なく下記のみ。

厚木市七沢谷太郎沢（平野ほか，2006）；厚木市七沢唐沢峠（平野ほか，2006）。

カッコウメダカカミキリ *Stenhomalus cleroides* Bates

愛川町経ヶ岳（苅部ほか，1999）；厚木市七沢（高橋，1987）；厚木市広沢寺奥（露木ほか，1981）；厚木市七沢不動尻（平野ほか，2006）；津久井町青山仙洞寺山（有井・守屋，2004）；山北町東沢橋（西，1997）；山北町権現山（露木ほか，1997）；山北町皆瀬川（露木ほか，1981）；秦野市弘法山（露木ほか，1981）；lex.，清川村札掛，17. VII. 2005，新堀豊彦採集。

クロツヤヒゲナガコバネカミキリ *Glaphyra hattorii* (Ohbayashi)

丹沢での採集例は、1967年採集の下記のみが知られる。県内ではほかに川崎市多摩区向ヶ丘遊園で得られていたが、1963年以降は未発見であるため、神奈川県レッドリストで絶滅とされている。
大山（相模原市立博物館，2001）。

コボトケヒゲナガコバネカミキリ *Glaphyra kobotokensis* (Ohbayashi)

県内では津久井から多摩丘陵沿いに横浜市北部まで記録されており、丹沢では下記の1例しか知られていない。
清川村宮ヶ瀬（露木ほか，1997）。

オダヒゲナガコバネカミキリ *Glaphyra gracilis* (Hayashi)

大山（露木ほか，1997）；犬越路～大室山（露木ほか，1997）；山北町白石沢（新堀，1992）；2exs.，山北町大棚沢，8. V. 2005，高桑正敏採集；南丹沢西山林道（露木ほか，1997）；清川村宮ヶ瀬（露木ほか，1981）；清川村札掛（露木ほか，1997）。

ホソツヤヒゲナガコバネカミキリ *Glaphyra nitida nitida* (Obika)

県内での採集例は下記のみ。本属のものは次種を除くと、丹沢ではきわめて少ない。

津久井町神ノ川（平野，1987f）。

コジマヒゲナガコバネカミキリ *Glaphyra kojimai* (Matsushita)

愛川町経ヶ岳（苅部ほか，1999）；厚木市七沢（平野ほか，2006）；厚木市広沢寺奥（露木ほか，1981）；大山（平野ほか，2006）；lex.，津久井町早戸川林道，1. V. 2005，新堀豊彦採集；2exs.，山北町ユースン，8. V. 2005，小林敏男採集；lex.，山北町大又沢，5. V. 2005，新堀豊彦採集；3exs.，山北町大棚沢，8. V. 2005，高桑正敏採集；松田町寄沢（露木ほか，1997）；秦野市弘法山（露木ほか，1981）；lex.，清川村塩水林道660m，3. VI. 2004，中山和昭採集；清川村堂平（露木ほか，1997）；lex.，清川村堂平～西峰（太礼ノ頭）～丹沢山，17. VI. 2006，高桑正敏採集。

ホタルカミキリ *Dere thoracica* White

厚木市七沢大沢（平野ほか，2006）；大山（相模原市立博物館，2001）；津久井町鳥屋（露木ほか，1997）；津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋，2004）；lex.，津久井町早戸川林道，1. V. 2005，新堀豊彦採集；津久井町神ノ川（露木ほか，1997）；山北町東沢橋（西，1997）；山北町箒沢（猪又，1968）；山北町皆瀬川（露木ほか，1981）；秦野市弘法山（露木ほか，1981）；清川村煤ヶ谷（露木ほか，1981）；清川村宮ヶ瀬（露木ほか，1997）；清川村札掛（露木ほか，1981）。

トラフソバネカミキリ *Thranium variegatus variegatus* Bates

厚木市七沢二の足林道（平野ほか，2006）；山北町東沢林道（平野，1996b）；山北町浅瀬入口（河合，2004a）；山北町大野山（簡野，2000）；山北町大門沢（西，1997）；松田町寄（露木ほか，1997）；秦野市堀西（簡野，2004）；清川村札掛（岩田・榎原，1997）；清川村一ノ沢モミ考証林（榎原ほか，1993）。

クスベニカミキリ *Pyrestes nipponicus* Hayashi

厚木市七沢二の足林道（平野ほか，2006）；山北町水ノ木林道（露木ほか，1997）；秦野市大倉（露木ほか，1981）。

ルリボシカミキリ *Rosalia (Rosalia) batesi* Harold

丹沢から初めて発見されたのが山北町箒沢の1968年であったが、その後は各地で採集されるようになり、1990年代にはほぼ全体に広がった（高桑，2000b）。

愛川町仏果山（苅部ほか，1999）；厚木市七沢（平野ほか，2006）；大山北尾根（平野ほか，2006）；津久井町鳥屋（露木ほか，1997）；津久井町鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋，2004）；大室山（露木ほか，1997）；加入道山（露木ほか，1997）；lex.，檜洞丸～熊笹ノ峰，1. VIII. 2004，川上翔平採集；lex. 目撃，山北町玄倉，13. VII. 2004，加藤ゆき；山北町中川温泉（露木ほか，1981）；山北町箒沢（露木ほか，1981）；山北町大又沢（露木ほか，1981）；山北町世附（露木ほか，1981）；菰釣山（平野，2001e）；山北町明神峠（露木ほか，1997）；山北町河内川上流（芦沢，2000a）；松田町高松（高桑，2000b）；秦野市八

沢(高桑, 2000b); 秦野市菩提(高桑, 2000b); 清川村宮ヶ瀬(露木ほか, 1997); 1ex., 清川村札掛, 16. VII. 2005, 新堀豊彦採集; 1ex., 清川村堂平~丹沢山, 5-6. VIII. 2006, 加賀玲子採集; 丹沢山(露木ほか, 1997); 1ex., 塔ノ岳~丹沢山, 4. VIII. 2005, 飯嶋一浩採集; 蛭ヶ岳(露木ほか, 1981).

アオカミキリ *Schwarzerium quadricolle* (Bates)

厚木市七沢(露木ほか, 1997); 山北町大野山(渡辺恭平, 2004d); 秦野市大倉(露木ほか, 1981).

ミドリカミキリ *Chloridolum (Leontium) viride* (Thomson)

一般にはブナ帯にもふつうな種であるが、丹沢では高標高地での記録はないようである。神奈川県レッドリストで準絶滅危惧とされ、低地では衰亡が著しく、また丹沢でも最近の採集例は少ないようである。

厚木市七沢(露木ほか, 1997); 山北町皆瀬川(東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 秦野市弘法山(露木ほか, 1997).

オオアオカミキリ *Chloridolum (Chloridolum) thaliodes* Bates

丹沢での採集例は、1968年採集の下記のみが知られる。神奈川県レッドリストでは情報不足 A に選定されている。

山北町箒沢(小林・高桑, 2004).

ベニカミキリ *Purpuricenus (Sternopolistes) temminckii* (Guerin-Meneville)

愛川町仏果山(苜部ほか, 1999); 厚木市七沢大沢(平野ほか, 2006); 大高山山頂(平野ほか, 2006); 伊勢原市日向(相模原市立博物館, 2001); 津久井町鳥屋(露木ほか, 1997); 津久井町青根犬越路隧道(有井・守屋, 2004); 山北町東沢橋(西, 1997); 山北町箒沢(猪又, 1968); 秦野市大倉(露木ほか, 1981); 秦野市菩提(中村, 1964); 秦野市善波峠(露木ほか, 1997); 清川村宮ヶ瀬(露木ほか, 1981).

ヘリグロベニカミキリ *Purpuricenus (Sternopolistes) spectabilis* Motschulsky

愛川町高取山(苜部ほか, 1999); 厚木市七沢(平野ほか, 2006); 大高山山頂(平野ほか, 2006); 津久井町鳥屋越路峠(有井・守屋, 2004); 津久井町鳥屋奥野林道大平~黍殻山(有井・守屋, 2004); 津久井町青根(有井・守屋, 2004); 津久井町青根神ノ川広河原(有井・守屋, 2004); 1ex., 檜洞丸(ゴウラ沢出合~西丹沢自然教室), 26. VI. 2005, 宮谷秀明採集; 1ex., 山北町切通峠 1030m, 12. VI. 2005, 中山和昭採集; 山北町皆瀬川(東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 秦野市弘法山(露木ほか, 1997); 清川村煤ヶ谷(露木ほか, 1981); 清川村宮ヶ瀬(露木ほか, 1981); 清川村堂平(露木ほか, 1997); 丹沢山(西, 1997).

スギカミキリ *Semanotus japonicus* (Lacordaire)

厚木市七沢(露木ほか, 1997); 津久井町鳥屋奥野林道(有井・守屋, 2004); 清川村宮ヶ瀬(露木ほか, 1981).

ヒメスギカミキリ *Palaeocallidium (Callidiellum) rufipenne* (Motschulsky)

愛川町高取山(苜部ほか, 1999); 愛川町経ヶ岳(苜部ほか, 1999); 厚木市七沢(高橋, 1987); 厚木市鐘ヶ嶽(平野ほか, 2006); 大高山山頂(平野ほか, 2006); 津久井町鳥屋松茸山(有井・守屋, 2004); 山北町地蔵平(露木ほか, 1997); 山北町水ノ木沢(露木ほか, 1981); 1ex., 山北町切通峠 1070m, 22. V. 2005, 中山和昭採集; 山北町皆瀬川(東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 秦野市善波峠(露木ほか, 1997); 清川村宮ヶ瀬(露木ほか, 1981); 清川村堂平(露木ほか, 1997).

チャイロホソヒラタカミキリ *Phymatodes (Phymatodes) testaceus* (Linnaeus)

厚木市七沢大沢(平野ほか, 2006); 大高山山頂(平野ほか, 2006); 津久井町早戸川入口(露木ほか, 1997); 津久井町此間沢(露木ほか, 1981); 山北町大又沢(露木ほか, 1981); 松田町寄沢(露木ほか, 1997); 秦野市大倉(露木ほか, 1981); 清川村煤ヶ谷(露木ほか, 1981).

シロオビチビヒラタカミキリ *Phymatodes (Paraphymatodes) albicinctus* Bates

愛川町経ヶ岳(苜部ほか, 1999); 厚木市七沢弁天の森(平野ほか, 2006); 大山(相模原市立博物館, 2001); 1ex., 山北町切通峠 1030m, 12. VI. 2005, 中山和昭採集; 蛭ヶ岳(露木ほか, 1981).

アカネカミキリ *Phymatodes (Poecilium) maaki* (Kraatz)

上記2種はいずれもブドウ類を寄主植物とするが、なぜか丹沢では採集例が少ない。

厚木市七沢弁天の森(平野ほか, 2006); 厚木市七沢唐沢峠(平野ほか, 2006); 津久井町神ノ川(平野, 1987f); 加入道山(露木ほか, 1997); 1ex., 山北町切通峠 1020m, 12. VI. 2005, 中山和昭採集; 秦野市ヤビツ峠(平山, 1983); 清川村堂平(露木ほか, 1997).

オオトラカミキリ *Xylotrechus villioni* (Villard)

東丹沢では各地のモミに本種の加害痕を見るが、成虫の採集例は非常に少ない。

清川村宮ヶ瀬(川下, 1994; 平原, 2005).

トラフカミキリ *Xylotrechus chinensis* (Chevrolat)

ブナ帯にも産するが、主にシイ・カシ帯に生息する種。

山北町山神峠(露木ほか, 1981); 山北町地蔵平(小林・山口, 1972); 山北町葦尾根(露木ほか, 1981).

クビアカトラカミキリ *Xylotrechus rufilius rufilius* Bates

最近になって県内西部の各地から急に発見されるようになった種で、あるいは人為的に持ち込まれたものに端を発しているかもしれない(高桑・堀井, 2004).

厚木市七沢二の足林道(平野ほか, 2006); 山北町大野山山麓(高桑・堀井, 2004); 1ex., 秦野市名古木, 13. VI. 2005, 高桑正敏採集; 清川村宮ヶ瀬(堀井, 2001).

ウスイロトラカミキリ *Xylotrechus cuneipennis* (Kraatz)

愛川町高取山(苜部ほか, 1999); 愛川町経ヶ岳(苜部ほか, 1999); 厚木市七沢(高橋, 1987); 厚木市七沢不動丸(平野ほか, 2006); 大高山山頂(平野ほか, 2006); 津久井町鳥屋越路峠(有井・守屋, 2004); 津久井町青根(露木ほか, 1981); 津久井町神ノ川林道矢駄沢上(有井・守屋, 2004); 大室山(露木ほか, 1997); 1ex., 檜洞丸山頂, 6. VIII. 2005, 宮谷秀明採集; 山北町ユーシン(露木ほか, 1997); 山北町箒沢(猪又, 1968); 1ex., 山北町切通峠~鉄砲木の頭, 21. VII. 2005, 藤田裕採集; 山北町大門沢(西, 1997); 清川村物見峠(芦沢, 1977); 清川村宮ヶ瀬(露木ほか, 1981); 清川村堂平(露木ほか, 1997); 1ex., 西峰(太礼ノ頭)南方尾根 1270m, 16. VII. 2005, 深田晋一採集; 丹沢山(露木ほか, 1997); 塔ノ岳(相模原市立博物館, 2001); 蛭ヶ岳(小林・山口, 1972).

ムネマダラトラカミキリ *Xylotrechus grayii grayii* (White)

丹沢での記録は下記のみ。県内ではほかに三浦半島に生息しており、神奈川県レッドリストでは準絶滅危惧に選定されている。山北町大野山(露木, 2005a).

ブドウトラカミキリ *Xylotrechus pyrrhoderus pyrrhoderus* Bates

もともとシイ・カシ帯に多いもので、神奈川県レッドリストでは準絶滅危惧に選定されている。

津久井町鳥屋中開戸(相模原市立博物館, 2001); 山北町皆瀬川(東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972).

ニジマトラカミキリ *Xylotrechus emaciatius* Bates

愛川町仏果山(苜部ほか, 1999); 大山(露木ほか, 1981); 津久井町鳥屋越路峠(有井・守屋, 2004); 津久井町鳥屋早戸川~本間ノ頭下(有井・守屋, 2004); 津久井町青根(露木ほか, 1981); 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上(有井・守屋, 2004); 犬越路(露木ほか, 1981); 山北町白石沢(露木ほか, 1997); 2exs., 檜洞丸(西丹沢自然教室~ゴウラ沢出合), 10. VII. 2004, 宮谷秀明採集; 山北町箒沢(猪又, 1968); 山北町浅瀬~水ノ木橋(芦沢, 2000b); 山北町高指山~切通峠(露木ほか, 1981); 三国山(露木ほか, 1997); 山北町河内川上流(芦沢, 2000a); 山北町大門沢(西, 1997); 1ex., 清川村境沢林道, 17. VII. 2005, 新堀豊彦採集; 清川村堂平(露木ほか, 1997); 2exs., 清川村堂平~西峰(太礼ノ頭)~丹沢山, 7. VIII. 2005, 高桑正敏採集; 清川村天王寺尾根(露木ほか, 1981).

ヤマトシロオビトラカミキリ *Kazuochytus lautoides* (Hayashi)

神奈川県では津久井と大山周辺でしか記録されていない。モミが寄主植物。

大山(登石, 1957; 露木ほか, 1997); 大山追分付近(遠藤, 1970); 清川村札掛(露木ほか, 1997).

キンケトラカミキリ *Clytus auripilis* Bates

厚木市七沢弁天の森(平野ほか, 2006); 大高山山頂(平野ほか, 2006); 津久井町寺入沢(露木ほか, 1997); 1ex., 山北町切通峠 1030m, 12. VI. 2005, 中山和昭採集; 山北町皆瀬川(露木ほか, 1981); 山北町舟沢(西, 1997); 秦野市弘法山(露木ほか,

1981); 清川村上村 (露木ほか, 1981).

シラケトラカミキリ *Clytus melaeus* Bates

山北町東沢橋 (西, 1997); 山北町箒沢 (露木ほか, 1981); 三国山 (露木ほか, 1997); 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 秦野市大倉 (露木ほか, 1981); 1ex., 秦野市名古木, 13. VI. 2005, 高桑正敏採集; 清川村札掛 (露木ほか, 1981).

キスジトラカミキリ *Cyrtoclytus caproides caproides* Bates

厚木市七沢 (高橋, 1987); 厚木市七沢不動尻 (平野ほか, 2006); 大南山尾根 (平野ほか, 2006); 津久井町鳥屋 (露木ほか, 1997); 津久井町鳥屋奥野林道 (有井・守屋, 2004); 津久井町青根 (露木ほか, 1981); 津久井町神ノ川 (露木ほか, 1981); 山北町玄倉山神峠 (相模原市立博物館, 2001); 山北町箒沢 (猪又, 1968); 山北町地蔵平 (露木ほか, 1997); 山北町大野山 (露木ほか, 1981); 山北町大門沢 (西, 1997); 秦野市弘法山 (露木ほか, 1981); 清川村物見峠 (芦沢, 1977); 清川村宮ヶ瀬 (相模原市立博物館, 2001); 清川村札掛 (露木ほか, 1997); 1ex., 清川村長尾尾根, 2. VIII. 2005, 新堀豊彦採集; 清川村堂平 (露木ほか, 1997); 1ex., 丹沢山頂, 2. VIII. 2005, 深田晋一採集; 清川村天王寺尾根 (露木ほか, 1981); 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

アカネトラカミキリ *Brachyclytus singularis* Kraatz

神奈川県レッドリストで準絶滅危惧とされている。低地では壊滅状態と推定され、丹沢でも最近の記録は少ない。

愛川町高取山 (露木ほか, 1997); 大南山山頂 (平野ほか, 2006); 大山 (斉藤, 1980); 津久井町鳥屋越路峠 (有井・守屋, 2004); 大室山 (露木ほか, 1981).

ヨコヤマトラカミキリ *Epiclytus yokoyamai* (Kano)

大山 (宮川, 1963); 津久井町梶野 (西村, 1987a); 津久井町梶ヶ原 (西村, 1987a); 津久井町青根 (西村, 1987a); 山北町皆瀬川高杉 (山崎, 1985); 松田町高松山 (山崎, 1985); 秦野市大倉 (中村, 2005); 南丹沢西山林道 (露木ほか, 1997); 秦野市弘法山 (中村, 2005); 清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1981); 清川村堂平 (西, 1997).

カンボウホソトラカミキリ *Hayashicytus acutivittis inscriptus* (Bates)

県内における記録は下記のみ。

蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

クロトラカミキリ *Chlorophorus diadema inhirsutus* Matsushita

神奈川県レッドリストで絶滅危惧II類とされている。丹沢では山北町で得られているが、今回の調査では発見できなかった。犬越路 (露木ほか, 1981); 山北町箒沢 (露木ほか, 1981); 山北町浅瀬 (露木ほか, 1997).

エグリトラカミキリ *Chlorophorus japonicus* (Chevrolat)

愛川町仏果山 (荻部ほか, 1999); 愛川町経ヶ岳 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 大山 (相模原市立博物館, 2001); 津久井町鳥屋奥野林道 (有井・守屋, 2004); 津久井町青野原 (有井・守屋, 2004); 津久井町青根 (有井・守屋, 2004); 津久井町青根神ノ川広河原 (有井・守屋, 2004); 山北町箒沢 (猪又, 1968); 山北町地蔵平 (露木ほか, 1997); 山北町浅瀬 (露木ほか, 1981); 山北町皆瀬川 (露木ほか, 1981); 山北町舟沢 (西, 1997); 秦野市大倉 (露木ほか, 1981); 秦野市弘法山 (露木ほか, 1981); 清川村物見峠 (芦沢, 1977); 清川村宮ヶ瀬～石小屋 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (露木ほか, 1997); 清川村堂平 (露木ほか, 1997); 1ex., 丹沢山頂～西峰 (太礼ノ頭), 22. VII. 2005, 深田晋一採集; 棚沢ノ頭 (露木ほか, 1981).

ヨツスジトラカミキリ *Chlorophorus quinquefasciatus* (Castelnau et Goly)

西丹沢 (露木ほか, 1981); 清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1981).

典型的なシイ・カシ帯の要素の1つで、海岸近くに多い種である。

フタオビミドリトラカミキリ *Chlorophorus muscosus* (Bates)

シイ・カシ帯の海岸近くに多い種であるが、西丹沢では各地に姿を見る。

大南山山頂 (平野ほか, 2006); 犬越路 (露木ほか, 1981); 山北町西沢出合 (露木ほか, 1997); 1ex., 山北町玄倉川, 19. VII. 2004, 松原豊採集; 山北町箒沢 (露木ほか, 1981); 山北町大又沢 (露木ほか, 1981).

タケトラカミキリ *Chlorophorus annularis* (Fabricius)

厚木市七沢 (露木ほか, 1997); 津久井町此間沢 (露木ほか, 1981); 津久井町姫次 (小林・山口, 1972).

キイロトラカミキリ *Grammographus notabilis notabilis* (Pascoe)

厚木市七沢 (相模原市立博物館, 2001); 大山 (相模原市立博物館, 2001); 津久井町鳥屋越路峠 (有井・守屋, 2004); 津久井町青野原 (有井・守屋, 2004); 津久井町此間沢 (露木ほか, 1981); 津久井町青根日陰沢新道大室山 (有井・守屋, 2004); 山北町箒沢 (露木ほか, 1981); 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 山北町舟沢 (西, 1997); 秦野市大倉 (露木ほか, 1981); 秦野市弘法山 (露木ほか, 1997); 清川村煤ヶ谷 (露木ほか, 1981); 清川村宮ヶ瀬 (芦沢, 1977); 1ex., 清川村堂平～西峰 (太礼ノ頭)～丹沢山, 7. VIII. 2005, 高桑正敏採集。

ホソトラカミキリ *Rhaphuma xenisca* (Bates)

愛川町高取山 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢 (露木ほか, 1997); 津久井町鳥屋奥野林道 (有井・守屋, 2004); 山北町箒沢 (猪又, 1968); 清川村札掛 (露木ほか, 1997); 清川村堂平 (西, 1997); 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

ヒメクロトラカミキリ *Rhaphuma diminuta diminuta* (Bates)

愛川町経ヶ岳 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 大山追分付近 (遠藤, 1970); 伊勢原市日向山 (露木ほか, 1997); 津久井町鳥屋越路峠 (有井・守屋, 2004); 3exs., 津久井町早戸川林道, 1. V. 2005, 新堀豊彦採集; 津久井町青根神ノ川広河原～源蔵新道 (有井・守屋, 2004); 津久井町青根神ノ川林道日陰沢橋 (有井・守屋, 2004); 山北町白石沢 (新堀, 1992); 山北町東沢橋 (西, 1997); 1ex., 山北町ユーシシ, 8. V. 2005, 小林敏男採集; 1ex., 山北町水の木沢, 5. V. 2006, 新堀豊彦採集; 1ex., 山北町切通峠 1030m, 12. VI. 2005, 中山和昭採集; 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 山北町八丁 (露木ほか, 1981); 南丹沢西山林道 (露木ほか, 1997); 秦野市弘法山 (露木ほか, 1981); 清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (露木ほか, 1981); 清川村堂平 (露木ほか, 1997).

トゲヒゲトラカミキリ *Demonax transilis* Bates

愛川町高取山 (荻部ほか, 1999); 愛川町経ヶ岳 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢大沢 (平野ほか, 2006); 大南山山頂 (平野ほか, 2006); 津久井町鳥屋越路峠 (有井・守屋, 2004); 津久井町鳥屋奥野林道大平～黍殻山 (有井・守屋, 2004); 津久井町青野原 (有井・守屋, 2004); 1ex., 津久井町青根 730m, 22. V. 2004 中山和昭採集; 津久井町青根神ノ川広河原 (有井・守屋, 2004); 津久井町青根日陰沢新道大室山 (有井・守屋, 2004); 山北町世附 (露木ほか, 1981); 1ex., 山北町大棚沢, 8. V. 2005 高桑正敏採集; 6exs., 山北町水の木沢林道, 5. V. 2005 新堀豊彦採集; 1ex., 山北町切通峠～鉄砲木の頭, 21. VII. 2005 藤田裕採集; 山北町市間 (倉形, 1971); 4exs., 山北町富士見林道, 5. V. 2005 新堀豊彦採集; 松田町寄沢 (露木ほか, 1997); 1ex., 鍋割山～小丸 (南丹沢), 21. VI. 2005 高桑正敏採集; 南丹沢西山林道 (露木ほか, 1997); 秦野市弘法山 (露木ほか, 1981); 秦野市諸戸 (露木ほか, 1997); 清川村谷太郎 (守屋, 1997d); 清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (露木ほか, 1981); 清川村堂平 (西, 1997); 1ex., 丹沢山頂～西峰 (太礼ノ頭), 2. VIII. 2005, 深田晋一採集。

シロトラカミキリ *Parachlytus excultus* Bates

厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 大南山山頂 (平野ほか, 2006); 津久井町鳥屋松茸山 (有井・守屋, 2004); 1ex., 津久井町伊勢沢林道, 1. V. 2005, 新堀豊彦採集; 津久井町蛙沢 (小林・山口, 1972); 1ex., 津久井町姫次 1230m, 12. VI. 2004, 中山和昭採集; 津久井町青根神ノ川広河原 (有井・守屋, 2004); 犬越路～大室山 (平野, 1998f); 山北町白石沢 (新堀, 1989); 山北町東沢 (露木ほか, 1997); 檜洞丸 (露木ほか, 1997); 1ex., 山北町ユーシシ溪谷, 8. V. 2005, 平野幸彦採集; 山北町箒沢 (露木ほか, 1981); 山北町蛙ヶ丸山 (露木ほか, 1997); 山北町水の木沢 (露木ほか, 1981); 山北町高指山 (露木ほか, 1997); 1ex., 山北町切通峠 1090m, 22. V. 2005, 中山和昭採集; 三国山 (露木ほか, 1997); 2exs., 山北町富士見林道 5. V. 2005, 新堀豊彦採集; 1ex., 鍋割山 (南丹沢), 5. V. 2006, 磯輪亮太採集; 秦野市菩提 (露木ほか, 1981); 清川村宮ヶ瀬七曲 (露木ほか, 1981); 1ex., 清川村境沢林道, 17. VII. 2005, 新堀豊彦採集; 清川村堂平 (西, 1997); 1ex., 丹沢山頂, 2. VIII. 2005, 深田晋一採集; 丹沢山～

蛭ヶ岳 (平野, 1999f).

アカジマトラカミキリ *Anaglyptus (Akajimatora) bellus bellus* Matsumura et Matsushita

大山 (上田, 1984b); 山北町熊木沢 (平野, 1986c); 山北町浅瀬 (露木ほか, 1981).

トガリバアカネトラカミキリ *Anaglyptus (Anaglyptus) niponensis* Bates
愛川町高取山 (荻部ほか, 1999); 愛川町経ヶ岳 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢 (高橋, 1987); 厚木市七沢不動尻 (平野ほか, 2006); 大山 (相模原市立博物館, 2001); 2exs., 津久井町早戸川林道, 1. V. 2005, 新堀豊彦採集; 1ex., 加入道山~大室山, 30. VII. 2005, 高橋和弘採集; 津久井町青根犬越路隧道~犬越路 (有井・守屋, 2004); 山北町玄倉林道 (露木ほか, 1981); 山北町箒沢 (露木ほか, 1981); 1ex., 山北町大瀬沢 (世附), 4. VI. 2006, 新堀豊彦採集; 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 秦野市大倉 (露木ほか, 1981); 秦野市弘法山 (露木ほか, 1981); 清川村宮ヶ瀬~石小屋 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (平野, 1987h); 清川村堂平 (露木ほか, 1997).

スギノアカネトラカミキリ *Anaglyptus (Anaglyptus) subfasciatus subfasciatus* Pic

スギの害虫としてよく知られ, 県内では平地や低山に広く分布する。大山追分付近 (遠藤, 1970); 山北町大野山 (渡辺恭平, 2004d).

エゾトラカミキリ *Oligoenoplus rosti rosti* (Pic)

県内ではこれまで堂平でのみ知られていたが, 今回の調査で檜洞丸からも発見された。

1ex., 檜洞丸山頂, 25. VI. 2005, 宮谷秀明採集; 清川村堂平 (平野, 1999f); 1ex., 清川村堂平 1060m, 3. VI. 2004, 中山和昭採集。

フトカミキリ亜科 Lamiinae

シロオビゴマフカミキリ *Falsomesosella (Falsomesosella) gracilior* (Bates)

厚木市七沢 (露木ほか, 1997); 厚木市七沢弁天の森 (平野ほか, 2006); 1ex., 津久井町伊勢沢林道, 13. VII. 2005, 新堀豊彦採集; 1ex., 津久井町姫次 1340m, 12. VI. 2004, 中山和昭採集; 山北町箒沢 (露木ほか, 1981); 山北町皆瀬川 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (露木ほか, 1997).

ゴマフカミキリ *Mesosa (Mesosa) myops japonica* Bates

愛川町高取山 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 大山山頂 (平野ほか, 2006); 津久井町鳥屋 (相模原市立博物館, 2001); 津久井町鳥屋松茸山 (有井・守屋, 2004); 津久井町鳥屋奥野林道大平 (有井・守屋, 2004); 津久井町青野原山中 (有井・守屋, 2004); 津久井町此間沢 (露木ほか, 1981); 山北町東沢橋 (西, 1997); 1ex., 山北町切通峠 1040m, 12. VI. 2005, 中山和昭採集; 山北町市間 (倉形, 1971); 秦野市大倉 (露木ほか, 1981); 清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1981).

ヨツボシシロオビゴマフカミキリ *Mesosa (Mesosa) mediofasciata* Breuning

津久井町荒川林道 (岩田・榊原, 1997); 清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1997); 清川村札掛 (露木ほか, 1997).

タテジゴマフカミキリ *Mesosa (aphelocnemis) senilis* Bates

大山 (Bates, 1884); 大室山 (露木ほか, 1997); 檜洞丸 (露木ほか, 1997); 山北町山神峠 (露木ほか, 1981); 清川村堂平 (露木ほか, 1997).

ナガゴマフカミキリ *Mesosa (aphelocnemis) longipennis* Bates

愛川町檜原 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 厚木市七沢不動尻 (平野ほか, 2006); 大山 (露木ほか, 1981); 伊勢原市日向 (上田, 1986); 津久井町鳥屋松茸山 (有井・守屋, 2004); 津久井町鳥屋荒沢林道 (有井・守屋, 2004); 津久井町青根 (露木ほか, 1981); 津久井町日陰沢 (露木ほか, 1997); 山北町箒沢 (猪又, 1968); 山北町三国峠 (露木ほか, 1997); 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972).

カタジゴマフカミキリ *Mesosa (Perimesosa) hirsuta hirsuta* Bates

厚木市七沢大沢 (平野ほか, 2006); 伊勢原市日向山 (露木ほか, 1997); 津久井町鳥屋 (露木ほか, 1997); 津久井町鳥屋早戸川林道三日月橋 (有井・守屋, 2004); 津久井町青根 (露木ほか, 1981); 山北町ユースン (露木ほか, 1997); 山北町中川温泉 (露木ほか, 1981); 山北町箒沢 (猪又, 1968); 山北町大又沢 (露

木ほか, 1981); 丹沢湖 (露木ほか, 1997); 秦野市弘法山 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (露木ほか, 1997).

シナノクロフカミキリ *Asaperda agapanthina agapanthina* Bates

愛川町高取山 (荻部ほか, 1999); 愛川町経ヶ岳 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢山の神 (平野ほか, 2006); 津久井町青山仙洞寺山 (有井・守屋, 2004); 山北町東沢橋 (西, 1997); 山北町玄倉 (露木ほか, 1997); 山北町蛙ヶ丸山 (露木ほか, 1997); 山北町大又沢 (露木ほか, 1981); 1ex., 山北町切通峠 1030m, 5. VI. 2005, 中山和昭採集; 三国山 (露木ほか, 1997); 山北町市間 (倉形, 1971); 松田町寄沢 (露木ほか, 1997); 南丹沢西山林道 (露木ほか, 1997); 秦野市弘法山 (露木ほか, 1981); 秦野市ヤビツ峠 (露木ほか, 1997); 清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1981); 清川村堂平 (露木ほか, 1997); 丹沢山 (平野, 1999f).

キクスイモドキカミキリ *Asaperda rufipes rufipes* Bates

愛川町高取山 (露木ほか, 1997); 厚木市七沢大沢 (平野ほか, 2006); 津久井町長者舎大谷 (守屋, 1994b); 山北町東沢橋 (西, 1997); 山北町玄倉林道 (露木ほか, 1997); 清川村札掛 (岩田・榊原, 1997).

コブスジサビカミキリ *Atimura japonica* Bates

厚木市七沢大沢 (平野ほか, 2006); 大山 (露木ほか, 1981); 津久井町早戸川 (露木ほか, 1997); 山北町箒沢 (露木ほか, 1981); 秦野市上大倉 (露木ほか, 1997); 南丹沢西山林道 (露木ほか, 1997); 丹沢山 (露木ほか, 1981).

クビジロカミキリ *Xylariopsis (Xylariopsis) mimica* Bates

厚木市七沢 (中山, 1983); 大山 (露木ほか, 1997).

ヒシカミキリ *Microlera ptnoides* Bates

愛川町高取山 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 厚木市七沢不動尻 (平野ほか, 2006); 大山 (露木ほか, 1997); 津久井町青野原 (有井・守屋, 2004); 津久井町青根夫婦園 (有井・守屋, 2004); 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 秦野市上大倉 (露木ほか, 1997); 秦野市弘法山 (露木ほか, 1981); 清川村谷太郎谷 (露木ほか, 1981).

クリチビカミキリ *Sybra (Microzotale) kuri* Ohbayashi et Hayashi

県内では局地的な分布を示し, 丹沢では下記しか知られていない。津久井町青根 (有井・守屋, 2004).

キボシチビカミキリ *Sybra (sybra) flavomaculata* Breuning

愛川町経ヶ岳 (荻部ほか, 1999); 秦野市大倉 (露木ほか, 1981); 清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1997); 清川村札掛 (露木ほか, 1997).

ヒトオビチビカミキリ *Sybra (sybra) unifasciatus* Fujimura

丹沢での記録は下記のみ。

清川村札掛一ノ沢 (榊原ほか, 1993).

シロオビチビカミキリ *Sybra (Sybrodiboma) subfasciata subfasciata* Bates

愛川町高取山 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 大山山頂 (平野ほか, 2006); 伊勢原市日向 (上田, 1986); 津久井町鳥屋松茸山 (有井・守屋, 2004); 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋 (有井・守屋, 2004); 犬越路 (平野, 1998f); 1ex., 檜洞丸 (西丹沢自然教室~ゴウラ沢出合), 10. VII. 2004, 宮谷秀明採集; 檜洞丸 (露木ほか, 1997); 山北町水ノ木沢 (露木ほか, 1997); 菰釣山 (平野, 2001e); 山北町切通峠 (露木ほか, 1997); 三国山 (露木ほか, 1997); 清川村堂平 (西, 1997); 1ex., 塔ノ岳~丹沢山, 4. VIII. 2005, 飯嶋一浩採集; 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

ハスオビヒゲナガカミキリ *Cleptometopus bimaculatus* (Bates)

愛川町経ヶ岳 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 大山 (相模原市立博物館, 2001); 津久井町鳥屋松茸山 (有井・守屋, 2004); 山北町東沢橋 (西, 1997); 山北町大又沢 (露木ほか, 1981); 山北町水ノ木沢 (露木ほか, 1997); 山北町三国峠 (露木ほか, 1997); 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 清川村谷太郎谷 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (岩田・榊原, 1997); 清川村堂平 (露木ほか, 1997).

ドウボソカミキリ *Pseudocalamobius japonicus* (Bates)

関東地方にはほかにミヤマドウボソカミキリが分布するが, 神奈川県産はその種との関係で詳細な検討がなされていない。ここでは丹沢産すべてを本種に含めたが, 暫定的な処置である。

愛川町檜原 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢 (平野ほか,

2006)；大山山頂(平野ほか, 2006)；津久井町早戸川林道(露木ほか, 1997)；加入道山(露木ほか, 1997)；津久井町青根犬越路隧道～犬越路(有井・守屋, 2004)；山北町箒沢(露木ほか, 1981)；山北町水ノ木沢(露木ほか, 1997)；山北町三国峠(露木ほか, 1997)；松田町寄沢(露木ほか, 1997)；lex., 鍋割山～小丸(南丹沢), 21. VI. 2005, 高桑正敏採集；秦野市大倉(露木ほか, 1981)；清川村堂平(西, 1997)；lex., 丹沢山頂付近, 26. VI. 2005, 高桑正敏採集；丹沢山～清川村天王寺尾根(平野, 1999f)；蛭ヶ岳(露木ほか, 1981)。

タテジマカミキリ *Aulaconotus pachyzeoides* Thomson

ブナ帯にも産するが、シイ・カシ帯の海岸近くに多い。下記は植栽のカクレミノから得られたもので、供給地から運ばれたものに起因している可能性も考えられる。

厚木市七沢(露木ほか, 1997)。

ハイイロヤハズカミキリ *Niphona (Niphona) furcata* (Bates)

ブナ帯にも産するが、主にシイ・カシ帯に生息する種。

厚木市(草間・高桑, 1984)；厚木市七沢(高橋, 1987)。

マルモンサビカミキリ *Pterolophia (pterolophia) angusta* (Bates)

丹沢での記録は下記にすぎないが、西丹沢で採集された個体を検したことがある。

大山山頂(露木ほか, 1981)；津久井町青野原(有井・守屋, 2004)。

アトジロサビカミキリ *Pterolophia (Pterolophia) zonata* (Bates)

愛川町高取山(苧部ほか, 1999)；愛川町仏果山(苧部ほか, 1999)；厚木市七沢(相模原市立博物館, 2001)；大山(大林ほか, 1992)；津久井町鳥屋伊勢沢林道(有井・守屋, 2004)；津久井町青野原梶野(守屋, 1994b)；津久井町青根長者舎(有井・守屋, 2004)；山北町東沢橋(西, 1997)；山北町地蔵平(露木ほか, 1997)；丹沢湖(露木ほか, 1997)；山北町大野山(露木ほか, 1981)；清川村宮ヶ瀬(芦沢, 1977)；lex., 清川村塩水林道 410m, 3. VI. 2004, 中山和昭採集。

トガリシロオビサビカミキリ *Pterolophia (Pterolophia) caudata caudata* (Bates)

愛川町高取山(苧部ほか, 1999)；厚木市七沢(平野ほか, 2006)；大山(露木ほか, 1981)；津久井町青山仙洞寺山(有井・守屋, 2004)；津久井町鳥屋越路峠(有井・守屋, 2004)；津久井町鳥屋早戸川林道魚止橋(有井・守屋, 2004)；津久井町青根(小林・山口, 1972)；津久井町青根長者舎(有井・守屋, 2004)；加入道山(露木ほか, 1997)；犬越路(露木ほか, 1997)；山北町用木沢(露木ほか, 1997)；lex., 檜洞丸(西丹沢自然教室～ゴウラ沢出合), 10. VII. 2004, 宮谷秀明採集；山北町熊木沢(露木ほか, 1981)；山北町ユースン(露木ほか, 1997)；山北町箒沢(露木ほか, 1981)；山北町大又沢(露木ほか, 1981)；丹沢湖(露木ほか, 1997)；山北町鉄砲木ノ頭(露木ほか, 1981)；山北町大野山(露木ほか, 1997)；秦野市上大倉(露木ほか, 1997)；秦野市ヤビツ峠(露木ほか, 1997)；清川村札掛(露木ほか, 1997)。

アトモンサビカミキリ *Pterolophia (pterolophia) granulata* (Motschulsky)

愛川町経ヶ岳(苧部ほか, 1999)；厚木市七沢(平野ほか, 2006)；大山山頂(平野ほか, 2006)；伊勢原市日向(相模原市立博物館, 2001)；津久井町鳥屋奥野林道(有井・守屋, 2004)；津久井町青根神ノ川矢駄沢(有井・守屋, 2004)；山北町玄倉(露木ほか, 1997)；山北町箒沢(猪又, 1968)；山北町大又沢(露木ほか, 1981)；山北町皆瀬川(東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972)；松田町高松(田尾, 1991e)；秦野市県民の森(露木ほか, 1997)；清川村谷太郎谷(露木ほか, 1981)；清川村宮ヶ瀬(露木ほか, 1981)；清川村札掛(露木ほか, 1997)；清川村堂平(西, 1997)。

クリサビカミキリ *Pterolophia (pterolophia) castaneivora* Ohbayashi et Hayashi

津久井から東丹沢山麓, 川崎・横浜市北部方面に分布する一方, 西丹沢と箱根方面での記録がない。

厚木市七沢(露木ほか, 1997)；愛川町半原(露木ほか, 1997)；大山山頂(平野ほか, 2006)；津久井町鳥屋早戸川伝道(有井・守屋, 2004)；津久井町青野原(有井・守屋, 2004)；津久井町青根(有井・守屋, 2004)。

エゾサビカミキリ *Pterolophia (Pterolophia) tsurugiana* (Matsushita)

愛川町高取山(苧部ほか, 1999)；愛川町経ヶ岳(苧部ほか, 1999)；厚木市七沢(平野ほか, 2006)；大山(林・平野, 1987b)；lex., 津久井町伊勢沢林道, 13. VII. 2005, 新堀豊彦採集；lex., 津久井町姫次 1320m, 12. VI. 2004, 中山和昭採集；津久井町青根神ノ川広河原(有井・守屋, 2004)；大室山(露木ほか, 1997)；lex., 熊笹ノ峰, 21. VII. 2004, 河合秀樹採集；檜洞丸(露木ほか, 1997)；菰釣山(露木ほか, 1997)；lex., 山北町切通峠 990m, 12. VI. 2005, 中山和昭採集；三国山(露木ほか, 1997)；南丹沢西山林道(露木ほか, 1997)；清川村札掛(露木ほか, 1997)；lex., 清川村塩水林道 410m, 3. VI. 2004, 中山和昭採集；清川村堂平(露木ほか, 1997)；lex., 丹沢山～塔ノ岳, 17. VII. 2005, 藤田裕採集；蛭ヶ岳(草間・高桑, 1984)。

ヒメナガサビカミキリ *Pterolophia (pterolophia) leiopodina* (Bates)

厚木市七沢(平野ほか, 2006)；厚木市七沢唐沢峠～唐沢峠分岐点(平野ほか, 2006)；大山山頂(平野ほか, 2006)；津久井町青根長者舎(有井・守屋, 2004)；山北町東沢橋(西, 1997)；清川村札掛(露木ほか, 1997)。

ワモンサビカミキリ *Pterolophia (Hylobrotus) annulata* (Chevrolat)

シイ・カシ帯の要素の1つであるが、ときに内陸部でも採集される。厚木市七沢(高橋, 1987)；厚木市七沢弁天の森(平野ほか, 2006)；山北町皆瀬川(東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972)。

ナカジロサビカミキリ *Pterolophia (Ale) jugosa jugosa* (Bates)

愛川町仏果山(苧部ほか, 1999)；厚木市七沢(相模原市立博物館, 2001)；厚木市七沢弁天の森(平野ほか, 2006)；大山(相模原市立博物館, 2001)；津久井町鳥屋早戸川伝道(有井・守屋, 2004)；津久井町寺入沢(露木ほか, 1997)；津久井町此間沢(露木ほか, 1981)；檜洞丸(露木ほか, 1997)；山北町ユースン(露木ほか, 1997)；山北町大又沢(露木ほか, 1981)；lex., 山北町切通峠 1030m, 5. VI. 2005, 中山和昭採集；三国山(露木ほか, 1997)；山北町皆瀬川(東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972)；lex., 鍋割山～小丸(南丹沢), 21. VI. 2005, 高桑正敏採集；清川村札掛(守屋, 1994b)；清川村堂平(西, 1997)。

クワサビカミキリ *Mesosella simiola* Bates

一般にブナ帯にふつうであるが、丹沢ではほとんど発見されていない。三国山(露木ほか, 1997)；清川村堂平(露木ほか, 1997)。

ニイジマチビカミキリ *Egesina (Nijimaia) bifasciana bifasciana* (Matsushita)

愛川町高取山(苧部ほか, 1999)；厚木市七沢(高橋, 1987)；山北町東沢橋(西, 1997)；秦野市上大倉(露木ほか, 1997)。

フジコブヤハズカミキリ *Mesochthistatus fujisanus* Hayashi

lex., 津久井町姫次 1410m, 1. X. 2005, 中山和昭採集；大室山(露木ほか, 1997)；犬越路(露木ほか, 1981)；山北町白石峠(平井, 1999)；lex., 檜洞丸(展望園地), 2. X. 2004, 宮谷秀明採集；山北町東沢～檜洞丸(露木ほか, 1997)；山北町中ノ沢テシロノ頭(平井, 1989)；2exs., 清川村堂平 950m, 2. X. 2005, 館野鴻採集；清川村太礼ノ頭(露木ほか, 1997)；lex., 西峰(太礼ノ頭)～丹沢山頂, 17. IX. 2005, 深田晋一採集；lex., 清川村堂平～西峰(太礼ノ頭)～丹沢山, 24-25. VI. 2006, 高桑正敏採集；棚沢ノ頭(平井, 1989)；蛭ヶ岳(露木ほか, 1981)。

セダコブヤハズカミキリ *Parechthistatus gibber shibatai* Miyake

大山女坂(平井, 1991)；大山(林・平野, 1987b)；大山下社(平井, 1991)；大室山(露木ほか, 1997)；加入道山(露木ほか, 1997)；犬越路(露木ほか, 1997)；lex., 檜洞丸(展望園地～檜洞丸山頂), 25. VI. 2005, 宮谷秀明採集；山北町石棚山(平井, 1986)；白ヶ岳(露木ほか, 1981)；山北町玄倉～雨山(平井, 1986)；山北町権現山(平井, 1986)；山北町蛙ヶ丸山(露木ほか, 1997)；山北町地蔵平(露木ほか, 1981)；三国山(露木ほか, 1997)；清川村札掛丹沢ホーム(平井, 1991)；lex., 清川村堂平 1150m, 3. VI. 2004, 中山和昭採集；lex., 西峰(太礼ノ頭), 28. IX. 2005, 深田晋一採集；lex., 丹沢山頂付近, 25. VI. 2005, 高桑正敏採集；lex., 塔ノ岳～丹沢山, 24. VII. 2005, 松本昇也採集；棚沢ノ頭(露木ほか, 1981)；蛭ヶ岳(露木ほか, 1981)。

フジコブヤハズカミキリ×セダコブヤハズカミキリ *Mesochthistatus fujisanus* × *Parechthistatus gibber shibatai*

上記の2種は南関東や富士山周辺で同所的に分布し、一部でハ

イブリッド個体が採集されている。丹沢では主稜部で混棲しており、それらの交雑の有無に関心がもたれていたが、今回の調査によって初めて明らかなハイブリッド個体が確認された。ほかにもハイブリッドと考えられる個体も採集されており、くわしい検討結果は別に譲ることとする。

1ex., 清川村堂平, 16. X. 2005, 深田晋一採集。

イタヤカミキリ *Mecynippus pubicornis* Bates

神奈川県レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類とされている。低地では壊滅状態であり、丹沢山麓・山間部に少数が生息しているにすぎないと推定される。

厚木市七沢 (高橋, 1987); 厚木市七沢石尊沢 (平野ほか, 2006); 山北町白石沢 (露木ほか, 1997); 山北町箒沢 (木下, 1981); 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972)。

ヒゲナガカミキリ *Monochamus (Monochamus) grandis* Waterhouse

愛川町高取山 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 大室山頂 (平野ほか, 2006); 1ex., 津久井町奥野林道, 13. VII. 2005, 新堀豊彦採集; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上 (有井・守屋, 2004); 山北町箒沢 (木下, 1981); 山北町大門沢 (西, 1997); 清川村札掛 (露木ほか, 1997); 清川村堂平 (露木ほか, 1981); 1ex., 清川村堂平～西峰 (太礼ノ頭)～丹沢山, 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏採集。

マツノマダラカミキリ *Monochamus (Monochamus) alternatus endai* Makihara

主にシイ・カシ帯に生息する種で、マツ類を寄主植物とする。厚木市七沢 (高橋, 1987); 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972)。

ヒメヒゲナガカミキリ *Monochamus (Monochamus) subfasciatus subfasciatus* (Bates)

愛川町仏果山 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢 (相模原市立博物館, 2001); 厚木市七沢唐沢峠 (平野ほか, 2006); 大山 (相模原市立博物館, 2001); 津久井町鳥屋奥野林道 (有井・守屋, 2004); 津久井町神ノ川えびら沢出合 (有井・守屋, 2004); 犬越路～大室山 (平野, 1998f); 山北町東沢橋 (西, 1997); 山北町水ノ木沢 (露木ほか, 1997); 山北町皆瀬川 (露木ほか, 1981); 1ex., 秦野市戸沢, 7. VII. 2006, 新堀豊彦採集; 秦野市大倉 (露木ほか, 1981); 清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (露木ほか, 1997); 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981)。

ゴマダラカミキリ *Anoplophora (anoplophora) malasiaca malasiaca* (Thomson)

愛川町経ヶ岳 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢弁天の森 (平野ほか, 2006); 津久井町鳥屋奥野林道水沢橋 (有井・守屋, 2004); 津久井町鳥屋とづら峠 (有井・守屋, 2004); 津久井町青根長者舎 (有井・守屋, 2004); 山北町箒沢 (小林・山口, 1972); 山北町浅瀬 (露木ほか, 1997); 山北町大門沢 (西, 1997); 山北町鍛冶屋敷 (露木ほか, 1997); 秦野市弘法山 (露木ほか, 1997)。

センノキカミキリ *Acalolepta luxuriosa luxuriosa* (Bates)

厚木市七沢 (高橋, 1987); 大山 (露木ほか, 1997)。

ピロウドカミキリ *Acalolepta fraudatrix fraudatrix* (Bates)

愛川町高取山 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 大室山頂 (平野ほか, 2006); 津久井町鳥屋奥野林道水沢橋 (有井・守屋, 2004); 津久井町大平台 (露木ほか, 1997); 津久井町青根 (露木ほか, 1981); 津久井町神ノ川 (露木ほか, 1997); 丹沢湖 (露木ほか, 1997); 山北町水ノ木沢 (露木ほか, 1997); 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 山北町大門沢 (西, 1997); 秦野市諸戸 (露木ほか, 1981); 清川村谷太郎 (守屋, 1997d); 清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (平野, 1987h); 清川村塩水川 (伊藤, 1998); 1ex., 清川村堂平～西峰 (太礼ノ頭)～丹沢山, 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏採集; 清川村天王寺尾根 (露木ほか, 1981)。

ニセピロウドカミキリ *Acalolepta sejuncta sejuncta* (Bates)

愛川町高取山 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢 (高橋, 1987); 厚木市七沢不動尻 (平野ほか, 2006); 大室山頂 (平野ほか, 2006); 1ex., 津久井町伊勢沢林道, 13. VII. 2005, 新堀豊彦採集; 津久井町早戸川 (露木ほか, 1997); 津久井町青根 (露木ほか, 1981); 津久井町神ノ川林道～熊笹ノ峰下 (有井・守屋, 2004); 犬越路～大室山 (平野, 1998f); 山北町用水沢出合 (露

木ほか, 1997); 山北町熊木沢 (露木ほか, 1981); 2exs., 山北町玄倉コーシン, 3. VII. 2004, 新堀豊彦採集; 山北町水ノ木沢 (露木ほか, 1997); 山北町三国峠 (露木ほか, 1981); 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 1ex., 清川村境沢林道, 17. VII. 2005, 新堀豊彦採集; 清川村堂平 (露木ほか, 1997); 1ex., 丹沢山, 17. VII. 2005, 松本和馬採集。

チャイロヒゲピロウドカミキリ *Acalolepta kusamai* Hayashi

主にシイ・カシ帯に生息する種で、県内では海岸近くに多い。本種群をめぐっては分類学的な検討が十分になされておらず、また県内産は人為的に持ち込まれたものに基づく可能性もないではない。厚木市七沢 (高橋, 1987)。

ヤハズカミキリ *Uraecha bimaculata bimaculata* Thomson

厚木市七沢 (高橋, 1987); 厚木市七沢山の神 (平野ほか, 2006); 伊勢原市 (露木ほか, 1981); 津久井町長者舎大谷 (守屋, 1994b); 檜洞丸 (露木ほか, 1997); 山北町水ノ木沢 (露木ほか, 1997); 山北町皆瀬川 (宮川, 1995); 清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1981)。

ゴマフキマダラカミキリ *Annamanum griseolum* (Bates)

大山 (露木ほか, 1997); 津久井町鳥屋早戸川林道魚止橋 (有井・守屋, 2004); 津久井町姫次 (露木ほか, 1981); 清川村堂平 (西, 1997); 清川村天王寺尾根 (露木ほか, 1981)。

ヨコヤマヒゲナガカミキリ *Dolichoprosopus yokoyamai* (Gressitt)

津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋 (有井・守屋, 2004); 山北町箒沢 (高橋, 1986); 山北町三国峠 (平野, 1968b)。

チャボヒゲナガカミキリ *Xenicotela pardalina* (Bates)

愛川町高取山 (荻部ほか, 1999); 加入道山 (露木ほか, 1997); 山北町大野山 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (露木ほか, 1997)。

クリイロシラホシカミキリ *Nanohammus rufescens* Bates

神奈川県では堂平においてごく少数が確認されているにすぎない。清川村堂平 (露木ほか, 1997)。

クワカミキリ *Apriona japonica* Thomson

愛川町経ヶ岳 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢 (露木ほか, 1997); 津久井町鳥屋伊勢沢林道 (有井・守屋, 2004); 山北町東沢 (露木ほか, 1997); 山北町箒沢 (猪又, 1968); 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 清川村堂平 (露木ほか, 1997)。

シロスジカミキリ *Batocera lineolata* Chevrolat

愛川町檜原 (荻部ほか, 1999); 伊勢原市日向 (露木ほか, 1997); 津久井町鳥屋とづら峠 (有井・守屋, 2004); 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上 (有井・守屋, 2004); 山北町箒沢 (露木ほか, 1981); 丹沢湖 (露木ほか, 1997); 山北町皆瀬川 (宮川, 1995); 秦野市弘法山 (露木ほか, 1997); 清川村札掛 (中村, 1964)。

ヒゲナガゴマフカミキリ *Palimna liturata liturata* (Bates)

大室山 (露木ほか, 1997); 加入道山 (露木ほか, 1997); 山北町水ノ木沢 (露木ほか, 1997); 清川村堂平 (露木ほか, 1997); 丹沢山 (露木ほか, 1981); 1ex., 丹沢山～塔ノ岳, 17. VII. 2005, 藤田裕採集; 1ex., 不動ノ峰～鬼ヶ岩ノ頭, 6. VIII. 2006, 藤田裕採集。

セミスジゴヒゲカミキリ *Rhodopina lewisii lewisii* (Bates)

愛川町高取山 (荻部ほか, 1999); 愛川町仏果山 (荻部ほか, 1999); 愛川町経ヶ岳 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢不動尻 (平野ほか, 2006); 津久井町鳥屋荒井林道 (有井・守屋, 2004); 山北町畦ヶ丸山 (露木ほか, 1997); 清川村札掛 (露木ほか, 1997)。

フタモンアラゲカミキリ *Rhopaloscelis maculatus* Bates

愛川町高取山 (荻部ほか, 1999); 愛川町経ヶ岳 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢弁天の森 (平野ほか, 2006); 厚木市七沢不動尻 (平野ほか, 2006); 2exs., 津久井町伊勢沢林道, 13. VII. 2005, 新堀豊彦採集; 津久井町早戸川 (露木ほか, 1997); 犬越路～大室山 (平野, 1998f); 山北町東沢橋 (西, 1997); 1ex., 檜洞丸 (西丹沢自然教室～ゴウラ沢出合), 10. VII. 2004, 宮谷秀明採集; 山北町コーシン (露木ほか, 1981); 山北町大又沢 (露木ほか, 1981); 1ex., 山北町土沢上流 (世附), 4. VI. 2006, 新堀豊彦採集; 1ex., 山北町切通峠 1090m, 22. V. 2005, 中山和昭採集; 秦野市上大倉 (露木ほか, 1997); 1ex., 清川村札掛, 17. VII. 2005, 新堀豊彦採集; 清川村一ノ沢 (露木ほか, 1981); 3exs., 清川村長尾尾根, 2. VIII. 2005, 新堀豊彦採集; 清川村堂平

(露木ほか, 1997).

フタオビアラゲカミキリ *Rhopaloscelis bifasciatus* Kraatz

愛川町高取山 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 大山山頂 (平野ほか, 2006); 津久井町青山仙洞寺山 (有井・守屋, 2004); 津久井町神ノ川 (露木ほか, 1997); 津久井町神ノ川広河原～源蔵新道 (有井・守屋, 2004); 大室山 (露木ほか, 1997); 2exs., 犬越路トンネル付近 (北丹沢), 3. VII. 2004, 新堀豊彦採集; 山北町用木沢 (露木ほか, 1997); 檜洞丸 (露木ほか, 1997); 山北町熊木沢 (露木ほか, 1981); 山北町箒沢 (露木ほか, 1981); 菰釣山 (露木ほか, 1997); 山北町三国峠 (露木ほか, 1997); 山北町皆瀬川 (露木ほか, 1981); 秦野市上大倉 (露木ほか, 1997); 3exs., 清川村長尾尾根, 2. VIII. 2005, 新堀豊彦採集; 清川村堂平 (露木ほか, 1997).

ヒトオビアラゲカミキリ *Rhopaloscelis unifasciatus* Blessig

愛川町高取山 (荻部ほか, 1999); 愛川町経ヶ岳 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢 (高橋, 1987); 厚木市七沢弁天の森 (平野ほか, 2006); 大山山頂 (平野ほか, 2006); 1ex., 津久井町黍穀山 940m, 12. VI. 2005, 中山和昭採集; 津久井町神ノ川 (露木ほか, 1997); 犬越路 (露木ほか, 1997); 山北町東沢橋 (西, 1997); 1ex., 檜洞丸 (西丹沢自然教室～ゴウラ沢出合), 10. VII. 2004, 宮谷秀明採集; 山北町大又沢 (露木ほか, 1981); 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 清川村物見峠 (露木ほか, 1981); 清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (露木ほか, 1981); 1ex., 西峰 (太礼ノ頭)～中峰 (円山木の頭), 30. IX. 2005, 深田晋一採集; 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

カッコウカミキリ *Miccolamia (Miccolamia) cleroides* Bates

愛川町高取山 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢弁天の森 (平野ほか, 2006); 厚木市七沢不動尻 (平野ほか, 2006); 大山 (相模原市立博物館, 2001); 津久井町青根犬越路隧道～犬越路 (有井・守屋, 2004); 菰釣山 (露木ほか, 1997); 三国山 (露木ほか, 1997); 山北町明神峠 (露木ほか, 1997); 清川村堂平 (西, 1997); 丹沢山 (露木ほか, 1981); 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981);

チビコブカミキリ *Miccolamia (Isomiccolamia) verrucosa* Bates

2001年以前はシロチビコブカミキリの和名が使用されていた種で、タンナサワフタギを寄主植物とする。

大山北尾根 (平野ほか, 2006); 大山山頂 (平野ほか, 2006); 犬越路～大室山 (平野, 1998f); 三国山 (露木ほか, 1997); 山北町明神峠 (露木ほか, 1997); 清川村堂平 (平野, 1999f); 棚沢ノ頭 (露木ほか, 1981).

ヘリグロチビコブカミキリ *Miccolamia (Isomiccolamia) takakuwai* Hasegawa et Ohbayashi

2001年以前はチビコブカミキリの和名が使用されていた種群の中の1つ。

愛川町高取山 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢唐沢峠 (平野ほか, 2006); 大山 (平野ほか, 2006); 山北町熊木沢出合 (露木ほか, 1981); 菰釣山学術考証林 (露木ほか, 1997); 山北町皆瀬川 (露木ほか, 1997); 清川村堂平 (Hasegawa & Ohbayashi, 2001); 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

ピクチビコブカミキリ *Miccolamia (Isomiccolamia) tuberculata* (Pic)

露木ほか (1997) ではシナノキチビコブカミキリ (仮称) *M. sp.* として報告された種のこと、シナノキを寄主植物とする。

清川村堂平 (Hasegawa & Ohbayashi, 2001).

ミヤマチビコブカミキリ *Miccolamia (Isomiccolamia) glabricula* *glabricula* Bates

神奈川県では1979年に得られた下記の1頭だけが知られる。モミ類を寄主植物とするので、丹沢主稜部における針葉樹の衰退によって危機的な状態に陥っている可能性がある。

蛭ヶ岳 (Hasegawa & Ohbayashi, 2001).

クモノモンサビカミキリ *Graphidessa venata* Bates

愛川町高取山 (荻部ほか, 1996); 厚木市七沢不動尻 (平野ほか, 2006); 大山 (露木ほか, 1997); 1ex., 津久井町早戸川林道, 1. V. 2005, 高桑正敏採集; 津久井町青根神ノ川矢駄沢上 (有井・守屋, 2004); 1ex., 津久井町日蔭沢, 7. V. 2004, 新堀豊彦採集; 1ex., 檜洞丸 (西丹沢自然教室～ゴウラ沢出合), 10. VII. 2004, 宮谷秀明採集; 1ex., 山北町大又沢, 23. IV. 2004, 新堀豊彦採集; 菰釣山 (露木ほか, 1997); 1ex., 山北町切通峠 1030m, 14. V. 2005, 中山和昭採集; 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫

班, 1972); 1ex., 清川村長尾尾根, 2. VIII. 2005, 新堀豊彦採集; 清川村堂平 (西, 1997).

ハイロツツクビカミキリ *Cylindrilla grisescens* Bates

大室山 (露木ほか, 1997); 山北町玄倉林道 (露木ほか, 1997); 山北町箒沢 (山本, 1984); 1ex., 山北町大圃沢, 5. V. 2006, 新堀豊彦採集; 清川村堂平 (高崎・岩田, 1992).

ジウジクロカミキリ *Clytosemia pulchra* Bates

菰釣山 (露木ほか, 1997); 秦野市ヤビツ峠 (露木ほか, 1981); 清川村堂平 (露木ほか, 1997).

ドイカミキリ *Mimectatina divaricata divaricata* (Bates)

愛川町高取山 (荻部ほか, 1999); 愛川町仏果山 (露木ほか, 1997); 厚木市七沢大沢 (平野ほか, 2006); 津久井町鳥屋奥野林道 (有井・守屋, 2004); 山北町大又沢 (露木ほか, 1981); 山北町皆瀬川 (露木ほか, 1981).

ホンヒゲケブカカミキリ *Eupogoniopsis tenuicornis* (Bates)

愛川町仏果山 (荻部ほか, 1999); 厚木市七沢不動尻 (平野ほか, 2006); 大山 (露木ほか, 1981); 1ex., 津久井町黍穀山 940m, 12. VI. 2004, 中山和昭採集; 大室山 (露木ほか, 1997); 犬越路 (露木ほか, 1997); 檜洞丸 (露木ほか, 1997); 山北町箒沢 (露木ほか, 1981); 山北町地蔵平白石沢出合 (露木ほか, 1981); 山北町大又沢 (露木ほか, 1981); 菰釣山 (平野, 2001e); 三国山 (露木ほか, 1997); 清川村物見峠 (露木ほか, 1981); 2exs., 清川村長尾尾根, 2. VIII. 2005, 新堀豊彦採集; 清川村堂平 (露木ほか, 1997); 1ex., 塔ノ岳～丹沢山, 17. VII. 2005, 中村進一採集.

クイロチビケブカカミキリ *Terinaea atrofusca* Bates

神奈川県では下記が唯一の確実な記録。すでに Okui (1952) により東丹沢札掛とヤビツ峠から記録されていたが、前種の誤同定であったことを発表者自身が認めている (露木ほか, 1981).

清川村堂平 (中山, 2004).

イボタサビカミキリ *Sophrionica obrioides* (Bates)

主にシイ・カシ帯に生息する種であり、下記の記録は意外である。

津久井町鳥屋早戸川伝道 (有井・守屋, 2004).

ネジロカミキリ *Pogonocherus (Eupogonocherus) seminiveus* Bates

愛川町仏果山 (露木ほか, 1997); 大山山頂 (平野ほか, 2006); 山北町白石沢 (露木ほか, 1997); 山北町山神峠 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (露木ほか, 1997).

神奈川県レッドリストで準絶滅危惧とされている。丹沢に限らず、県内の最近の記録は少ない。

ゴイシモモフトカミキリ *Callapoecus guttatus* Bates

厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 厚木市七沢不動尻 (平野ほか, 2006); 大山山頂 (平野ほか, 2006); 2exs., 加入道山～大室山, 30. VII. 2005, 高橋和弘採集; 犬越路 (露木ほか, 1997); 1ex., 檜洞丸 (西丹沢自然教室～ゴウラ沢出合), 10. VII. 2004, 宮谷秀明採集; 山北町箒沢 (露木ほか, 1981); 三国山 (露木ほか, 1997); 清川村札掛 (露木ほか, 1981); 清川村堂平 (高崎・岩田, 1992).

ヒゲナガモモフトカミキリ *Acanthocinus griseus orientalis* Ohbayashi

神奈川県レッドリストで準絶滅危惧とされている。低地では激減し、丹沢でも採集例は少ない。

厚木市七沢 (高橋, 1987); 津久井町原小屋～八丁坂ノ頭 (露木ほか, 1981); 津久井町青根神ノ川広河原 (有井・守屋, 2004); 山北町大門沢 (西, 1997); 清川村札掛 (守屋, 1994b).

ゴマダラモモフトカミキリ *Leiopus stillatus* (Bates)

厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 大山山頂 (平野ほか, 2006); 1ex., 加入道山～大室山, 16. VII. 2005, 高橋和弘採集; 山北町白石沢 (露木ほか, 1997); 1ex., 檜洞丸山頂, 20. VI. 2004, 宮谷秀明採集; 清川村堂平 (露木ほか, 1997); 1ex., 丹沢山頂付近, 25. VI. 2005, 高桑正敏採集; 丹沢山～清川村天王寺尾根 (平野, 1999f); 1ex., 塔ノ岳～丹沢山, 17. VII. 2005, 中村進一採集; 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

ミヤマモモフトカミキリ *Leiopus montanus* Hayashi

草間・高桑 (1984) が前種として図示した蛭ヶ岳産個体は本種のことである (露木ほか, 1997)。札掛ではモミから、蛭ヶ岳ではウラジロモミから得られたもの。

清川村札掛 (露木ほか, 1997); 蛭ヶ岳 (草間・高桑, 1984).

ホウノキトゲバカミキリ *Rondibilis (Rondibilis) sapporensis* (Matsushita)

愛川町高取山（露木ほか，1997）；清川村宮ヶ瀬（中山，1988）；清川村札掛（露木ほか，1997）。

トゲバカミキリ *Rondibilis (Eryssamena) saperdina* (Bates)

愛川町高取山（苅部ほか，1999）；愛川町経ヶ岳（苅部ほか，1999）；厚木市七沢弁天の森（平野ほか，2006）；厚木市七沢不動尻（平野ほか，2006）；大山山頂（平野ほか，2006）；津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋，2004）；津久井町神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋，2004）；加入道山（露木ほか，1997）；犬越路（平野，1998f）；2exs.，檜洞丸（西丹沢自然教室～ゴウラ沢出合），10. VII. 2004，宮谷秀明採集；檜洞丸（露木ほか，1997）；山北町地蔵平（露木ほか，1997）；菰釣山（平野，2001e）；山北町高指山（露木ほか，1981）；三国山（露木ほか，1997）；秦野市諸戸（露木ほか，1981）；清川村札掛（大林ほか，1992）；1ex.，清川村長尾尾根，2. VIII. 2005，新堀豊彦採集；清川村堂平（露木ほか，1997）；丹沢山～不動ノ峰（平野，1999f）。

ガロアケシカミキリ *Exocentrus (Exocentrus) galloisi* Matsushita

愛川町高取山（苅部ほか，1999）；厚木市七沢（露木ほか，1997）；厚木市七沢弁天の森（平野ほか，2006）；津久井町青野原（有井・守屋，2004）；山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班，1972）；秦野市弘法山（露木ほか，1997）。

キッコウモンケシカミキリ *Exocentrus (Exocentrus) testudineus* Matsushita

愛川町高取山（苅部ほか，1999）；愛川町仏果山（苅部ほか，1999）；厚木市七沢（高橋，1987）；大山山頂（平野ほか，2006）；津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋，2004）；津久井町風巻ノ頭（露木ほか，1997）；津久井町青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋，2004）；2exs.，加入道山～大室山，16. VII. 2005，高橋和弘採集；犬越路隧道（有井・守屋，2004）；山北町東沢橋（西，1997）；山北町地蔵平白石沢出合（露木ほか，1981）；山北町水ノ木沢（露木ほか，1997）；三国山（露木ほか，1997）；山北町皆瀬川（露木ほか，1981）；秦野市上大倉（露木ほか，1997）；1ex.，清川村境沢林道，17. VII. 2005，新堀豊彦採集；清川村堂平（露木ほか，1997）；蛭ヶ岳（露木ほか，1981）。

ブナケシカミキリ *Exocentrus (Exocentrus) sp.*

露木ほか（1997）で報告されているように，西日本に分布するミヤマケシカミキリにきわめてよく似た未記載種で，ブナ類の枯れ枝から得られる。

2exs.，加入道山～大室山，16. VII. 2005，高橋和弘採集；犬越路（露木ほか，1997）；1ex.，熊笹ノ峰，21. VII. 2004，河合秀樹採集；檜洞丸（露木ほか，1997）；清川村堂平（露木ほか，1997）；丹沢山（露木ほか，1997）。

アトモンマルケシカミキリ *Exocentrus (Exocentrus) lineatus lineatus* Bates

愛川町高取山（苅部ほか，1999）；厚木市七沢弁天の森（平野ほか，2006）；厚木市唐沢峠（露木ほか，1997）；大山（露木ほか，1997）；津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋，2004）；津久井町青根長者舎（有井・守屋，2004）；津久井町青根犬越路隧道（有井・守屋，2004）；山北町東沢橋（西，1997）；山北町大野山（露木ほか，1997）；秦野市弘法山（露木ほか，1997）。

クモガタケシカミキリ *Exocentrus (Camptomyne) fasciolatus* Bates

愛川町高取山（苅部ほか，1999）；厚木市七沢（高橋，1987）；津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋，2004）；津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋，2004）；津久井町青野原（有井・守屋，2004）；津久井町青根長者舎（有井・守屋，2004）；津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋，2004）；山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班，1972）。

シラオビゴマフケシカミキリ *Exocentrus (Pseudocentrus) guttulatus* Bates

愛川町経ヶ岳（苅部ほか，1999）；厚木市七沢大沢（平野ほか，2006）；津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋，2004）；1ex.，山北町玄倉ユーンシ，3. VII. 2004，新堀豊彦採集；秦野市上大倉（露木ほか，1997）；清川村タイ小屋沢（岩田，1999）。

ケシカミキリ *Sciades (Miaenia) tonsus* (Bates)

愛川町高取山（苅部ほか，1999）；厚木市七沢（露木ほか，1997）；津久井町青野原（有井・守屋，2004）；秦野市大倉（露木ほか，1981）；秦野市弘法山（露木ほか，1997）。

ルリカミキリ *Bacchisa (Bacchisa) fortunei japonica* (Gahan)

神奈川県レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類とされている。主にシイ・カシ帯に生息する種で，丹沢の記録はごく少ない。

大山（相模原市立博物館，2001）；秦野（相模原市立博物館，2001）；秦野市弘法山（露木ほか，1997）；清川村札掛（岩田・榊原，1997）。

ムネモンヤツボシカミキリ *Saperda (Saperda) tetrastigma* Bates

愛川町仏果山（露木ほか，1997）；厚木市七沢弁天の森（平野ほか，2006）；清川村堂平（露木ほか，1997）。

ブロイニングカミキリ *Saperda (Saperda) ohbayashii* Podany

1ex.，檜洞丸（東沢林道），20. VI. 2006，宮谷秀明採集；山北町玄倉林道（露木ほか，1997）；山北町玄倉（塩崎，1994）；山北町大野山（露木ほか，1997）；山北町皆瀬川（高桑，1990b）；清川村堂平（高崎・岩田，1992）。

ヤツメカミキリ *Eutetrappa ocelota* (Bates)

厚木市七沢大沢（平野ほか，2006）；厚木市七沢日向山山頂（平野ほか，2006）；清川村札掛（露木ほか，1997）；清川村堂平（露木ほか，1997）；1ex.，丹沢山頂付近，17. VII. 2005，高桑正敏採集；蛭ヶ岳（露木ほか，1981）。

ハンノアオカミキリ *Eutetrappa chysochloris chysochloris* (Bates)

犬越路（露木ほか，1981）；1ex.，熊笹ノ峰，21. VII. 2004，河合秀樹採集；1ex.，檜洞丸～熊笹ノ峰，1. VIII. 2004，川上翔平採集；1ex.，山北町玄倉川，4. VII. 2004，松本和馬採集；2exs.，山北町切通峠～鉄砲木の頭，21. VII. 2005，藤田裕採集；清川村札掛（露木ほか，1997）；清川村堂平（露木ほか，1997）；1ex.，清川村堂平～西峰（太礼ノ頭）～丹沢山，2-3. VIII. 2006，高桑正敏採集；蛭ヶ岳（露木ほか，1981）。

シナカミキリ *Eutetrappa sedecimpunctata* (Motschusky)

神奈川県では下記が唯一の記録。

熊笹ノ峰（有井，2005）。

ニセシラボシカミキリ *Pareutetrappa simulans* (Bates)

厚木市唐沢峠（露木ほか，1997）；大山（平野ほか，2006）；菰釣山学術考証林（露木ほか，1981）。

フチグロヤツボシカミキリ *Pareutetrappa eximia* (Bates)

厚木市七沢大沢（平野ほか，2006）；津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋，2004）；山北町玄倉小菅沢（苅部・高桑，2000）；山北町大門沢（西，1997）；

オニグルミノキモンカミキリ *Menesia flavotecta* Heyden

愛川町仏果山（露木ほか，1997）；厚木市七沢（露木ほか，1997）；津久井町青根神ノ川えびら沢出合（有井・守屋，2004）；山北町皆瀬川（露木ほか，1981）；山北町八丁（露木ほか，1981）。

キモンカミキリ *Menesia sulphurata* (Gebler)

津久井町長者舎大谷（守屋，1994b）；1ex.，檜洞丸山頂，7. VIII. 2005，宮谷秀明採集；4exs.，山北町切通峠～鉄砲木の頭，21. VII. 2005，藤田裕採集；山北町皆瀬川（露木ほか，1981）；清川村堂平（露木ほか，1997）；蛭ヶ岳（草間・高桑，1984）。

ジュウニキボシカミキリ *Paramenesia theaphia* (Bates)

大山ミズヒノ頭（露木ほか，1997）；清川村札掛（露木ほか，1997）；3exs.，丹沢山頂付近，17. VII. 2005，高桑正敏採集；鬼ヶ岩（中山，1985a）。

ハンノキカミキリ *Cagosima sanguinolenta sanguinolenta* Thomson

神奈川県レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類とされている。低地ではほとんどの場所で壊滅状態と推定され，丹沢でも最近の記録はごく少ない。厚木市七沢（相模原市立博物館，2001）；山北町皆瀬川（露木ほか，1981）；山北（草間・高桑，1984）；秦野市水無川本谷（露木ほか，1981）；1ex.，丹沢山，16. VII. 2005，松本和馬採集；蛭ヶ岳（露木ほか，1981）。

アサカミキリ *Thyestilla gebleri* (Faldermann)

神奈川県でのレッドリストで絶滅危惧Ⅰ類に選定されている。大野山は現時点では県内唯一の確実な産地。

山北町大野山（菅谷，1997）；秦野（相模原市立博物館，2001）。

ヒゲナガヒメリリカミキリ *Praolia citrinipes citrinipes* Bates

愛川町高取山（露木ほか，1997）；厚木市七沢（平野ほか，2006）；厚木市七沢不動尻（平野ほか，2006）；大山（露木ほか，1981）；津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋，2004）；津久井町風巻ノ頭（露木ほか，1997）；秦野市大倉西山林道（平野，

1996b).

シラホシカミキリ *Glenea (Glenea) relictata relictata* Pascoe

厚木市七沢 (相模原市立博物館, 2001); 大山山頂 (平野ほか, 2006); 伊勢原市日向 (上田, 1986); 津久井町鳥屋 (相模原市立博物館, 2001); 津久井町鳥屋奥野林道水沢橋 (有井・守屋, 2004); 津久井町此間沢 (露木ほか, 1981); 山北町白石沢 (露木ほか, 1997); 山北町箒沢 (猪又, 1968); 山北町水ノ木林道 (露木ほか, 1997); lex., 山北町切通峠～鉄砲木の頭, 21. VII. 2005, 藤田裕採集; 山北町市間 (倉形, 1971); 山北町大門沢 (西, 1997); 秦野市上大倉 (露木ほか, 1997); 秦野市弘法山 (露木ほか, 1981); 清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1981); lex., 清川村堂平～丹沢山, 5-6. VIII. 2006, 加賀玲子採集; 丹沢山 (露木ほか, 1981); 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

クロニセリソゴカミキリ *Eumecocera unicolor* (Kano)

本属のものは、県内ではいずれも記録が少ない。
犬越路 (露木ほか, 1997); 菰釣山 (露木ほか, 1997); lex., 山北町切通峠 1030m, 5. VI. 2005, 中山和昭採集; 清川村堂平 (露木ほか, 1997); lex., 丹沢山頂～西峰 (太礼ノ頭), 2. VIII. 2005, 深田晋一採集; 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

シラホシクスイカミキリ *Eumecocera gleneoides* (Gressitt)

津久井町早戸川上流 (新堀, 1985b); 山北町板小屋沢 (小谷, 1983); 三国山 (露木ほか, 1997); 清川村札掛 (高桑, 1972); 清川村塩水林道 (露木ほか, 1997); 清川村堂平 (西, 1997).

セミスジニセリソゴカミキリ *Eumecocera trivittata* (Breuning)

山北町箒沢 (露木ほか, 1981); 山北町明神峠 (露木ほか, 1997).

ヒゲナガシラホシカミキリ *Eumecocera argyrosticta* (Bates)

大室山 (露木ほか, 1997); 犬越路 (露木ほか, 1997); lex., 山北町切通峠 1030m, 5. VI. 2005, 中山和昭採集; 清川村堂平 (露木ほか, 1997); 丹沢山 (露木ほか, 1981); 清川村天王寺尾根 (露木ほか, 1997); 棚沢ノ頭 (露木ほか, 1981); 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981).

カツラカミキリ *Niponostenostola niponensis niponensis* (Pic)

大室山 (露木ほか, 1997); 犬越路 (露木ほか, 1997); lex., 檜洞丸 (檜洞丸山頂～金山谷乗越), 26. VI. 2005, 宮谷秀明採集; 菰釣山 (露木ほか, 1997); lex., 山北町切通峠 1030m, 5. VI. 2005, 中山和昭採集; 清川村堂平 (露木ほか, 1997); lex., 清川村堂平～西峰 (太礼ノ頭)～丹沢山, 17. VI. 2006, 高桑正敏採集; 丹沢山～蛭ヶ岳 (平野, 1999f); 棚沢ノ頭 (露木ほか, 1981); 蛭ヶ岳 (草間・高桑, 1984).

クロキクスイカミキリ *Srenostola nigerrima* (Breuning)

これまでにタイプ産地の日光と丹沢山しか記録されていないが、両産地のものは異なった種である可能性が高い。したがって、本個体をめぐっては分類学的な整理が必要であり、新名を与えるべきであろう (高桑, 1997)。なお、本個体の採集者である故長谷川仁氏によれば、採集地点は札掛周辺の可能性が高いとのことである (高桑, 1995)。
丹沢山 (小島・林, 1969)。

キクスイカミキリ *Phytoecia (Phytoecia) rufiventris* Gautier

厚木市七沢 (高橋, 1987); 大山上の宮 (露木ほか, 1981); 伊勢原市日向 (露木ほか, 1997); 津久井町青根夫婦園 (有井・守屋, 2004); 津久井町神ノ川広河原 (有井・守屋, 2004); 山北町箒沢 (小林・山口, 1972); 山北町世附 (露木ほか, 1997); 山北町皆瀬川 (露木ほか, 1981); 秦野市弘法山 (露木ほか, 1997); 清川村札掛 (中村, 1964)。

ヨツキボシカミキリ *Epiglenea comes comes* Bates

厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 大山 (露木ほか, 1997); 津久井町青山仙洞寺山 (有井・守屋, 2004); lex., 津久井町伊勢沢林道, 13. VII. 2005, 新堀豊彦採集; 津久井町青野原寺入沢 (有井・守屋, 2004); 津久井町此間沢 (露木ほか, 1981); 津久井町長者舎大谷 (守屋, 1994b); 犬越路 (露木ほか, 1997); 山北町東沢橋 (西, 1997); 山北町大又沢 (露木ほか, 1981); 山北町大野山 (露木ほか, 1997); 秦野市弘法山 (露木ほか, 1997); 清川村札掛 (露木ほか, 1981); lex., 清川村塩水林道 570m, 3. VI. 2004, 中山和昭採集。

ヘリグロリンゴカミキリ *Nupserha marginella* (Bates)

愛川町仏果山 (苧部ほか, 1999); 厚木市七沢 (平野ほか, 2006); 厚木市七沢不動尻 (守屋, 1997d); 伊勢原市日向 (上

田, 1986); 津久井町鳥屋越路峠 (有井・守屋, 2004); 津久井町長者舎大谷 (守屋, 1994b); 津久井町日陰沢新道大室山 (有井・守屋, 2004); lex., 檜洞丸山頂, 11. VII. 2004, 宮谷秀明採集; 山北町箒沢 (露木ほか, 1981); 山北町地蔵平 (露木ほか, 1997); 山北町水ノ木沢 (露木ほか, 1997); 菰釣山学術考証林 (露木ほか, 1981); 山北町高指山 (露木ほか, 1981); 山北町三国峠 (露木ほか, 1997); 山北町明神峠 (露木ほか, 1997); lex., 山北町大野山, 9. VII. 2004, 河合秀樹採集; 山北町皆瀬川 (露木ほか, 1981); 山北町成瀬 (露木ほか, 1981); 清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (大林ほか, 1992); 清川村堂平 (露木ほか, 1981); lex., 丹沢山～西峰 (太礼ノ頭), 6. VIII. 2006, 藤田裕採集; 蛭ヶ岳 (露木ほか, 1981)。

ソボリンゴカミキリ *Oberea sobosana* Ohbayashi

加入道山 (露木ほか, 1997); 檜洞丸 (露木ほか, 1997)。

ヒメリソゴカミキリ *Oberea hebescens* Bates

愛川町高取山 (苧部ほか, 1999); 愛川町仏果山 (苧部ほか, 1999); 厚木市七沢 (相模原市立博物館, 2001); 厚木市七沢弁天の森 (平野ほか, 2006); 大山 (相模原市立博物館, 2001); 津久井町青山仙洞寺山 (有井・守屋, 2004); 津久井町大平～黍殻山 (露木ほか, 1981); 津久井町青根 (有井・守屋, 2004); 犬越路～大室山 (有井・守屋, 2004); 山北町山神峠 (露木ほか, 1981); 山北町大滝キャンプ場 (露木ほか, 1997); lex., 山北町切通峠 1040m, 12. VI. 2005, 中山和昭採集; 三国山 (露木ほか, 1997); 秦野市県民の森 (露木ほか, 1997); 秦野市水無川本谷 (露木ほか, 1981); 清川村宮ヶ瀬 (露木ほか, 1981); 清川村札掛 (露木ほか, 1997)。

シラハタリンゴカミキリ *Oberea shirahatai* Ohbayashi

愛川町仏果山 (苧部ほか, 1999); 厚木市七沢 (露木ほか, 1997); lex., 檜洞丸 (西丹沢自然教室～ゴウラ沢出合), 10. VII. 2004, 宮谷秀明採集; 山北町箒沢 (露木ほか, 1981); 山北町明神峠 (露木ほか, 1981); 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 秦野市善波峠 (露木ほか, 1997)。

ホソキリンゴカミキリ *Oberea infranigrescens* Breuning

厚木市七沢 (相模原市立博物館, 2001); 津久井町姫次 (小林・山口, 1972); 山北町西沢 (露木ほか, 1997); 山北町箒沢 (露木ほか, 1981); 山北町大又沢 (露木ほか, 1997); 山北町水ノ木林道 (露木ほか, 1997); 菰釣山学術考証林 (露木ほか, 1981); 山北町高指山 (露木ほか, 1981); lex., 鍋割山 (南丹沢), 16. VII. 2005, 松原豊採集; 秦野市大倉 (露木ほか, 1981)。

リンゴカミキリ *Oberea japonica* (Thunberg)

愛川町仏果山 (苧部ほか, 1999); 厚木市七沢 (露木ほか, 1997); 厚木市七沢山の神 (平野ほか, 2006); 山北町大野山 (露木ほか, 1997); 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 秦野市弘法山 (露木ほか, 1981)。

ホソツツリンゴカミキリ *Oberea nigriventris* Bates

丹沢ではタンザワイケマを寄主植物としており、その分布拡大によって本種もまた分布を拡大しつつある (高桑, 2007, 本報告書)。
lex., 熊笹ノ峰, 21. VII. 2004, 河合秀樹採集; 山北町三国峠 (平野, 1996b); 清川村堂平 (露木ほか, 1997); 2exs., 清川村堂平, 17. VII. 2005, 藤田裕採集; 清川村太礼ノ頭 (露木ほか, 1997); lex., 清川村堂平～西峰 (太礼ノ頭)～丹沢山, 16. VII. 2005, 高桑正敏採集; 清川村天王寺尾根 (露木ほか, 1997)。

〔人為的な手段により分布した種〕

テツイロヒメカミキリ *Ceresium sinicum* White

原産地が不明だが、海外から東京付近へ持ち込まれたものが定着し、県内各地に広がっていると考えられる。

大山 (露木ほか, 1997); 伊勢原市日向 (上田, 1986); 津久井町早戸川上流 (岩田, 1999)。

キボシカミキリ *Psacotheta hilaris hilaris* (Pascoe)

台湾あるいは中国が原産地で、県内のもは東京に戦前持ち込まれたものが広がったものと考えられている。

愛川町仏果山 (苧部ほか, 1999); 厚木市七沢 (高橋, 1987); 厚木市七沢石尊沢 (平野ほか, 2006); 津久井町鳥屋伊勢沢林道 (有井・守屋, 2004); 津久井町青根 (小林・山口, 1972); lex., 山北町川西・河内川, 23. X. 2004, 平野幸彦採集; 山北町皆瀬川 (東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972); 山北町舟

沢 (西, 1997).

ラミーカミキリ *Paraglenea fortunei* (Saunders)

中国南部が原産地で、幕末の頃にはすでに長崎に定着していたらしい。県内では1950年頃には小田原市で発生が確認されており、やがて丹沢方面にも広がっていったと推定されている(高桑, 1988)。

厚木市七沢(露木ほか, 1997); 厚木市七沢弁天の森(平野ほか, 2006); 津久井町青山仙洞寺山(有井・守屋, 2004); 津久井町鳥屋(露木ほか, 1997); 津久井町鳥屋松茸山(有井・守屋, 2004); 津久井町青野原(有井・守屋, 2004); 大室山〜犬越路(露木ほか, 1997); 山北町浅瀬〜地蔵平(露木ほか, 1997); 山北町浅瀬〜水ノ木(芦沢, 2000b); 山北町高指山(露木ほか, 1981); 山北町大野山(田尾, 1987g); 山北町舟沢(西, 1997); 松田町高松山(上田, 1986); 松田町松田山(平野, 1974e); 松田町寄沢(田尾, 1987g); 秦野市戸沢林道(露木ほか, 1997); 秦野市上大倉(露木ほか, 1997); 秦野市浅間山(露木ほか, 1997); 清川村札掛(岩田・榊原, 1997); lex., 清川村堂平, 22. VII. 2005, 深田晋一採集; lex., 丹沢山〜清川村堂平, 18. VII. 2005, 松本和馬採集。

〔記録の誤りと考えられる種〕

セアカハナカミキリ *Megaleptura thoracica* (Creutzer)

下記はラベルミスの可能性が考えられる(露木ほか, 1997)。

清川村札掛(露木ほか, 1981)。

シラヒゲナガカミキリ *Monochamus (Monochamus) nitens* (Bates)

ヒゲナガカミキリの白紋出現型を見誤ったと考えられる(高桑, 1979)。

清川村札掛(中村, 1964)。

カラフトヒゲナガカミキリ *Monochamus (Monochamus) saltuarius* (Gebler)

ヒゲナガカミキリの白紋出現型を見誤ったと考えられる(高桑, 1979)。

清川村札掛・丹沢林道・宮が瀬(Okui, 1952)。

謝 辞

ヒメハナカミキリ属の種の同定については小林敏男氏の労を煩わせた。また、標本整理作業では加賀玲子氏にご尽力いただいたとともに、報告書の執筆にあたり有井一雄、露木繁雄、藤田裕、守屋博文(五十音順)の各氏より地名について教示を受けた。これらの方々には心よりお礼を申し上げる。

文 献

有井一雄, 2005. 津久井町における神奈川県未記録の甲虫2種. 神奈川虫報, (151): 71.
有井一雄・守屋博文, 2004. 津久井町の昆虫 I. 津久井町史調査報告書. 113pp.
芦沢一郎, 1977. 丹沢のカミキリムシ. 神奈川虫報, (51): 39.
芦沢一郎, 2000a. 西丹沢河内川上流のチョウ類, 甲虫類 - 金沢中学校西丹沢生物調査より. 神奈川虫報, (129): 45-46.
芦沢一郎, 2000b. 8月下旬西丹沢のチョウ類, 甲虫類. 神奈川虫報, (129): 46-47.
Bates, H.W., 1884. Longicorn beetles of Japan. additions, chiefly from the later collections of Mr. George Lewis; and notes on the synonymy, distribution, and habits of the previously known species. *Linn. Journ. Zool.* 18: 205-262.
遠藤健一, 1970. 相模大山のヤマトシロオビトラカミキリ. 昆虫と自然, 5 (8): 34.
藤村俊彦, 1954. カミキリ4題. 新昆虫, 7 (13): 26.
藤田裕, 1995a. 仏果山におけるヌバタマハナカミキリの採集例. 神奈川虫報, (109): 26.
深田晋一, 2006. 神奈川県新記録のタクウチホソハナカミキリを丹沢山頂で採集. 神奈川虫報, (156): 47.
原 聖樹・山内英男, 1972. 裏丹沢焼山〜姫次における虫相調査. 神奈川虫報, (39): 31-33.
Hasegawa, M. & N. Ohbayashi., 2001. A revisional study on the genus *Miccolamia* of Japan (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Jpn. J. syst. Ent.*, 7 (1): 1-28.

林長閑・平野幸彦, 1987b. 大山原生林の甲虫類. 神奈川県指定天然記念物地域動物調査報告書, pp203-227. 神奈川県教育委員会.
平原健一, 2005. 神奈川県愛甲郡清川村でオオトラカミキリを採集. 月刊むし, (418): 13.
平井 勇, 1986. 丹沢におけるセダカコブヤハズカミキリの記録. 月刊むし, (190): 6.
平井 勇, 1989. 関東地方西部のフジコブヤハズカミキリ. 月刊むし, (225): 32-35.
平井 勇, 1991. 関東地方西部のセダカコブヤハズカミキリ. 月刊むし, (248): 14-18.
平井 勇, 1999. 関東地方西部のフジコブヤハズカミキリ(2). 月刊むし, (337): 18-19.
平野幸彦, 1968b. ヨコヤマヒゲナガカミキリ三国峠で採集す. 神奈川虫報, (26): 38.
平野幸彦, 1974e. 丹沢産甲虫類採集覚え書II. 神奈川虫報, (44): 29-30.
平野幸彦, 1986c. 丹沢でアカジマトラカミキリの鞘翅を拾う. 神奈川虫報, (80): 53.
平野幸彦, 1987f. 裏丹沢のカミキリ, 2種. 神奈川虫報, (84): 32.
平野幸彦, 1987h. 丹沢札掛モミ林の甲虫類. 神奈川県指定天然記念物地域動物調査報告書, pp283-301. 神奈川県教育委員会.
平野幸彦, 1996b. 脇一郎氏採集の丹沢産カミキリ3種. 神奈川虫報, (113): 6.
平野幸彦, 1998f. 白石沢, 大室山, 加入道山の甲虫類調査報告書. 神奈川虫報, (123): 1-13.
平野幸彦, 1999f. 堂平〜丹沢山〜蛭ヶ岳の甲虫類調査報告. 神奈川虫報, (127): 17-39.
平野幸彦, 2001e. 菰釣山調査報告. 神奈川虫報, (135): 23-27.
平野幸彦, 2004. コウチュウ目. 神奈川県昆虫誌 2004, pp.335-835. 神奈川昆虫談話会.
平野幸彦・高橋和弘・槐真史, 2006. 厚木市七沢・大山のコウチュウ目. 厚木市七沢の動植物III. pp.3-90.
平山洋人, 1983. 神奈川県内におけるカミキリムシ科甲虫数種の記録. 神奈川自然誌資料, (4): 29-30.
堀井邦弘, 2001. 神奈川県でクビアカタラカミキリを採集. 月刊むし, (370): 32.
堀井邦弘, 2003a. 宮が瀬で採集した甲虫2種. 神奈川虫報, (141): 55.
猪又敏夫, 1968. 1968年採集の県下のカミキリ. 神奈川虫報, (28): 13-16.
伊藤弥寿彦, 1998. アザミの茎を後食していたピロウドカミキリ. 月刊むし, (334): 15.
岩田隆太郎, 1999. 神奈川県産カミキリムシ雑記(1). 神奈川虫報, (128): 1-7.
岩田隆太郎・榊原陽一, 1997. 神奈川県丹沢山地におけるカミキリムシの記録(2). 神奈川虫報, (117): 20.
簡野嘉彦, 2000. 神奈川県におけるトラフホソバネカミキリの記録. 月刊むし, (358): 41-42.
苧部治紀, 1996b. キベリカタピロハナカミキリを西丹沢で採集. 神奈川虫報, (116): 31.
苧部治紀, 2001b. 津久井町寺入沢でヒゲブトハナカミキリを採集. 神奈川虫報, (133): 70.
苧部治紀, 2001d. ヒラヤマコブハナカミキリ2題. 神奈川虫報, (136): 49.
苧部治紀・藤田裕・高桑正敏・新津修平・松本慶一・葦沢幸世, 1996. 愛川町で採集された注目すべき甲虫について. 神奈川自然誌資料(17): 39-42.
苧部治紀・新津修平・松本慶一・葦沢幸世・高桑正敏・藤田裕, 1999. 愛川町の昆虫. 愛川町の動物 pp.41-75. 愛川町教育委員会.
苧部治紀・葦沢幸世, 1995. 神奈川県初記録のヒゲブトハナカミキリ. 神奈川虫報, (112): 50-51.
苧部治紀・高桑正敏, 2000. 県博関係者が採集した興味ある甲虫類. 神奈川虫報, (132): 54.
加藤良平, 1969a. 丹沢山塊の中心檜洞丸でフタコブルリハナを採集. はばたき, (92): 23.

- 河合秀樹, 2004a. 西丹沢でトラフホソバナカミキリを採集. 神奈川虫報, (146): 12.
- 川下 貴, 1994. 石砂山, 宮ヶ瀬周辺でのオオトラカミキリの採集例. 神奈川虫報, (107): 30.
- 木下富夫, 1981. 西丹沢でシナノサビカミキリを多数採集. 月刊むし, (119): 33.
- 木下富夫・中山和昭, 2006. フタスジカタビロハナカミキリを神奈川県で採集. 神奈川虫報, (156): 20.
- 岸田泰則, 1982. 東丹沢札掛でシナノサビカミキリを採集. 月刊むし, (135): 29.
- 小林峯生・山口佳秀, 1972. 昆虫標本目録 (2). 神奈川県立博物館自然部門資料目録, (4): 1-36.
- 小林敏男・高桑正敏, 2004. 西丹沢におけるオオアオカミキリ. 甲虫ニュース, (146): 15.
- 小島圭三・林匡夫, 1969. 原色日本昆虫生態図鑑 (I) カミキリ編, xxiv + 302pp. 保育社.
- 小谷靖彦, 1983. 神奈川県西丹沢でヌバタマハナカミキリを採集. 月刊むし, (152): 35.
- 窪木幹夫・鈴木和利, 1979. コトヒメハナカミキリ発見のいきさつとその分布について - (上). 月刊むし, (98): 3-8.
- 倉形和男, 1971. 山北町皆瀬川流域産甲虫類目録 I. 神奈川虫報, (37): 27-33.
- 倉形和男, 1973. 山北町皆瀬川流域産甲虫類目録 II. 神奈川虫報, (41): 25-28.
- 草間慶一・高桑正敏, 1984. 日本鞘翅目学会編, 日本産カミキリ大図鑑 (part.), 565pp. 講談社.
- 丸山 清, 1972c. 丹沢核心部西側三月の甲虫. 神奈川虫報, (39): 26-30.
- 宮川宏太, 1995. 1994 年合宿における甲虫の記録. 湘南昆虫, (7): 39-41.
- 守屋博文, 1994b. 相模川水系流域の甲虫 I. 研究報告第 3 集, 115-127. 相模原市教育委員会.
- 守屋博文, 1997d. 相模川水系流域の甲虫 II. 相模原市博物館研究報告, (6): 63-73.
- 中村 光, 1964. 丹沢山塊の甲虫類. 丹沢大山学術調査報告書, 361-367. 神奈川県.
- 中村康弘, 2005. 秦野市における注目すべき甲虫類の記録. 神奈川虫報, (152): 56-57.
- 中山和昭, 1983. 神奈川県におけるクビジロカミキリの記録. 月刊むし, (154): 14.
- 中山和昭, 1985a. 神奈川県初記録のカミキリ 3 種. 月刊むし, (167): 33.
- 中山和昭, 2004. 神奈川県におけるクイロチビケブカカミキリの記録. 神奈川虫報, (147): 6.
- 西 泰弘, 1997. 丹沢山地東部甲虫類調査. 動植物研究会報, (27): 233-255.
- 西村正賢, 1987a. 神奈川県およびその周辺のヨコヤマトラカミキリの分布・生態. 神奈川虫報, (82): 9-12.
- 登石成二, 1957. ヤマトシロオビトラカミキリ大山で採れる. *Insects Magazine*, (38): 12.
- 小畑 裕, 1995a. 丹沢山でヒメヨツズジハナカミキリを採集. 神奈川虫報, (110): 34.
- 大林延夫・佐藤正孝・小島圭三, 1992. 日本産カミキリ目録. 相模原市立博物館資料目録. 199pp.
- 齊藤秀生, 1980. 神奈川県下のオダヒゲナガコバナカミキリの記録. 月刊むし, (114): 38.
- 榎原陽一・岩田隆太郎・山田房男・川畑昭博, 1993. 針葉樹林における甲虫類誘引試験 (V) 神奈川県清川村丹沢山系一の沢モミ考証林. 日本林学会論文集, (104): 659-662.
- 新堀豊彦, 1985b. シラホシキスイカミキリ *Eumecocera gleneoides* (Gressitt) を採る. 神奈川虫報, (75): 25.
- 新堀豊彦, 1989. 西丹沢でオダヒゲナガコバナカミキリ. 神奈川虫報, (88): 27-28.
- 新堀豊彦, 1992. 西丹沢のオダヒゲナガコバナカミキリの追加採集例. 神奈川虫報, (100): 160.
- 塩崎圭子, 1994. 神奈川県におけるブロイニングカミキリの記録. 月刊むし, (278): 37.
- 菅谷 洋, 1997. 神奈川県で「絶滅種」に指定されていたアサカミキリを採集. 月刊むし, (322): 1.
- 鈴木和利・峰薫, 1978. ヒメハナカミキリ属の分布資料 (1). 甲虫ニュース, (43): 1-2.
- 高橋和弘, 1986. 西丹沢におけるヨコヤマヒゲナガカミキリの採集例. 神奈川虫報, (80): 26.
- 高橋和弘, 1987. 神奈川県立自然保護センターの野外施設に産する甲虫類について. 神奈川県立自然保護センター調査研究報告, (4): 31-62.
- 高橋和弘, 1989a. 神奈川県未記録のミヤマルリハナカミキリの採集例について. 神奈川虫報, (88): 4.
- 高桑正敏, 1972. 東丹沢札掛のカミキリ 2 種の記録. 神奈川虫報, (39): 34.
- 高桑正敏, 1990b. 神奈川県産の注目すべき甲虫若干. 神奈川自然史資料, (11): 121-124.
- 高桑正敏, 2000b. 南部フォッサマグナ地域におけるルリボシカミキリの分布拡大とその周辺. 月刊むし, (353): 2-17.
- 高桑正敏・堀井邦弘, 2004. 南部フォッサマグナ地域におけるクビアトラカミキリの分布拡大現象. 月刊むし, (401): 2-48.
- 高桑正敏・新堀豊彦, 2005. 北丹沢でビクニセハムシハナカミキリを採集. 神奈川虫報, (152): 5-6.
- 高崎鉄也・岩田隆太郎, 1992. 神奈川県丹沢山地におけるカミキリ目録の記録 (1). 神奈川虫報, (98): 38.
- 田尾美野留, 1987g. ラミーカミキリの遅い時期の記録. 月刊むし, (202): 6.
- 田尾美野留, 1991e. 春期に採集したフトカミキリ類. 神奈川虫報, (97): 37.
- 館野 鴻, 2004. 秦野市で採集された甲虫 4 種. 神奈川虫報, (147): 69-70.
- 東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972. 西丹沢皆瀬川流域の昆虫相. *Field*, (19): 28-42.
- 露木繁雄, 1985b. 神奈川県でのニセノコギリカミキリ目録とヘリモンヒメハナカミキリの記録. 神奈川虫報, (76): 1.
- 露木繁雄, 2005a. 山北町大野山でムネナグドラカミキリを採集. 神奈川虫報, (151): 37.
- 露木繁雄・新堀豊彦・窪田勝信・高桑正敏, 1981. 神奈川県産カミキリ目録. 神奈川県昆虫調査報告書, pp. 419-454.
- 露木繁雄・木下富夫・高桑正敏, 1997. カミキリ目録. 丹沢大山自然環境総合調査報告書, 丹沢山地動植物目録. pp. 227-242. 神奈川県.
- 露木繁雄・鈴木和利, 1975. フジヒメハナカミキリの富士山以外での記録. 甲虫ニュース, (25/26): 11.
- 上田康之, 1984b. 神奈川県におけるアカジマトラカミキリの記録. 月刊むし, (166): 6-7.
- 上田康之, 1986. 湘南地方のカミキリ目録. 湘南地方昆虫調査報告書, (2): 94-103.
- 渡辺恭平, 2004d. 西丹沢大野山におけるカミキリ 2 種の記録. 神奈川虫報, (148): 72.
- 山口就平, 1970a. 西丹沢春の甲虫. はばたき, (97): 33.
- 山本光人, 1984. 神奈川県丹沢でハイイロツツクビカミキリを採集. 月刊むし, (155): 35.
- 山崎裕志, 1985. 神奈川県におけるヨコヤマトラカミキリの記録. 月刊むし, (174): 37.