

薬食監麻発0319第1号

平成24年3月19日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長



薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして  
厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件について

平成24年厚生労働省告示第137号により、薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等（昭和38年厚生省告示第279号）を別添のとおり一部改正したので、下記の改正要旨等について御了知の上、貴管下関係業者等に対する周知徹底及び指導に遺憾なきを期されたい。

なお、国立感染症研究所長、国立医薬品食品衛生研究所長、各地方厚生局健康福祉部長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、日本製薬団体連合会会長、一般社団法人日本ワクチン産業協会理事長及び社団法人日本血液製剤協会理事長宛てに当該通知の写しを送付したことを申し添える。

#### 記

#### 1. 改正要旨

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子及び乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢについて、手数料、検定基準及び試験品の数量を改正したこと。

#### 2. 適用時期

公布日（平成24年3月19日）

適用日（平成24年4月1日）



### 3. 標準処理期間

検定に係る行政手続法（平成5年法律第88号）第6条の規定による標準処理期間については、今回の一部改正による変更は無いこと（別紙参照）。

## (別紙) 医薬品の検定に係る標準処理期間

| 製剤                               |      | 標準処理期間 (日) |
|----------------------------------|------|------------|
| インフルエンザワクチン                      |      | 60         |
| インフルエンザHAワクチン                    |      | 80         |
| 沈降インフルエンザワクチン<br>(H5N1株)         | 中間段階 | 35         |
|                                  | 最終段階 | 35         |
| 乳濁A型インフルエンザHAワクチン (H1N1株)        |      | 35         |
| 乳濁細胞培養A型インフルエンザHAワクチン<br>(H1N1株) |      | 35         |
| 乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン                |      | 100        |
| 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン                  | 中間段階 | 120        |
|                                  | 最終段階 | 60         |
| ガスエソウマ抗毒素 (ガスエソ抗毒素)              |      | 70         |
| 乾燥ガスエソウマ抗毒素 (乾燥ガスエソ抗毒素)          |      | 70         |
| 不活化狂犬病ワクチン                       |      | 70         |
| 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン                 |      | 80         |
| コレラワクチン                          |      | 60         |
| 乾燥ジフテリアウマ抗毒素 (乾燥ジフテリア抗毒素)        |      | 70         |
| ジフテリアトキソイド                       |      | 70         |
| 沈降ジフテリアトキソイド                     |      | 70         |
| 成人用沈降ジフテリアトキソイド                  |      | 70         |
| ジフテリア破傷風混合トキソイド                  |      | 70         |
| 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド                |      | 70         |
| 水痘抗原                             |      | 40         |
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン                      |      | 60         |
| 腸チフスパラチフス混合ワクチン                  |      | 60         |
| 精製ツベルクリン (一般診断用)                 |      | 80         |
| 痘そうワクチン (痘苗)                     | 中間段階 | 60         |
|                                  | 最終段階 | 60         |
| 乾燥痘そうワクチン (乾燥痘苗)                 | 中間段階 | 60         |
|                                  | 最終段階 | 60         |
| 組織培養痘そうワクチン                      | 中間段階 | 60         |
|                                  | 最終段階 | 60         |

| 製剤  |      | 標準処理期間 (日) |
|---|------|------------|
| 乾燥細胞培養痘そうワクチン                             | 中間段階 | 60         |
|   | 最終段階 | 60         |
| 日本脳炎ワクチン                                  |      | 80         |
| 乾燥日本脳炎ワクチン                                |      | 80         |
| 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン                            |      | 80         |
| 肺炎球菌ワクチン                                  |      | 60         |
| 沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン (無毒性変異ジフテリア毒素結合体)         |      | 60         |
| 破傷風トキソイド                                  |      | 70         |
| 沈降破傷風トキソイド                                |      | 70         |
| 乾燥はぶウマ抗毒素 (乾燥はぶ抗毒素)                       |      | 70         |
| 沈降はぶトキソイド                                 |      | 50         |
| 沈降B型肝炎ワクチン                                |      | 80         |
| 沈降B型肝炎ワクチン (h u G K - 1 4細胞由来)            |      | 80         |
| 組換え沈降B型肝炎ワクチン (酵母由来)                      |      | 80         |
| 組換え沈降B型肝炎ワクチン (チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞由来)        |      | 80         |
| 組換え沈降p r e - S 2抗原・HBs抗原含有B型肝炎ワクチン (酵母由来) |      | 80         |
| 乾燥BCG膀胱内用 (コンノート株)                        |      | 80         |
| 乾燥BCG膀胱内用 (日本株)                           |      | 80         |
| 乾燥BCGワクチン                                 |      | 80         |
| 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来) |      | 80         |
| 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (酵母由来)          |      | 80         |
| 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン                         |      | 70         |
| 百日せきワクチン                                  |      | 100        |
| 沈降精製百日せきワクチン                              |      | 100        |
| 百日せきジフテリア混合ワクチン                           | 中間段階 | 100        |
|   | 最終段階 | 100        |
| 百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン                        | 中間段階 | 100        |
|   | 最終段階 | 100        |

| 製剤  |      | 標準処理期間 (日) |
|---|------|------------|
| 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン<br>に使用するジフテリアトキソイド原液<br>(中間段階) |      | 40         |
| 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン<br>に使用する破傷風トキソイド原液<br>(中間段階)   |      | 60         |
| 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン<br>(最終段階)                      |      | 130        |
| 乾燥弱毒生風しんワクチン  | 中間段階 | 120        |
|   | 最終段階 | 60         |
| 乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイ<br>ド結合体)                       |      | 60         |
| 発しんチフスワクチン  |      | 70         |
| 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素(乾燥ボツリヌス抗毒<br>素)                          |      | 70         |
| 経口生ポリオワクチン  | 中間段階 | 160        |
|   | 最終段階 | 70         |
| 乾燥弱毒生麻しんワクチン  | 中間段階 | 120        |
|   | 最終段階 | 60         |
| 乾燥弱毒生麻しんおたふくか<br>ぜ風しん混合ワクチン                           | 中間段階 | 120        |
|   | 最終段階 | 60         |
| 乾燥弱毒生麻しん風しん混合<br>ワクチン                                 | 中間段階 | 120        |
|   | 最終段階 | 60         |
| 乾燥まむしウマ抗毒素(乾燥まむし抗毒素)                                  |      | 70         |
| 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン                                     |      | 70         |
| ワイル病秋やみ混合ワクチン   |      | 70         |
| 加熱人血漿たん白  |      | 50         |
| 人血清アルブミン  |      | 50         |
| 乾燥人フィブリノゲン  |      | 50         |
| 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子   |      | 50         |
| 人免疫グロブリン  |      | 60         |
| アルキル化人免疫グロブリン   |      | 60         |
| 乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン                                   |      | 60         |
| 乾燥スルホ化人免疫グロブリン  |      | 60         |

| 製剤                            | 標準処理期間(日) |
|-------------------------------|-----------|
| p H 4 処理酸性人免疫グロブリン            | 60        |
| 乾燥 p H 4 処理人免疫グロブリン           | 60        |
| 乾燥プラスミン処理人免疫グロブリン             | 60        |
| 乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン              | 60        |
| ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン         | 60        |
| 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン       | 60        |
| 抗HB s 人免疫グロブリン                | 60        |
| 乾燥抗HB s 人免疫グロブリン              | 60        |
| ポリエチレングリコール処理抗HB s 人免疫グロブリン   | 60        |
| 乾燥ポリエチレングリコール処理抗HB s 人免疫グロブリン | 60        |
| 抗D (R h o) 人免疫グロブリン           | 50        |
| 乾燥抗D (R h o) 人免疫グロブリン         | 50        |
| 抗破傷風人免疫グロブリン                  | 60        |
| 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン                | 60        |
| ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン     | 60        |
| 乾燥ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン   | 60        |
| 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ                | 60        |
| 人ハプトグロビン                      | 60        |

(備考) 再抜き取り、再試験に要する期間を含まない。