

薬生発0328第1号  
平成29年3月28日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局長  
(公印省略)

### 一般用漢方製剤製造販売承認基準について

一般用漢方製剤については、「一般用漢方製剤承認基準」(平成24年8月30日薬食審査発0830第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知。以下「旧基準」という。)により取り扱ってきたところですが、今般、一部の一般用漢方製剤の製造販売の承認の権限が都道府県知事に委任されることに伴い、「一般用漢方製剤製造販売承認基準」(以下「本基準」という。)として取り扱うこととしましたので、下記の点に御留意の上、貴管下関係業者に対し、周知するとともに、円滑な事務処理が行われるよう御配慮をお願いします。

本基準は、平成29年4月1日以降に製造販売承認申請される品目に適用します。ただし、本基準に適合しないものについては、従前のとおりの審査を行うこととします。

また、本基準の施行に伴い、旧基準は廃止します。

### 記

#### 1 改正の概要

- (1) 名称を「一般用漢方製剤承認基準」から「一般用漢方製剤製造販売承認基準」に改めたこと。
- (2) 旧基準に記載されていた旧処方番号の削除等の所要の整備を行ったこと。

#### 2 既存の通知等については、本基準を引用する等している場合には、別途の通知等が発出されない限り、必要な読み替えを行った上で、引き続き適用されるものであること。



別添

## 一般用漢方製剤製造販売承認基準

厚生労働省医薬・生活衛生局  
平成 29 年 4 月 1 日

処方番号 処方名

1 安中散

〔成分・分量〕 桂皮 3-5、延胡索 3-4、牡蛎 3-4、茴香 1.5-2、縮砂 1-2、甘草 1-2、良姜 0.5-1

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 1-2g 1日 2-3回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、腹部は力がなくて、胃痛又は腹痛があつて、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症：  
神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱

1 A 安中散加茯苓

〔成分・分量〕 桂皮 3-5、延胡索 3-4、牡蛎 3-4、茴香 1.5-2、縮砂 1-2、甘草 1-2、良姜 0.5-1、茯苓 5

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 1-2g 1日 2-3回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、腹部は力がなくて、神経過敏で胃痛又は腹痛があつて、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症：  
神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱

2 胃風湯

〔成分・分量〕 当帰 2.5-3、芍薬 3、川芎 2.5-3、人参 3、白朮 3、茯苓 3-4、桂皮 2-3、粟 2-4

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、顔色悪くて食欲なく、疲れやすいものの次の諸症：  
急・慢性胃腸炎、冷えによる下痢

3 胃苓湯

〔成分・分量〕 蒼朮 2.5-3、厚朴 2.5-3、陳皮 2.5-3、猪苓 2.5-3、沢瀉 2.5-3、芍薬 2.5-3、白朮 2.5-3、茯苓 2.5-3、桂皮 2-2.5、大棗 1-3、生姜 1-2、甘草 1-2、縮砂 2、黃連 2 (芍薬、縮砂、黃連のない場合も可)

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 1-2g 1日 3回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、水様性の下痢、嘔吐があり、口渴、尿量減少を伴うものの次の諸症：  
食あたり、暑氣あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛

4 茵陳蒿湯

〔成分・分量〕 茵陳蒿 4-14、山梔子 1.4-5、大黃 1-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、口渴があり、尿量少なく、便秘するものの次の諸症：  
じんましん、口内炎、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ

- 5 烏薬順氣散
- 〔成分・分量〕 麻黄 2.5-3、陳皮 2.5-5、烏薬 2.5-5、川芎 2-3、白彊蚕 1.5-2.5、枳殼 1.5-3、白芷 1.5-3、甘草 1-1.5、桔梗 2-3、乾姜 1-2.5、生姜 1、大棗 1-3（生姜・大棗を抜いても可）
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度のものの次の諸症：  
しびれ、筋力の低下、四肢の痛み、肩こり
- 6 烏苓通氣散
- 〔成分・分量〕 烏薬 2-3.5、当帰 2-3.5、芍藥 2-3.5、香附子 2-3.5、山査子 2-3.5、陳皮 2-3.5、茯苓 1-3、白朮 1-3、檳榔子 1-2、延胡索 1-2.5、沢瀉 1-2、木香 0.6-1、甘草 0.6-1、生姜 1（ヒネショウガを用いる場合 2）
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 下腹部の痛み、乳腺の痛み
- 《備考》 注） 体力に関わらず、使用できる。  
【注） 表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】
- 7 溫經湯
- 〔成分・分量〕 半夏 3-5、麦門冬 3-10、当帰 2-3、川芎 2、芍藥 2、人參 2、桂皮 2、阿膠 2、牡丹皮 2、甘草 2、生姜 1、吳茱萸 1-3
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以下で、手足がほてり、唇がかわくものの次の諸症：  
月経不順、月経困難、こしけ（おりもの）、更年期障害、不眠、神経症、湿疹・皮膚炎、足腰の冷え、しもやけ、手あれ（手の湿疹・皮膚炎）
- 8 溫清飲
- 〔成分・分量〕 当帰 3-4、地黃 3-4、芍藥 3-4、川芎 3-4、黃連 1-2、黃芩 1.5-3、山梔子 1.5-2、黃柏 1-1.5
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度で、皮膚はかさかさして色つやが悪く、のぼせるものの次の諸症：  
月経不順、月経困難、血の道症<sup>注)</sup>、更年期障害、神経症、湿疹・皮膚炎
- 《備考》 注） 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。  
【注） 表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】

9 温胆湯

〔成分・分量〕 半夏 4-6、茯苓 4-6、生姜 1-2 (ヒネショウガを使用する場合 3)、陳皮 2-3、竹茹 2-3、枳実 1-2、甘草 1-2、黃連 1、酸棗仁 1-3、大棗 2 (黃連以降のない場合も可)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、胃腸が虚弱なものの次の諸症：  
不眠症、神経症

9 A 加味温胆湯

〔成分・分量〕 半夏 3.5-6、茯苓 3-6、陳皮 2-3、竹茹 2-3、生姜 1-2、枳実 1-3、甘草 1-2、遠志 2-3、玄参 2 (五味子 3 に変えても可)、人参 2-3、地黃 2-3、酸棗仁 1-5、大棗 2、黃連 1-2 (黃連のない場合も可)  
(遠志、玄参、人参、地黃、大棗のない場合もある)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、胃腸が虚弱なものの次の諸症：  
神経症、不眠症

9 B 竹茹温胆湯

〔成分・分量〕 柴胡 3-6、竹茹 3、茯苓 3、麥門冬 3-4、陳皮 2-3、枳實 1-3、黃連 1-4.5、甘草 1、半夏 3-5、香附子 2-2.5、生姜 1、桔梗 2-3、人参 1-2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度のものの次の諸症：  
かぜ、インフルエンザ、肺炎などの回復期に熱が長びいたり、  
また平熱になっても、気分がさっぱりせず、せきやたんが多く  
て安眠が出来ないもの

10 越婢加朮湯

〔成分・分量〕 麻黄 4-6、石膏 8-10、生姜 1 (ヒネショウガを使用する場合 3)、大棗 3-5、甘草 1.5-2、白朮 3-4 (蒼朮も可)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、むくみがあり、のどが渴き、汗が出て、ときには尿量が減少するものの次の諸症：  
むくみ、関節のはれや痛み、関節炎、湿疹・皮膚炎、夜尿症、  
目のかゆみ・痛み

10 A 越婢加朮附湯

〔成分・分量〕 麻黄 4-6、石膏 8-10、白朮 3-4 (蒼朮も可)、加工ブシ 0.3-1、生姜 1 (ヒネショウガを使用する場合 3)、甘草 1.5-2、大棗 3-4

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、冷えがあって、むくみがあり、のどが渴き、汗が出て、ときには尿量が減少するものの次の諸症：  
むくみ、関節のはれや痛み、筋肉痛、湿疹・皮膚炎、夜尿症、  
目のかゆみ・痛み

10B 桂枝越婢湯

[成分・分量] 桂皮4、芍薬4、甘草2、麻黃5、生姜1(ヒネショウガを使用する場合2.5)、大棗3、石膏8、蒼朮4、加工ブシ1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下のものの次の諸症：  
関節のはれや痛み

10C 桂枝二越婢一湯

[成分・分量] 桂皮2.5-3.5、芍薬2.5-3.5、麻黃2.5-3.5、甘草2.5-3.5、大棗3-4、石膏3-8、生姜1(ヒネショウガを使用する場合2.8-3.5)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、のどが渴き、汗が出るもの次の諸症：  
感冒、頭痛、腰痛、筋肉痛、関節のはれや痛み

10D 桂枝二越婢一湯加朮附

[成分・分量] 桂皮2.5、芍薬2.5、甘草2.5、麻黃2.5、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3.5)、大棗3、石膏3、白朮3(蒼朮も可)、加工ブシ0.5-1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、冷えがあって、のどが渴き、汗が出て、ときに尿量が減少するものの次の諸症：  
関節のはれや痛み、筋肉痛、腰痛、頭痛

11 延年半夏湯

[成分・分量] 半夏3-5、柴胡2-5、別甲2-5、桔梗2-4、檳榔子2-4、人参0.8-2、生姜1-2、枳実0.5-2、吳茱萸0.5-2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、みぞおちに抵抗感があって、肩がこり、足が冷えるものの次の諸症：  
慢性胃炎、胃痛、食欲不振

12 黃芩湯

[成分・分量] 黃芩4-9、芍薬2-8、甘草2-6、大棗4-9

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、腹痛、みぞおちのつかえがあり、ときにさむけ、発熱などがあるものの次の諸症：  
下痢、胃腸炎

1 3 応鐘散（芎黃散）

〔成分・分量〕 大黃 1、川芎 2

〔用法・用量〕 (1) 散：1回に頓用する。

(2) 湯：上記量を1日量

〔効能・効果〕 体力中等度以上のものの次の諸症：

便秘、便秘に伴うのぼせ・肩こり

1 4 黃連阿膠湯

〔成分・分量〕 黃連 3-4、芍藥 2-2.5、黃芩 1-2、阿膠 3、卵黃 1個

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、冷えやすくのぼせ氣味で胸苦しく不眠の傾向のあるものの次の諸症：

鼻血、不眠症、かさかさした湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ

1 5 黃連解毒湯

〔成分・分量〕 黃連 1.5-2、黃芩 3、黃柏 1.5-3、山梔子 2-3

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 1.5-2g 1日 3回

(2) 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、のぼせぎみで顔色赤く、いらいらして落ち着かない傾向のあるものの次の諸症：

鼻出血、不眠症、神經症、胃炎、二日酔、血の道症<sup>注)</sup>、めまい、動悸、更年期障害、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ、口内炎

《備考》 注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神經症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

1 6 黃連湯

〔成分・分量〕 黃連 3、甘草 3、乾姜 3、人参 2-3、桂皮 3、大棗 3、半夏 5-8

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、胃部の停滞感や重圧感、食欲不振があり、ときにはきけや嘔吐のあるものの次の諸症：

胃痛、急性胃炎、二日酔、口内炎

1 7 乙字湯

〔成分・分量〕 当帰 4-6、柴胡 4-6、黃芩 3-4、甘草 1.5-3、升麻 1-2、大黃 0.5-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、大便がかたく、便秘傾向のあるものの次の諸症：

痔核（いぼ痔）、きれ痔、便秘、軽度の脱肛

17 A 乙字湯去大黃

[成分・分量] 当帰 4-6、柴胡 4-6、黃芩 3-4、甘草 1.5-3、升麻 1-2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：  
痔核（いぼ痔）、きれ痔、軽度の脱肛

18 解急蜀椒湯

[成分・分量] 蜀椒 1-2、加工ブシ 0.3-1、粳米 7-8、乾姜 1.5-4、半夏 4-8、  
大棗 3、甘草 1-2、人参 2-3、膠飴 20（膠飴はなくても可）

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、腹部が冷えて痛み、あるいは腹が張って、  
ときに嘔吐を伴うものの次の諸症：  
冷え腹、急性胃腸炎、腹痛

19 加減涼膈散（浅田）

[成分・分量] 連翹 3、黃芩 3、山梔子 3、桔梗 3、薄荷 2、甘草 1、大黃 1、  
石膏 10

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以上で、胃腸の調子がすぐれないものの次の諸症：  
口内炎、口の中の炎症

20 加減涼膈散（龔廷賢）

[成分・分量] 連翹 2-3、黃芩 2-3、山梔子 1.5-3、桔梗 2-3、黃連 1-2、薄荷  
1-2、当帰 2-4、地黃 2-4、枳実 1-3、芍藥 2-4、甘草 1-1.5

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、胃腸の調子がすぐれないものの次の諸症：  
口内炎、口の中の炎症

21 薑香正氣散

[成分・分量] 白朮 3、茯苓 3-4、陳皮 2-3、白芷 1-4、薑香 1-4、大棗 1-3、甘  
草 1-1.5、半夏 3、厚朴 2-3、桔梗 1.5-3、蘇葉 1-4、大腹皮 1-4、  
生姜 1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下のものの次の諸症：  
感冒、暑さによる食欲不振、急性胃腸炎、下痢、全身倦怠

22 葛根黃連黃芩湯

[成分・分量] 葛根 5-6、黃連 3、黃芩 3、甘草 2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度のものの次の諸症：  
下痢、急性胃腸炎、口内炎、舌炎、肩こり、不眠

2.3 葛根紅花湯

[成分・分量] 葛根3、芍薬3、地黃3、黃連1.5、山梔子1.5、紅花1.5、大黃1、甘草1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以上で、便秘傾向のものの次の諸症：  
あかはな（酒さ）、しみ

2.4 葛根湯

[成分・分量] 葛根4-8、麻黃3-4、大棗3-4、桂皮2-3、芍薬2-3、甘草2、生姜1-1.5

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以上のものの次の諸症：  
感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

2.4 A 葛根湯加川芎辛夷

[成分・分量] 葛根4-8、麻黃3-4、大棗3-4、桂皮2-3、芍薬2-3、甘草2、生姜1-1.5、川芎2-3、辛夷2-3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 比較的体力があるものの次の諸症：  
鼻づまり、蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎

2.4 B 独活葛根湯

[成分・分量] 葛根5、桂皮3、芍薬3、麻黃2、独活2、生姜0.5-1（ヒネショウガを使用する場合1-2）、地黃4、大棗1-2、甘草1-2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：  
四十肩、五十肩、寝ちがえ、肩こり

2.5 加味解毒湯

[成分・分量] 黃連2、黃芩2、黃柏2、山梔子2、柴胡2、茵陳蒿2、龍胆2、木通2、滑石3、升麻1.5、甘草1.5、燈心草1.5、大黃1.5  
(大黃のない場合も可)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 比較的体力があり、血色がよいものの次の諸症：  
小便がしぶって出にくいもの、痔疾（いぼ痔、痔痛、痔出血）

26 桂樓薤白白酒湯

〔成分・分量〕 桂樓実 2-5 (桂樓仁も可)、薤白 4-9.6、白酒 140-700 (日本酒も可)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 背部にひびく胸部・みぞおちの痛み、胸部の圧迫感

〔備考〕 注) 体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】

26A 桂樓薤白湯

〔成分・分量〕 桂樓仁 2、薤白 10、十薬 6、甘草 2、桂皮 4、防已 4

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 背部にひびく胸部・みぞおちの痛み、胸部の圧迫感

〔備考〕 注) 体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】

27 乾姜人参半夏丸

〔成分・分量〕 乾姜 3、人参 3、半夏 6

〔用法・用量〕 (1) 散 : 1回 1.5-5g 1日 3回

(2) 湯 : 上記量を 1 日量とする。

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、はきけ・嘔吐が続きみぞおちのつかえを感じるもの次の諸症 :

つわり、胃炎、胃腸虚弱

28 甘草乾姜湯

〔成分・分量〕 甘草 4-8、乾姜 2-4

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、手足が冷え、薄い唾液が口に溜まるものの次の諸症 :

頻尿、尿もれ、唾液分泌過多、鼻炎、しゃっくり、めまい

29 甘草湯

〔成分・分量〕 甘草 2-8

〔用法・用量〕 (1) 散 : 1回 0.5g 1日 2回

(2) 湯 : 少しづつゆっくり飲む。

(3) 外用 : 煎液で患部を温湿布する。

〔効能・効果〕 激しいせき、咽喉痛、口内炎、しづがれ声

外用 : 痒・脱肛の痛み

〔備考〕 注) 体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】

3 0 甘草附子湯

[成分・分量] 甘草 2-3、加工ブシ 0.5-2、白朮 2-6、桂皮 3-4

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、痛みを伴うものの次の諸症：  
関節のはれや痛み、神経痛、感冒

3 1 甘麦大棗湯

[成分・分量] 甘草 3-5、大棗 2.5-6、小麦 14-20

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、神経が過敏で、驚きやすく、ときにあくび  
が出るもの次の諸症：  
不眠症、小児の夜泣き、ひきつけ

3 2 甘露飲

[成分・分量] 熟地黄 2-3、乾地黄 2-2.5、麦門冬 2-3、枳実 1-2.5、甘草 2-2.5、  
茵陳蒿 2-2.5、枇杷葉 2-2.5、石斛 2-2.5、黃芩 2-3、天門冬 2-3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下のものの次の諸症：  
口内炎、舌の荒れや痛み、歯周炎

3 3 桔梗湯

[成分・分量] 桔梗 1-4、甘草 2-8

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきがで  
るもの次の諸症：  
扁桃炎、扁桃周囲炎

3 4 帰脾湯

[成分・分量] 人参 2-4、白朮 2-4 (蒼朮も可)、茯苓 2-4、酸棗仁 2-4、竜眼肉  
2-4、黃耆 2-4、当帰 2、遠志 1-2、甘草 1、木香 1、大棗 1-2、  
生姜 1-1.5

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪いものの次の諸症：  
貧血、不眠症、神経症、精神不安

3 4 A 加味帰脾湯

[成分・分量] 人参 3、白朮 3 (蒼朮も可)、茯苓 3、酸棗仁 3、竜眼肉 3、黃耆  
2-3、当帰 2、遠志 1-2、柴胡 2.5-3、山梔子 2-2.5、甘草 1、木  
香 1、大棗 1-2、生姜 1-1.5、牡丹皮 2 (牡丹皮はなくても可)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪く、ときに熱感を伴  
うものの次の諸症：  
貧血、不眠症、精神不安、神経症

### 3 5 菖帰調血飲

〔成分・分量〕 当帰 2-2.5、地黃 2-2.5、川芎 2-2.5、白朮 2-2.5（蒼朮も可）、茯苓 2-2.5、陳皮 2-2.5、烏藥 2-2.5、大棗 1-1.5、香附子 2-2.5、甘草 1、牡丹皮 2-2.5、益母草 1-1.5、乾姜 1-1.5、生姜 0.5-1.5（生姜はなくても可）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。  
月経不順、産後の神經症・体力低下

### 3 5 A 菖帰調血飲第一加減

〔成分・分量〕 当帰 2、川芎 2、地黃 2、白朮 2（蒼朮も可）、茯苓 2、陳皮 2、烏藥 2、香附子 2、牡丹皮 2、益母草 1.5、大棗 1.5、甘草 1、乾姜 1-1.5、生姜 0.5-1.5（生姜はなくても可）、芍藥 1.5、桃仁 1.5、紅花 1.5、枳實 1.5、桂皮 1.5、牛膝 1.5、木香 1.5、延胡索 1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。  
血の道症<sup>注)</sup>、月経不順、産後の体力低下

《備考》 注） 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神經症状および身体症状のことである。

【注）表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

### 3 6 響声破笛丸

〔成分・分量〕 連翹 2.5、桔梗 2.5、甘草 2.5、大黃 1、縮砂 1、川芎 1、訶子 1、阿仙藥 2、薄荷葉 4（大黃のない場合も可）

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 2-3g 1日数回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 しわがれ声、咽喉不快

《備考》 注） 体力に関わらず、使用できる。

【注）表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

### 3 7 杏蘇散

〔成分・分量〕 蘇葉 3、五味子 2、大腹皮 2、烏梅 2、杏仁 2、陳皮 1-1.5、桔梗 1-1.5、麻黃 1-1.5、桑白皮 1-1.5、阿膠 1-1.5、甘草 1-1.5、紫苑 1

〔用法・用量〕 湯（原則として）

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、気分がすぐれず、汗がなく、ときに顔がむくむものの次の諸症：  
せき、たん、気管支炎

3 8 苦参湯

〔成分・分量〕 苦参 6-10

〔用法・用量〕 水 500-600mL で煮て 250-300mL とし外用する。

〔効能・効果〕 ただれ、あせも、かゆみ

3 9 駆風解毒散（湯）

〔成分・分量〕 防風 3-5、牛蒡子 3、連翹 5、荊芥 1.5、羌活 1.5、甘草 1.5、桔梗 3、石膏 5-10

〔用法・用量〕 湯（本処方は熱ければ冷ましてうがいしながら少しづつゆっくり飲む）

〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むものの次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

4 0 九味欒榔湯

〔成分・分量〕 欒榔子 4、厚朴 3、桂皮 3、橘皮 3、蘇葉 1-2、甘草 1、大黃 0.5-1、木香 1、生姜 1（ヒネショウガを使用する場合 3）（大黃を去り、吳茱萸 1、茯苓 3 を加えても可）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、全身倦怠感があり、とくに下肢の倦怠感が著しいものの次の諸症：

疲労倦怠感、更年期障害、動悸、息切れ、むくみ、神経症、胃腸炎、関節のはれや痛み

4 1 荊芥連翹湯

〔成分・分量〕 当帰 1.5、芍薬 1.5、川芎 1.5、地黃 1.5、黃連 1.5、黃芩 1.5、黃柏 1.5、山梔子 1.5、連翹 1.5、荊芥 1.5、防風 1.5、薄荷葉 1.5、枳殼（実） 1.5、甘草 1-1.5、白芷 1.5-2.5、桔梗 1.5-2.5、柴胡 1.5-2.5（地黃、黃連、黃柏、薄荷葉のない場合も可）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症：

蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび

4 2 鷄肝丸

〔成分・分量〕 鷄肝 1 具

鷄肝 1 具をとりゆでて乾燥し、山薑末（鷄肝の乾燥した量の 2-3 倍量をめやすとする。）を和しつつ細末とし糊丸とする。

〔用法・用量〕 丸：1 回 2g 1 日 3 回

〔効能・効果〕 体力虚弱なものの次の症状：  
虚弱体質

#### 4.3 桂姜棗草黃辛附湯

〔成分・分量〕桂皮3、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3)、甘草2、大棗3-3.5、麻黃2、細辛2、加工ブシ0.3-1

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力中等度以下で、さむけを訴えるものの次の諸症：  
感冒、気管支炎、関節のはれや痛み、水様性鼻汁を伴う鼻炎、  
神經痛、腰痛、冷え症

#### 4.4 桂枝加黃耆湯

〔成分・分量〕桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、黃耆2-3

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力虚弱なものの次の諸症：  
ねあせ、あせも、湿疹・皮膚炎

#### 4.4A 黃耆桂枝五物湯

〔成分・分量〕黃耆3、芍薬3、桂皮3、生姜1.5-2(ヒネショウガを使用する場合5-6)、大棗3-4

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力中等度以下のものの次の諸症：  
身体や四肢のしびれ、顔面・口腔内のしびれ、湿疹・皮膚炎

#### 4.5 桂枝加芍薬湯

〔成分・分量〕桂皮3-4、芍薬6、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力中等度以下で、腹部膨満感のあるものの次の諸症：  
しぶり腹<sup>(注)</sup>、腹痛、下痢、便秘

《備考》注) しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】

#### 4.5A 桂枝加芍薬生姜人参湯

〔成分・分量〕桂皮2.4-4、大棗2.4-4、芍薬3.2-6、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合4-5.5)、甘草1.6-2、人参2.4-4.5

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力虚弱なものの次の諸症：  
みぞおちのつかえ、腹痛、手足の痛み

#### 4 5 B 桂枝加芍薬大黃湯

〔成分・分量〕 桂皮 3-4、芍薬 4-6、大棗 3-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、甘草 2、大黃 1-2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、腹部膨満感、腹痛があり、便秘するものの次の諸症：

便秘、しぶり腹<sup>注)</sup>

《備考》 注) しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。

【注）表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

#### 4 6 桂枝加朮附湯

〔成分・分量〕 桂皮 3-4、芍薬 3-4、大棗 3-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、甘草 2、蒼朮 3-4 (白朮も可)、加工ブシ 0.5-1

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、汗が出、手足が冷えてこわばり、ときに尿量が少ないものの次の諸症：

関節痛、神経痛

#### 4 6 A 桂枝加苓朮附湯

〔成分・分量〕 桂皮 3-4、芍薬 3-4、大棗 3-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、甘草 2、蒼朮 3-4 (白朮も可)、加工ブシ 0.5-1、茯苓 4

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、手足が冷えてこわばり、尿量が少なく、ときに動悸、めまい、筋肉のぴくつきがあるものの次の諸症：  
関節痛、神経痛

#### 4 7 桂枝加龍骨牡蠣湯

〔成分・分量〕 桂皮 3-4、芍薬 3-4、大棗 3-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、甘草 2、龍骨 3、牡蠣 3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、疲れやすく、神經過敏で、興奮しやすいものの次の諸症：  
神經質、不眠症、小兒夜泣き、夜尿症、眼精疲労、神經症

#### 4 8 桂枝芍薬知母湯

〔成分・分量〕 桂皮 3-4、芍薬 3-4、甘草 1.5-2、麻黃 2-3、生姜 1-2 (ヒネショウガを使用する場合 3-5)、白朮 4-5 (蒼朮も可)、知母 2-4、防風 3-4、加工ブシ 0.3-1

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、皮膚が乾燥し、四肢あるいは諸関節のはれが慢性に経過して、痛むものの次の諸症：  
関節のはれや痛み、関節炎、神経痛

4 9 桂枝湯

〔成分・分量〕 桂皮 3-4、芍薬 3-4、大棗 3-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、甘草 2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、汗が出るもの次の症状：  
かぜの初期

4 9 A 桂枝加葛根湯

〔成分・分量〕 桂皮 2.4-4、芍薬 2.4-4、大棗 2.4-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 2.4-4)、甘草 1.6-2、葛根 3.2-6

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、汗が出て、肩こりや頭痛のあるものの次の症状：  
かぜの初期

4 9 B 桂枝加厚朴杏仁湯

〔成分・分量〕 桂皮 2.4-4、芍薬 2.4-4、大棗 2.4-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、甘草 1.6-2、厚朴 1-4、杏仁 1.6-4

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱なものの次の諸症：  
せき、気管支炎、気管支ぜんそく

5 0 桂枝茯苓丸

〔成分・分量〕 桂皮 3-4、茯苓 4、牡丹皮 3-4、桃仁 4、芍薬 4

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 2-3g 1日 3回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：  
月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症<sup>注)</sup>、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

《備考》 注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

### 50A 桂枝茯苓丸料加薏苡仁

〔成分・分量〕桂皮3-4、茯苓4、牡丹皮3-4、桃仁4、芍藥4、薏苡仁10-20

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：  
にきび、しみ、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）、月經不順、血の道症<sup>注)</sup>

《備考》注）血の道症とは、月經、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

### 50B 甲字湯

〔成分・分量〕桂皮3-4、茯苓3-4、牡丹皮3-4、桃仁3-4、芍藥3-4、甘草1.5、生姜1-1.5（ヒネショウガを使用する場合3）

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：  
月經不順、月經異常、月經痛、更年期障害、血の道症<sup>注)</sup>、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ

《備考》注）血の道症とは、月經、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

### 51 啓脾湯

〔成分・分量〕人参3、白朮3-4（蒼朮也可）、茯苓3-4、蓮肉3、山藥3、山楂子2、陳皮2、沢瀉2、大棗1、生姜1（ヒネショウガを使用する場合3）、甘草1（大棗、生姜はなくても可）

〔用法・用量〕(1) 散：1回1-2g 1日3回

(2) 湯

〔効能・効果〕体力虚弱で、痩せて顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向があるものの次の諸症：  
胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢

### 52 荊防敗毒散

〔成分・分量〕荊芥1.5-2、防風1.5-2、羌活1.5-2、独活1.5-2、柴胡1.5-2、薄荷葉1.5-2、連翹1.5-2、桔梗1.5-2、枳殼（又は枳実）1.5-2、川芎1.5-2、前胡1.5-2、金銀花1.5-2、甘草1-1.5、生姜1

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕比較的体力があるものの次の諸症：  
急性化膿性皮膚疾患の初期、湿疹・皮膚炎

5 3 桂麻各半湯

〔成分・分量〕 桂皮 3.5、芍薬 2、生姜 0.5-1 (ヒネショウガを使用する場合 2)、甘草 2、麻黄 2、大棗 2、杏仁 2.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：  
感冒、せき、かゆみ

5 4 鷄鳴散加茯苓

〔成分・分量〕 檳榔子 3-4、木瓜 3、橘皮 2-3、桔梗 2-3、茯苓 4-6、吳茱萸 1-1.5、蘇葉 1-2、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度のものの次の諸症：  
下肢の倦怠感、ふくらはぎの緊張・圧痛

5 5 外台四物湯加味

〔成分・分量〕 桔梗 3、紫苑 1.5、甘草 2、麥門冬 9、人参 1.5、貝母 2.5、杏仁 4.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 のどが痛くて声が出ない感冒

《備考》 注) 体力に関わらず、使用できる。

【注】 表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〔効能・効果に関連する注意〕 として記載する。】

5 6 堅中湯

〔成分・分量〕 半夏 5、茯苓 5、桂皮 4、大棗 3、芍薬 3、乾姜 3 (生姜 1 でも可)、甘草 1-1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、ときに胃部に水がたまる感じのするものの次の諸症：  
慢性胃炎、腹痛

5 7 香砂養胃湯

〔成分・分量〕 白朮 2.5-3、茯苓 2.5-3、蒼朮 2、厚朴 2-2.5、陳皮 2-2.5、香附子 2-2.5、白豆蔻 2 (小豆蔻代用可)、人参 1.5-2、木香 1.5、縮砂 1.5-2.5、甘草 1.5-2.5、大棗 1.5-2.5、生姜 0.7-1

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱なものの次の諸症：  
胃弱、胃腸虚弱、慢性胃腸炎、食欲不振

## 5 8 香蘇散

〔成分・分量〕 香附子 3.5-4.5、蘇葉 1-3、陳皮 2-3、甘草 1-1.5、生姜 1-2

〔用法・用量〕 (1) 散 : 1回 1-2g 1日 3回

(2) 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、神経過敏で気分がすぐれず胃腸の弱いものの次の諸症 :

かぜの初期、血の道症<sup>注)</sup>

《備考》 注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〔効能・効果に関する注意〕として記載する。】

## 5 9 厚朴生姜半夏人參甘草湯

〔成分・分量〕 厚朴 3、ヒネショウガ 3 (生姜を使用する場合 1)、半夏 4、人參 1.5、甘草 2.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、腹部膨満感のあるものの次の諸症 :  
胃腸虚弱、嘔吐

## 6 0 牛膝散

〔成分・分量〕 牛膝 3、桂皮 3、芍藥 3、桃仁 3、当帰 3、牡丹皮 3、延胡索 3、木香 1

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 比較的体力があるものの次の諸症 :  
月経困難、月経不順、月経痛

## 6 1 五積散

〔成分・分量〕 荻苓 2-3、蒼朮 2-3 (白朮も可)、陳皮 2-3、半夏 2-3、当帰 1.2-3、芍藥 1-3、川芎 1-3、厚朴 1-3、白芷 1-3、枳殼 (実) 1-3、桔梗 1-3、乾姜 1-1.5、生姜 0.3-0.6 (ヒネショウガを使用する場合 1-2)、桂皮 1-1.5、麻黃 1-2.5、大棗 1-2、甘草 1-1.2、香附子 1.2 (生姜、香附子のない場合も可)

〔用法・用量〕 湯 (原則として)

〔効能・効果〕 体力中等度又はやや虚弱で、冷えがあるものの次の諸症 :  
胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、更年期障害、感冒

## 6 2 吳茱萸湯

〔成分・分量〕 吳茱萸 3-4、大棗 2-4、人參 2-3、生姜 1-2 (ヒネショウガを使用する場合 4-6)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、手足が冷えて肩がこり、ときにみぞおちが膨満するものの次の諸症 :  
頭痛、頭痛に伴うはきけ・嘔吐、しゃっくり

6 3 五物解毒散

〔成分・分量〕 川芎 5、金銀花 2、十葉 2、大黃 1、荊芥 1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上のものの次の諸症：  
かゆみ、湿疹・皮膚炎

6 4 五淋散

〔成分・分量〕 茯苓 5-6、当帰 3、黃芩 3、甘草 3、芍藥 1-2、山梔子 1-2、地黃 3、沢瀉 3、木通 3、滑石 3、車前子 3 (地黃以下のない場合も可)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度のものの次の諸症：  
頻尿、排尿痛、残尿感、尿のにごり

6 5 五苓散

〔成分・分量〕 沢瀉 4-6、猪苓 3-4.5、茯苓 3-4.5、蒼朮 3-4.5 (白朮も可)、桂皮 2-3

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 1-2g 1日 3回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、のどが渴いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：  
水様性下痢、急性胃腸炎 (しぶり腹<sup>注</sup>) のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔

《備考》 <sup>注</sup> しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。

【注】 表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〔効能・効果に関する注意〕として記載する。】

6 5 A 茵陳五苓散

〔成分・分量〕 沢瀉 4.5-6、茯苓 3-4.5、猪苓 3-4.5、蒼朮 3-4.5 (白朮も可)、桂皮 2-3、茵陳蒿 3-4

〔用法・用量〕 (1) 散：散の場合は茵陳五苓散のうち茵陳蒿を除いた他の生薬を湯の場合の 1/8 量を用いるか、茵陳五苓散のうち茵陳蒿を除いた他の生薬の合計が茵陳蒿の半量となるように用いる。(1回 1-2g 1日 3回)

(2) 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上をめやすとして、のどが渴いて、尿量が少ないものの次の諸症：  
嘔吐、じんましん、二日酔、むくみ

6 5 B 四苓湯

〔成分・分量〕 沢瀉 4、茯苓 4、蒼朮 4 (白朮も可)、猪苓 4

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 1-1.5g 1日 2-3回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、のどが渴いて水を飲んでも尿量が少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、むくみなどのいずれかを伴うものの次の諸症：  
暑気あたり、急性胃腸炎、むくみ

6 6 柴葛解肌湯

〔成分・分量〕 柴胡 3-5、葛根 2.5-4、麻黄 2-3、桂皮 2-3、黄芩 2-3、芍藥 2-3、半夏 2-4、生姜 1 (ヒネショウガを使用する場合 1-2)、甘草 1-2、石膏 4-8

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、激しい感冒様症状を示すものの次の諸症：  
発熱、悪寒、頭痛、四肢の痛み、口渴、不眠、鼻腔乾燥、食欲不振、はきけ、全身倦怠

6 6 A 柴葛湯加川芎辛夷

〔成分・分量〕 柴胡 6、半夏 3.5、黄芩 3、桂皮 5、芍藥 3、葛根 6、麻黄 2、竹節人参 2、甘草 1、大棗 1.2、生姜 2.5、川芎 3、辛夷 2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上のものの次の諸症：  
慢性に経過した鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）

6 7 柴梗半夏湯

〔成分・分量〕 柴胡 4、半夏 4、桔梗 2-3、杏仁 2-3、桔梗仁 2-3、黄芩 2.5、大棗 2.5、枳実 1.5-2、青皮 1.5-2、甘草 1-1.5、生姜 1.5 (ヒネショウガを使用する場合 2.5)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、かぜがこじれたものの次の症状：  
腹にひびく強度のせき

6 8 柴胡加竜骨牡蠣湯

〔成分・分量〕 柴胡 5、半夏 4、茯苓 3、桂皮 3、大棗 2.5、人参 2.5、竜骨 2.5、牡蠣 2.5、生姜 0.5-1、大黃 1、黄芩 2.5、甘草 2 以内（大黃、黄芩、甘草のない場合も可）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、精神不安があって、動悸、不眠、便秘などを伴う次の諸症：  
高血圧の随伴症状（動悸、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜泣き、便秘

6 9 柴胡枳桔湯

〔成分・分量〕 柴胡 4-5、半夏 4-5、生姜 1 (ヒネショウガを使用する場合 3)、黄芩 3、桔梗仁 3、桔梗 3、甘草 1-2、枳実 1.5-2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上のものの次の諸症：  
せき、たん

### 7 0 柴胡桂枝乾姜湯

〔成分・分量〕 柴胡 6-8、桂皮 3、桔梗根 3-4、黃芩 3、牡蛎 3、乾姜 2、甘草 2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、冷え症、貧血氣味、神經過敏で、動悸、息切れ、ときにねあせ、頭部の発汗、口の乾きがあるものの次の諸症：

更年期障害、血の道症<sup>(注)</sup>、不眠症、神經症、動悸、息切れ、かぜの後期の症状、気管支炎

《備考》 注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神經症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〔効能・効果に関連する注意〕として記載する。】

### 7 1 柴胡桂枝湯

〔成分・分量〕 柴胡 4-5、半夏 4、桂皮 1.5-2.5、芍薬 1.5-2.5、黃芩 1.5-2、人参 1.5-2、大棗 1.5-2、甘草 1-1.5、生姜 1 (ヒネショウガを使用する場合 2)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒氣・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症：  
胃腸炎、かぜの中期から後期の症状

### 7 2 柴胡清肝湯

〔成分・分量〕 湯：柴胡 2、当帰 1.5、芍薬 1.5、川芎 1.5、地黃 1.5、黃連 1.5、黃芩 1.5、黃柏 1.5、山梔子 1.5、連翹 1.5、桔梗 1.5、牛蒡子 1.5、桔梗根 1.5、薄荷葉 1.5、甘草 1.5  
散：柴胡 2、当帰 1.5-2.5、芍薬 1.5-2.5、川芎 1.5-2.5、地黃 1.5-2.5、黃連 1.5、黃芩 1.5、黃柏 1.5、山梔子 1.5、連翹 1.5-2.5、桔梗 1.5-2.5、牛蒡子 1.5-2.5、桔梗根 1.5-2.5、薄荷葉 1.5-2.5、甘草 1.5-2.5

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 2g 1日 3回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、疳の強い傾向（神經過敏）にあるものの次の諸症：  
神經症、慢性扁桃炎、湿疹・皮膚炎、虛弱児の体質改善

### 7 3 柴朴湯

〔成分・分量〕 柴胡 7、半夏 5-8、生姜 1-2 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、黃芩 3、大棗 3、人参 3、甘草 2、茯苓 4-5、厚朴 3、蘇葉 2-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、かぜをひきやすく、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴うものの次の諸症：

小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、せき、不安神經症、虛弱体質

7 4 柴苓湯

〔成分・分量〕 柴胡 4-7、半夏 4-5、生姜 1 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、  
黄芩 2.5-3、大棗 2.5-3、人参 2.5-3、甘草 2-2.5、沢瀉 4-6、  
猪苓 2.5-4.5、茯苓 2.5-4.5、白朮 2.5-4.5 (蒼朮も可)、桂皮  
2-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、のどが渴いて尿量が少なく、ときにはきけ、食欲不振、むくみなどを伴うものの次の諸症：  
水様性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、むくみ

7 5 左突膏

〔成分・分量〕 松脂 800、黃蠅 220、豚脂 58、ゴマ油 1,000

〔用法・用量〕 外用

〔効能・効果〕 化膿性のはれもの

7 6 三黃瀉心湯

〔成分・分量〕 大黃 1-5、黃芩 1-4、黃連 1-4

〔用法・用量〕 湯 (振り出しの場合 1/3 量を用いる)

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、のぼせ気味で顔面紅潮し、精神不安、みぞおちのつかえ、便秘傾向などのあるものの次の諸症：  
高血圧の随伴症状 (のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安)、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症注)

《備考》 注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
(効能・効果に関連する注意)として記載する。】

7 6 A 三黃散

〔成分・分量〕 大黃 1-2、黃芩 1、黃連 1

〔用法・用量〕 散：1回 0.8g 1日 3回

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、のぼせ気味で顔面紅潮し、精神不安、みぞおちのつかえ、便秘傾向などのあるものの次の諸症：  
高血圧の随伴症状 (のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安)、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症注)

《備考》 注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
(効能・効果に関連する注意)として記載する。】

7 7 酸棗仁湯

[成分・分量] 酸棗仁 10-18、知母 2-3、川芎 2-3、茯苓 2-5、甘草 1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるものの次の諸症：

不眠症、神経症

7 8 三物黃芩湯

[成分・分量] 黃芩 1.5-3、苦参 3、地黃 6

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱で、手足のほてりがあるものの次の諸症：

湿疹・皮膚炎、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）、不眠

7 9 滋陰降火湯

[成分・分量] 当帰 2.5、芍藥 2.5、地黃 2.5、天門冬 2.5、麥門冬 2.5、陳皮 2.5、白朮あるいは蒼朮 3、知母 1-1.5、黃柏 1-1.5、甘草 1-1.5、大棗 1、生姜 1（大棗、生姜はなくても可）

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、のどにうるおいがなく、たんが切れにくくてせきこみ、皮膚が浅黒く乾燥し、便秘傾向のあるものの次の諸症：気管支炎、せき

8 0 滋陰至宝湯

[成分・分量] 当帰 2-3、芍藥 2-3、白朮あるいは蒼朮 2-3、茯苓 2-3、陳皮 2-3、柴胡 1-3、知母 2-3、香附子 2-3、地骨皮 2-3、麥門冬 2-3、貝母 1-2、薄荷葉 1、甘草 1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱などの次の諸症：  
慢性のせき、たん、気管支炎

8 1 紫雲膏

[成分・分量] 紫根 100-120、当帰 60-100、豚脂 20-30、黃蠟 300-400、ゴマ油 1,000

[用法・用量] 外用

[効能・効果] ひび、あかぎれ、しもやけ、魚の目、あせも、ただれ、外傷、火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷、湿疹・皮膚炎

8 2 四逆散

[成分・分量] 柴胡 2-5、芍藥 2-4、枳実 2、甘草 1-2

[用法・用量] (1) 散：1回 2-2.5g 1日 3回  
(2) 湯

[効能・効果] 体力中等度以上で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに不安、不眠などがあるものの次の諸症：  
胃炎、胃痛、腹痛、神経症

### 8 2 A 解労散

〔成分・分量〕 茵薬 4-6、柴胡 4-6、土別甲 2-4、枳実 2-4、甘草 1.5-3、茯苓 2-3、生姜 1 (ヒネショウガを使用する場合 2-3)、大棗 2-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度又はやや虚弱で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに背中に痛みがあるものの次の諸症：  
慢性の発熱、腹痛、胃痛

### 8 2 B 柴胡疎肝湯

〔成分・分量〕 柴胡 4-6、芍薬 3-4、枳実 2-3、甘草 2-3、香附子 3-4、川芎 3、青皮 2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに頭痛や肩背がこわばるもの次の諸症：  
腹痛、側胸部痛、神経痛

### 8 3 四逆湯

〔成分・分量〕 甘草 2-4.8、乾姜 1.5-3.6、加工ブシ 0.3-2.4

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱あるいは体力が消耗し、手足が冷えるものの次の諸症：  
感冒、急・慢性胃腸炎、下痢、はきけ

### 8 3 A 四逆加人参湯

〔成分・分量〕 甘草 2-4.8、乾姜 1.5-3.6、加工ブシ 0.5-2.4、人参 1-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱あるいは体力が消耗し、貧血気味で手足が冷えるものの次の諸症：  
感冒、急・慢性胃腸炎、下痢、はきけ、貧血

### 8 4 四君子湯

〔成分・分量〕 人参 3-4、白朮 3-4 (蒼朮も可)、茯苓 4、甘草 1-2、生姜 0.5-1、大棗 1-2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、瘦せて顔色が悪くて、食欲がなく、疲れやすいものの次の諸症：  
胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ、嘔吐、下痢、夜尿症

### 8 5 滋血潤腸湯

〔成分・分量〕 当帰 4、地黄 4、桃仁 4、芍薬 3、枳実 2-3、蘆 2-3、大黃 1-3、紅花 1

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、皮膚にうるおいがないものの次の諸症：  
便秘、のぼせ、肩こり

8 6 紫根牡蛎湯

[成分・分量] 当帰 4-5、芍薬 3、川芎 3、大黃 0.5-2、升麻 1-2、牡蠣 3-4、黃耆 2、紫根 3-4、甘草 1-2、忍冬 1.5-2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下のもので、消耗性疾患などに伴うものの次の諸症：  
乳腺の痛み、痔の痛み、湿疹・皮膚炎、貧血、疲労倦怠

8 7 梶子豉湯

[成分・分量] 山梶子 1.4-3.2、香豉 2-9.5

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、胸がふさがり苦しく、熱感があるものの次の諸症：  
不眠、口内炎、舌炎、咽喉炎、湿疹・皮膚炎

8 8 梶子柏皮湯

[成分・分量] 山梶子 1.5-4.8、甘草 1-2、黃柏 2-4

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、冷えはなく、ときにかゆみがあるものの次の諸症：  
湿疹・皮膚炎、かゆみ、目の充血

8 9 滋腎通耳湯

[成分・分量] 当帰 2.5-3、川芎 2.5-3、芍薬 2.5-3、知母 2.5-3、地黃 2.5-3、黃柏 2.5-3、白芷 2.5-3、黃芩 2.5-3、柴胡 2.5-3、香附子 2.5-3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱なものの次の諸症：  
耳鳴り、聴力低下、めまい

9 0 滋腎明目湯

[成分・分量] 当帰 3-4、川芎 3-4、熟地黃 3-4、地黃 3-4、芍薬 3-4、桔梗 1.5-2、人参 1.5-2、山梶子 1.5-2、黃連 1.5-2、白芷 1.5-2、蔓荊子 1.5-2、菊花 1.5-2、甘草 1.5-2、細茶 1.5、燈心草 1-1.5 (燈心草のない場合も可)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱なものの次の諸症：  
目のかすみ、目の疲れ、目の痛み

### 9 1 柿蒂湯

- 〔成分・分量〕 丁子 1-1.5、柿蒂 5、ヒネショウガ 4 (生姜を使用する場合 1)  
〔用法・用量〕 湯  
〔効能・効果〕 しゃっくり  
《備考》 注) 体力に関わらず、使用できる。  
【注】 表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

### 9 2 四物湯

- 〔成分・分量〕 当帰 3-5、芍薬 3-5、川芎 3-5、地黃 3-5  
〔用法・用量〕 (1) 散 : 1回 1.5-2g 1日 3回  
                 (2) 湯  
〔効能・効果〕 体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾燥、色つやの悪い体質で胃腸障害のないものの次の諸症：  
月経不順、月經異常、更年期障害、血の道症<sup>(注)</sup>、冷え症、しもやけ、しみ、貧血、産後あるいは流産後の疲労回復  
《備考》 注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。  
【注】 表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

### 9 2 A 加味四物湯

- 〔成分・分量〕 当帰 2.5-3、川芎 2-3、芍薬 2-3、地黃 3-8、蒼朮 3 (白朮 2.5 も可)、麦門冬 2.5-5、人参 1.5-2.5、牛膝 1-2.5、黃柏 1.5-2.5、五味子 1-1.5、黃連 1.5、知母 1-1.5、杜仲 1.5-2  
〔用法・用量〕 湯  
〔効能・効果〕 体力虚弱で、血色がすぐれないものの次の諸症：  
下肢の筋力低下、神経痛、関節の腫れや痛み

### 9 2 B 芎帰膠艾湯

- 〔成分・分量〕 川芎 3、甘草 3、艾葉 3、当帰 4-4.5、芍薬 4-4.5、地黃 5-6、阿膠 3  
〔用法・用量〕 湯  
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、冷え症で、出血傾向があり胃腸障害のないものの次の諸症：  
痔出血、貧血、月經異常・月經過多・不正出血、皮下出血

### 9 2 C 七物降下湯

- 〔成分・分量〕 当帰 3-5、芍薬 3-5、川芎 3-5、地黃 3-5、釣藤鈎 3-4、黃耆 2-3、黃柏 2  
〔用法・用量〕 湯  
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、顔色が悪くて疲れやすく、胃腸障害のないものの次の諸症：  
高血圧に伴う随伴症状 (のぼせ、肩こり、耳なり、頭重)

9 2 D 当帰飲子

〔成分・分量〕当帰 5、芍薬 3、川芎 3、蒺藜子 3、防風 3、地黃 4、荊芥 1.5、黃耆 1.5、何首烏 2、甘草 1

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力中等度以下で、冷え症で、皮膚が乾燥するものの次の諸症：  
湿疹・皮膚炎（分泌物の少ないもの）、かゆみ

9 3 炙甘草湯

〔成分・分量〕炙甘草 3-4、生姜 0.8-1（ヒネショウガを使用する場合 3）、桂皮 3、麻子仁 3-4、大棗 3-7.5、人參 2-3、地黃 4-6、麥門冬 5-6、阿膠 2-3

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力中等度以下で、疲れやすく、ときに手足のほてりなどがあるものの次の諸症：  
動悸、息切れ、脈のみだれ

9 4 芍薬甘草湯

〔成分・分量〕芍薬 3-8、甘草 3-8

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：  
こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

9 4 A 芍薬甘草附子湯

〔成分・分量〕芍薬 3-10、甘草 3-8、加工ブシ 0.3-1.6

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力中等度以下で、冷えを伴うものの次の諸症：  
こむらがえり、筋肉のけいれん、胃痛、腹痛、腰痛、神經痛

9 5 鶏鴨菜湯（三味鶏鴨菜湯）

〔成分・分量〕海人草 3-5、大黃 1-1.5、甘草 1-2

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕回虫の駆除

《備考》 注）体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】

9 6 蛇床子湯

〔成分・分量〕蛇床子 10、当帰 10、威靈仙 10、苦参 10

〔用法・用量〕水 1,000mL を加えて濃縮し 700mL とし外用する。

〔効能・効果〕ただれ、かゆみ、たむし

### 97 十全大補湯

[成分・分量] 人参 2.5-3、黄耆 2.5-3、白朮 3-4 (蒼朮も可)、茯苓 3-4、当帰 3-4、芍藥 3、地黃 3-4、川芎 3、桂皮 3、甘草 1-2

[用法・用量] 湯 (原則として)

[効能・効果] 体力虚弱などの次の諸症:

病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

### 98 十味敗毒湯

[成分・分量] 柴胡 2.5-3.5、桜皮 (樸樹) 2.5-3.5、桔梗 2.5-3.5、川芎 2.5-3.5、茯苓 2.5-4、獨活 1.5-3、防風 1.5-3.5、甘草 1-2、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3)、荊芥 1-2、連翹 2-3 (連翹のない場合も可)

[用法・用量] (1) 散: 1回 1.5-2g 1日 3回  
(2) 湯

[効能・効果] 体力中等度などの皮膚疾患で、発赤があり、ときに化膿するものの次の諸症:

化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、湿疹・皮膚炎、水虫

### 99 潤腸湯

[成分・分量] 当帰 3-4、熟地黃・乾地黃 各 3-4 (又は地黃 6)、麻子仁 2、桃仁 2、杏仁 2、枳實 0.5-2、黃芩 2、厚朴 2、大黃 1-3、甘草 1-1.5

[用法・用量] (1) 散: 1回 2-3g 1日 3回  
(2) 湯: 上記量を 1 日量

[効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱で、ときに皮膚乾燥などがあるものの次の症状:

便秘

### 100 蒸眼一方

[成分・分量] 白礬 (明礬) 2、甘草 2、黃連 2、黃柏 2、紅花 2

[用法・用量] 各生薬を混合後、水 300mL を加え煎じて 200mL とする。洗眼又は温湿布する。

[効能・効果] ものもらい、ただれ目、はやり目

### 101 小建中湯

[成分・分量] 桂皮 3-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、大棗 3-4、芍藥 6、甘草 2-3、膠餡 20 (マルツエキス、滋養糖可、水餡の場合 40)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、疲労しやすく腹痛があり、血色がすぐれず、ときに動悸、手足のほてり、冷え、ねあせ、鼻血、頻尿および多尿などを伴うものの次の諸症:

小児虚弱体質、疲労倦怠、慢性胃腸炎、腹痛、神経質、小児夜尿症、夜泣き

### 101A 黃耆建中湯

〔成分・分量〕 桂皮 3-4、生姜 1-2 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、大棗 3-4、芍薬 6、甘草 2-3、黃耆 1.5-4、膠餡 20 (膠餡はなくても可)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、疲労しやすいものの次の諸症：  
虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ、湿疹・皮膚炎、皮膚のただれ、腹痛、冷え症

### 101B 歸耆建中湯

〔成分・分量〕 当帰 3-4、桂皮 3-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 2-4)、大棗 3-4、芍薬 5-6、甘草 2-3、黃耆 2-4、膠餡 20 (膠餡はなくても可)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、疲労しやすいものの次の諸症：  
虚弱体質、病後・術後の衰弱、ねあせ、湿疹・皮膚炎、化膿性皮膚疾患

### 101C 当帰建中湯

〔成分・分量〕 当帰 4、桂皮 3-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 4)、大棗 3-4、芍薬 5-7.5、甘草 2-2.5、膠餡 20 (膠餡はなくても可)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、疲労しやすく血色のすぐれないものの次の諸症：  
月経痛、月経困難症、月経不順、腹痛、下腹部痛、腰痛、痔、脱肛の痛み、病後・術後の体力低下

### 102 小柴胡湯

〔成分・分量〕 柴胡 5-8、半夏 3.5-8、生姜 1-2 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、黃芩 2.5-3、大棗 2.5-3、人参 2.5-3、甘草 1-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の諸症：  
食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状

### 102A 柴陷湯

〔成分・分量〕 柴胡 5-8、半夏 5-8、黃芩 3、大棗 3、人参 2-3、甘草 1.5-3、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、桔梗仁 3、黃連 1-1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振で口が苦く、舌に白苔がつき、強いせきが出てたんが切れにくく、ときに胸痛があるものの次の諸症：せき、胸痛、気管支炎

#### 102B 柴蘇飲

〔成分・分量〕 柴胡 5、半夏 5、黃芩 3、人参 3、大棗 3、香附子 4、蘇葉 1.5-3、甘草 1.5、陳皮 2、生姜 1

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、やや神經質で気鬱傾向を認めるものの次の諸症：  
耳鳴り、耳閉感

#### 102C 小柴胡湯加桔梗石膏

〔成分・分量〕 柴胡 7、半夏 5、生姜 1-1.5（ヒネショウガを使用する場合 4）、  
黃芩 3、大棗 3、人参 3、甘草 2、桔梗 3、石膏 10

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 比較的体力があり、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつき、のどがはれて痛むものの次の諸症：  
のどの痛み、扁桃炎、扁桃周囲炎

#### 102D 清肌安蛔湯

〔成分・分量〕 柴胡 6-7、半夏 5-6、生姜 1-1.5（ヒネショウガを使用する場合 3-4）、人参 3、黃芩 3、甘草 2、海人草 3、麦門冬 3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の症状：  
回虫の駆除

#### 103 小承氣湯

〔成分・分量〕 大黃 2-4、枳実 2-4、厚朴 2-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 比較的体力があり、腹部が張って膨満し、ときに発熱するものの次の症状：  
便秘

#### 104 小青竜湯

〔成分・分量〕 麻黄 2-3.5、芍薬 2-3.5、乾姜 2-3.5、甘草 2-3.5、桂皮 2-3.5、細辛 2-3.5、五味子 1-3、半夏 3-8

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症：  
気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症

#### 104A 小青竜湯加杏仁石膏（小青竜湯合麻杏甘石湯）

〔成分・分量〕 麻黄 2-4、芍薬 2-3、乾姜 2-3、甘草 2-3、桂皮 2-3、細辛 2-3、五味子 1.5-3、半夏 3-6、杏仁 4、石膏 5-10

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、せきが出て、のどの渴きがあるものの次の諸症：気管支ぜんそく、小児ぜんそく、せき

#### 104B 小青竜湯加石膏

〔成分・分量〕 麻黄 3、芍薬 3、乾姜 2-3、甘草 2-3、桂皮 3、細辛 2-3、五味子 2-3、半夏 6-8、石膏 2-5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出て、のどの渴きがあるものの次の諸症：気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒

#### 105 椒梅湯

〔成分・分量〕 烏梅 2、山椒 2、檳榔子 2、枳実 2、木香 2、縮砂 2、香附子 2、桂皮 2、川棟子 2、厚朴 2、甘草 2、乾姜 2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 回虫の駆除

〔備考〕 注）体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〔効能・効果に関連する注意〕として記載する。】

#### 106 小半夏加茯苓湯

〔成分・分量〕 半夏 5-8、ヒネショウガ 5-8（生姜を用いる場合 1.5-3）、茯苓 3-8

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、恶心があり、ときに嘔吐するものの次の諸症：  
つわり、嘔吐、恶心、胃炎

#### 107 消風散

〔成分・分量〕 当帰 3、知母 1-2、地黃 3、胡麻 1-1.5、石膏 3-5、蟬退 1-1.5、防風 2、苦参 1-1.5、蒼朮 2-3（白朮も可）、荊芥 1-2、木通 2-5、甘草 1-1.5、牛蒡子 2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上の人の皮膚疾患で、かゆみが強くて分泌物が多く、ときに局所の熱感があるものの次の諸症：  
湿疹・皮膚炎、じんましん、水虫、あせも

### 108 升麻葛根湯

〔成分・分量〕 葛根 5-6、升麻 1-3、生姜 0.5-1 (ヒネショウガを使用する場合 2-3)、芍薬 3、甘草 1.5-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、頭痛、発熱、悪寒などがあるものの次の諸症：  
感冒の初期、湿疹・皮膚炎

### 109 逍遙散（八味道逍遙散）

〔成分・分量〕 当帰 3-4.5、芍薬 3-4.5、柴胡 3-4.5、白朮 3-4.5 (蒼朮も可)、  
茯苓 3-4.5、甘草 1.5-3、生姜 0.5-1、薄荷葉 1-2.1

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、肩がこり、疲れやすく精神不安などの精神  
神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：  
冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道  
症<sup>注)</sup>、不眠症、神経症

《備考》 注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性  
のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精  
神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】

### 109A 加味道逍遙散

〔成分・分量〕 当帰 3、芍薬 3、白朮 3 (蒼朮も可)、茯苓 3、柴胡 3、牡丹皮 2、  
山梔子 2、甘草 1.5-2、生姜 1、薄荷葉 1

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、  
精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向の  
あるものの次の諸症：  
冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道  
症<sup>注)</sup>、不眠症

《備考》 注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性  
のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精  
神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】

### 109B 加味逍遙散加川芎地黃（加味逍遙散合四物湯）

〔成分・分量〕 当帰 3-4、芍薬 3-4、白朮 3（蒼朮も可）、茯苓 3、柴胡 3、川芎 3-4、地黃 3-4、甘草 1.5-2、牡丹皮 2、山梔子 2、生姜 1-2、薄荷葉 1

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、皮膚があれてかさかさし、ときに色つやが悪く、胃腸障害はなく、肩がこり、疲れやすく精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときにかゆみ、便秘の傾向のあるものの次の諸症：

湿疹・皮膚炎、しみ、冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症<sup>注)</sup>

《備考》

注）血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

### 110 辛夷清肺湯

〔成分・分量〕 辛夷 2-3、知母 3、百合 3、黃芩 3、山梔子 1.5-3、麥門冬 5-6、石膏 5-6、升麻 1-1.5、枇杷葉 1-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症：

鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）

### 111 秦艽羌活湯

〔成分・分量〕 秦艽 3、羌活 5、黃耆 3、防風 2、升麻 1.5、甘草 1.5、麻黃 1.5、柴胡 1.5、藁本 0.5、細辛 0.5、紅花 0.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度なものの次の症状：  
かゆみのある痔疾

### 112 秦艽防風湯

〔成分・分量〕 秦艽 2、沢瀉 2、陳皮 2、柴胡 2、防風 2、當帰 3、蒼朮 3、甘草 1、黃柏 1、升麻 1、大黃 1、桃仁 3、紅花 1

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、便秘傾向があるものの次の症状：  
痔核で排便痛のあるもの

### 113 神仙太乙膏

〔成分・分量〕 当帰 1、桂皮 1、大黄 1、芍薬 1、地黃 1、玄参 1、白芷 1、ゴマ油 30-48、黃蠅 12-48

〔用法・用量〕 外用

〔効能・効果〕 切り傷、かゆみ、虫刺され、軽いとこずれ、やけど

#### 114 参蘇飲

〔成分・分量〕 蘇葉 1-3、枳実 1-3、桔梗 2-3、陳皮 2-3、葛根 2-6、前胡 2-6、半夏 3、茯苓 3、人参 1.5-2、大棗 1.5-2、生姜 0.5-1 (ヒネショウガを使用する場合 1.5-3、生姜の替わりに乾姜も可)、木香 1-1.5、甘草 1-2 (木香はなくても可)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症：  
感冒、せき

#### 115 神秘湯

〔成分・分量〕 麻黄 3-5、杏仁 4、厚朴 3、陳皮 2-3、甘草 2、柴胡 2-4、蘇葉 1.5-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、せき、喘鳴、息苦しさがあり、たんが少ないものの次の諸症：  
小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎

#### 116 真武湯

〔成分・分量〕 茯苓 3-5、芍藥 3-3.6、白朮 2-3 (蒼朮も可)、生姜 1 (ヒネショウガを使用する場合 2-3.6)、加工ブシ 0.3-1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、冷えがあって、疲労倦怠感があり、ときに下痢、腹痛、めまいがあるものの次の諸症：  
下痢、急・慢性胃腸炎、胃腸虚弱、めまい、動悸、感冒、むくみ、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ

#### 117 参苓白朮散

〔成分・分量〕 人参 1.5-3、山藥 1.2-4、白朮 1.5-4、茯苓 1.5-4、薏苡仁 0.8-8、扁豆 1-4、蓮肉 0.8-4、桔梗 0.8-2.5、縮砂 0.8-2、甘草 0.8-2

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 1.5-2g 1日 3回

(2) 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、胃腸が弱く、痩せて顔色が悪く、食欲がなく下痢が続く傾向があるものの次の諸症：  
食欲不振、慢性下痢、病後の体力低下、疲労倦怠、消化不良、慢性胃腸炎

#### 118 清湿化痰湯

〔成分・分量〕 天南星 3、黃芩 3、生姜 1 (ヒネショウガを使用する場合 3)、半夏 3-4、茯苓 3-4、蒼朮 3-4 (白朮も可)、陳皮 2-3、羌活 1.5-3、白芷 1.5-3、白芥子 1.5-3、甘草 1-1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、背中に冷感があり痛みがあるものの次の諸症：  
神經痛、関節痛、筋肉痛

### 119 清上蠲痛湯（驅風触痛湯）

〔成分・分量〕 麦門冬 2.5-6、黃芩 3-5、羌活 2.5-3、独活 2.5-3、防風 2.5-3、蒼朮 2.5-3（白朮も可）、当帰 2.5-3、川芎 2.5-3、白芷 2.5-3、蔓荊子 1.5-2、細辛 1、甘草 1、藁本 1.5、菊花 1.5-2、生姜 0.5-1（ヒネショウガを使用する場合 1.5-2.5）（藁本、菊花、生姜はなくとも可）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、慢性化した痛みのあるものの次の諸症：  
顔面痛、頭痛

### 120 清上防風湯

〔成分・分量〕 荊芥 1-1.5、黃連 1-1.5、薄荷葉 1-1.5、枳実 1-1.5、甘草 1-1.5、山梔子 1.5-3、川芎 2-3、黃芩 2-3、連翹 2.5-3、白芷 2.5-3、桔梗 2.5-3、防風 2.5-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、赤ら顔で、ときにのぼせがあるものの次の諸症：  
にきび、顔面・頭部の湿疹・皮膚炎、あかはな（酒さ）

### 121 清暑益氣湯

〔成分・分量〕 人参 3-3.5、白朮 3-3.5（蒼朮も可）、麦門冬 3-3.5、当帰 3、黃耆 3、陳皮 2-3、五味子 1-2、黃柏 1-2、甘草 1-2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、疲れやすく、食欲不振、ときに口渴などがあるものの次の諸症：  
暑気あたり、暑さによる食欲不振・下痢、夏瘦せ、全身倦怠、慢性疾患による体力低下・食欲不振

### 122 清心蓮子飲

〔成分・分量〕 蓼肉 4-5、麦門冬 3-4、茯苓 4、人参 3-5、車前子 3、黃芩 3、黃耆 2-4、地骨皮 2-3、甘草 1.5-2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症：  
残尿感、頻尿、排尿痛、尿のにごり、排尿困難、こしけ（おりもの）

### 123 清熱補氣湯

〔成分・分量〕 人参 3、白朮 3-4、茯苓 3-4、當帰 3、芍藥 3、升麻 0.5-1、五味子 1、玄参 1-2、麦門冬 3、甘草 1

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、胃腸が弱いものの次の諸症：  
口内炎、口腔や舌の荒れ・痛み、口の乾き・乾燥

#### 124 清熱補血湯

〔成分・分量〕 当帰 3、川芎 3、芍薬 3、地黃 3、玄参 1.5、知母 1.5、五味子 1.5、黃柏 1.5、麥門冬 1.5-3、柴胡 1.5、牡丹皮 1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、胃腸障害はなく、貧血気味で皮膚が乾燥しているものの次の諸症：

口内炎、口腔や舌の荒れ・痛み、口の乾き・乾燥

#### 125 清肺湯

〔成分・分量〕 黄芩 2-2.5、桔梗 2-2.5、桑白皮 2-2.5、杏仁 2-2.5、山梔子 2-2.5、天門冬 2-2.5、貝母 2-2.5、陳皮 2-2.5、大棗 2-2.5、竹茹 2-2.5、茯苓 3、当帰 3、麦門冬 3、五味子 0.5-1、生姜 1、甘草 1

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、せきが続き、たんが多くて切れにくいものの次の諸症：

たんの多く出るせき、気管支炎

#### 126 折衝飲

〔成分・分量〕 牡丹皮 3、川芎 3、芍薬 3、桂皮 3、桃仁 4-5、當帰 4-5、延胡索 2-2.5、牛膝 2-2.5、紅花 1-1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、下腹部痛があるものの次の諸症：  
月経不順、月経痛、月経困難、神経痛、腰痛、肩こり

#### 127 洗肝明目湯

〔成分・分量〕 当帰 1.5、川芎 1.5、芍薬 1.5、地黃 1.5、黃芩 1.5、山梔子 1.5、連翹 1.5、防風 1.5、決明子 1.5、黃連 1-1.5、荊芥 1-1.5、薄荷 1-1.5、羌活 1-1.5、蔓荊子 1-1.5、菊花 1-1.5、桔梗 1-1.5、蒺藜子 1-1.5、甘草 1-1.5、石膏 1.5-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度のものの次の諸症：  
目の充血、目の痛み、目の乾燥

#### 128 川芎茶調散

〔成分・分量〕 白芷 2、羌活 2、荊芥 2、防風 2、薄荷葉 2、甘草 1.5、細茶 1.5、川芎 3、香附子 3-4

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、頭痛があるものの次の諸症：  
かぜ、血の道症<sup>(注)</sup>、頭痛

《備考》 注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

### 129 千金鷄鳴散

- 〔成分・分量〕 大黄 1-2、当帰 4-5、桃仁 4-5  
〔用法・用量〕 湯  
〔効能・効果〕 打撲のはれと痛み  
《備考》 注) 体力に関わらず、使用できる。  
〔注〕 表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
(効能・効果に関連する注意) として記載する。】

### 130 千金内托散

- 〔成分・分量〕 黄耆 2、当帰 3-4、人参 2-3、川芎 2、防風 2、桔梗 2、白芷 1-2、  
厚朴 2、甘草 1-2、桂皮 2-4 (金銀花 2 を加えても可)  
〔用法・用量〕 湯  
〔効能・効果〕 体力虚弱で、患部が化膿するものの次の諸症：  
化膿性皮膚疾患の初期、痔、軽いとこずれ

### 131 喘四君子湯

- 〔成分・分量〕 人参 2-3、白朮 2-4、茯苓 2-4、陳皮 2、厚朴 2、縮砂 1-2、紫蘇子 2、沈香 1-1.5、桑白皮 1.5-2、当帰 2-4、木香 1-1.5、甘草 1-3、生姜 1、大棗 2 (生姜、大棗なくても可)  
〔用法・用量〕 湯  
〔効能・効果〕 体力虚弱で、胃腸の弱いものの次の諸症：  
気管支ぜんそく、息切れ

### 132 錢氏白朮散

- 〔成分・分量〕 白朮 4、茯苓 4、葛根 4、人参 3、藿香 1、木香 1、甘草 1  
〔用法・用量〕 湯  
小児の消化不良の効能については小児用量に注意のこと。  
〔効能・効果〕 体力虚弱で、嘔吐や下痢があり、ときに口渴や発熱があるものの次の諸症：  
感冒時の嘔吐・下痢、小児の消化不良

### 133 続命湯

- 〔成分・分量〕 麻黄 3、桂皮 3、当帰 3、人参 3、石膏 3-6、乾姜 2-3、甘草 2-3、  
川芎 1.5-3、杏仁 2.5-4  
〔用法・用量〕 湯  
〔効能・効果〕 体力中等度以上のものの次の諸症：  
しびれ、筋力低下、高血圧に伴う症状 (めまい、耳鳴り、肩こり、頭痛、頭重、頭部圧迫感)、気管支炎、気管支ぜんそく、神経痛、関節のはれや痛み、頭痛、むくみ

### 133A 小続命湯

〔成分・分量〕 麻黄 2-4、防已 2-3、人参 1-3、黃芩 2-3、桂皮 2-4、甘草 1-4、芍藥 2-3、川芎 2-3、杏仁 3-3.5、加工ブン 0.3-1、防風 2-4、生姜 1-3（ヒネショウガを使用する場合 4-10）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下のものの次の諸症：  
しびれ、筋力低下、気管支ぜんそく、気管支炎

### 134 疎經活血湯

〔成分・分量〕 当帰 2-3.5、地黃 2-3、川芎 2-2.5、蒼朮 2-3（白朮も可）、茯苓 1-2、桃仁 2-3、芍藥 2.5-4.5、牛膝 1.5-3、威靈仙 1.5-3、防已 1.5-2.5、羌活 1.5-2.5、防風 1.5-2.5、龍胆 1.5-2.5、生姜 0.5、陳皮 1.5-3、白芷 1-2.5、甘草 1

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがあるものの次の諸症：  
関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛

### 135 蘇子降氣湯

〔成分・分量〕 紫蘇子 3-5（蘇葉可）、半夏 3-5、陳皮 2-3、前胡 2-3、桂皮 2-3、當帰 2.5-3、厚朴 2-3、大棗 1-2、生姜 0.5-1 又は乾姜 0.5-1、甘草 1-2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、足冷えや顔ののぼせがあり、息苦しさのあるものの次の諸症：  
慢性気管支炎、気管支ぜんそく

### 136 大黃甘草湯

〔成分・分量〕 大黃 4-10、甘草 1-5

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 0.75-1.5g 1日 1-2回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醸酵・痔などの症状の緩和

《備考》 注）体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

### 137 大黃附子湯

〔成分・分量〕 大黃 1-3、加工ブン 0.2-1.5、細辛 2-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、冷えて、ときに便秘するものの次の諸症：  
腹痛、神経痛、便秘

### 138 大黄牡丹皮湯

〔成分・分量〕 大黄 1-5、牡丹皮 1-4、桃仁 2-4、芒硝 3.6-4、冬瓜子 2-6

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、下腹部痛があって、便秘しがちなものの次の諸症：

月経不順、月経困難、月経痛、便秘、痔疾

### 139 大建中湯

〔成分・分量〕 山椒 1-2、人参 2-3、乾姜 3-5、膠餡 20-64

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、腹が冷えて痛むものの次の諸症：  
下腹部痛、腹部膨満感

### 139A 中建中湯

〔成分・分量〕 桂皮 4、芍薬 6、甘草 2、大棗 4、山椒 2、乾姜 1、人参 3、(膠餡 20 を加えることもある)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、腹痛を伴うものの次の諸症：  
慢性胃腸炎、下痢、便秘

### 140 大柴胡湯

〔成分・分量〕 柴胡 6-8、半夏 2.5-8、生姜 1-2 (ヒネショウガを使用する場合 4-5)、黃芩 3、芍薬 3、大棗 3-4、枳実 2-3、大黄 1-2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症：  
胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症

### 140A 大柴胡湯去大黄

〔成分・分量〕 柴胡 6-8、半夏 3-8、生姜 1-2 (ヒネショウガを使用する場合 4-5)、黃芩 3-6、芍薬 3、大棗 3、枳実 2-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しいものの次の諸症：  
胃炎、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛、神経症

### 141 大半夏湯

〔成分・分量〕 半夏 7、人参 3、ハチミツ 20

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、みぞおちがつかえた感じがあるものの次の諸症：  
嘔吐、むかつき、はきけ、悪心

#### 142 大防風湯

〔成分・分量〕 地黄 2.5-3.5、芍藥 2.5-3.5、甘草 1.2-1.5、防風 2.5-3.5、白朮 2.5-4.5（蒼朮も可）、加工ブシ 0.5-2、杜仲 2.5-3.5、羌活 1.2-1.5、川芎 2-3、当帰 2.5-3.5、牛膝 1.2-1.5、生姜 0.5-1（乾姜 1 も可、ヒネショウガを使用する場合 1.2-1.5）、黃耆 2.5-3.5、人參 1.2-1.5、大棗 1.2-2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱あるいは体力が消耗し衰え、貧血氣味などの次の諸症：

慢性関節炎、関節のはれや痛み、神經痛

#### 143 沢瀉湯

〔成分・分量〕 沢瀉 5-6、白朮 2-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 めまい、頭重

《備考》 注）体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
（効能・効果に関する注意）として記載する。】

#### 144 治頭瘡一方

〔成分・分量〕 連翹 3-4、蒼朮 3-4、川芎 3、防風 2-3、忍冬 2-3、荊芥 1-4、甘草 0.5-1.5、紅花 0.5-2、大黃 0.5-2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上のものの顔面、頭部などの皮膚疾患で、ときにかゆみ、分泌物などがあるものの次の諸症：

湿疹・皮膚炎、乳幼児の湿疹・皮膚炎

#### 144A 治頭瘡一方去大黃

〔成分・分量〕 連翹 3、蒼朮 3、川芎 3、防風 2、忍冬 2、荊芥 1、甘草 1、紅花 1

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、下痢傾向があるものの顔面、頭部などの皮膚疾患で、ときにかゆみ、分泌物などがあるものの次の諸症：

湿疹・皮膚炎、乳幼児の湿疹・皮膚炎

#### 145 治打撲一方

〔成分・分量〕 川芎 3、樸樹（又は桜皮） 3、川骨 3、桂皮 3、甘草 1.5、丁子 1-1.5、大黃 1-1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、はれ、痛みがあるものの次の諸症：  
打撲、捻挫

146 中黄膏

[成分・分量] ゴマ油 1,000mL、黃蠅 380、鬱金 40、黃柏 20

[用法・用量] 外用

[効能・効果] 急性化膿性皮膚疾患（はれもの）の初期、うち身、捻挫

147 調胃承氣湯

[成分・分量] 大黃 2-6.4、芒硝 1-6.5、甘草 1-3.2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度なものの次の諸症：

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醸酵・痔などの症状の緩和

148 丁香柿蒂湯

[成分・分量] 柿蒂 3、桂皮 3、半夏 3、陳皮 3、丁子 1、良姜 1、木香 1、沈香 1、茴香 1、藿香 1、厚朴 1、縮砂 1、甘草 1、乳香 1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下のものの次の諸症：

しゃっくり、胃腸虚弱

149 釣藤散

[成分・分量] 釣藤鈎 3、橘皮 3（陳皮も可）、半夏 3、麦門冬 3、茯苓 3、人参 2-3、防風 2-3、菊花 2-3、甘草 1、生姜 1、石膏 5-7

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、慢性に経過する頭痛、めまい、肩こりなどがあるものの次の諸症：

慢性頭痛、神経症、高血圧の傾向のあるもの

150 猪苓湯

[成分・分量] 猪苓 3-5、茯苓 3-5、滑石 3-5、沢瀉 3-5、阿膠 3-5

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渴くものの次の諸症：

排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ

150A 猪苓湯合四物湯

[成分・分量] 当帰 3、芍薬 3、川芎 3、地黃 3、猪苓 3、茯苓 3、滑石 3、沢瀉 3、阿膠 3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力に関わらず使用でき、皮膚が乾燥し、色つやが悪く、胃腸障害のない人で、排尿異常があり口が渴くものの次の諸症：

排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿

### 151 通導散

〔成分・分量〕 当帰3、大黄3、芒硝3-4、枳実（枳殼でも可）2-3、厚朴2、陳皮2、木通2、紅花2-3、蘇木2、甘草2-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、下腹部に圧痛があつて便秘しがちなものの次の諸症：

月経不順、月経痛、更年期障害、腰痛、便秘、打ち身（打撲）、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）

### 152 桃核承気湯

〔成分・分量〕 桃仁5、桂皮4、大黄3、芒硝2、甘草1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：

月経不順、月経困難症、月経痛、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）、痔疾、打撲症

### 153 当帰散

〔成分・分量〕 当帰2-3、芍薬2-3、川芎2-3、黃芩2-3、白朮1-1.5（蒼朮也可）

〔用法・用量〕 (1) 散：1回1-2g 1日3回

(2) 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下のものの次の諸症：

産前産後の障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）

### 154 当帰四逆湯

〔成分・分量〕 当帰1.8-4、桂皮1.8-4、芍薬1.8-4、木通2-3、大棗1.8-6.5、細辛1.8-3、甘草1.2-2.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、手足が冷えて下腹部が痛くなりやすいものの次の諸症：

しもやけ、下腹部痛、腰痛、下痢、月経痛、冷え症

### 154A 当帰四逆加吳茱萸生姜湯

〔成分・分量〕 当帰3-4、桂皮3-4、芍薬3-4、木通1.5-3、細辛2-3、甘草1.5-2、大棗4-6.5、吳茱萸1-6、生姜0.5-2（ヒネショウガを使用する場合4-8）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、手足の冷えを感じ、下肢の冷えが強く、下肢又は下腹部が痛くなりやすいものの次の諸症：

冷え症、しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛、下痢、月経痛

### 155 当帰芍薬散

〔成分・分量〕 当帰 3-3.9、川芎 3、芍薬 4-16、茯苓 4-5、白朮 4-5（蒼朮も可）、沢瀉 4-12

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 1-2g 1日 3回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

### 155A 当帰芍薬散加黃耆釣藤

〔成分・分量〕 当帰 3、沢瀉 4、川芎 3、芍薬 4、茯苓 4、蒼朮 4（白朮も可）、黃耆 3、釣藤鈎 4

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で血圧が高く、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：

高血圧の随伴症状（のぼせ、肩こり、耳鳴り、頭重）

### 155B 当帰芍薬散加人参

〔成分・分量〕 当帰 3.5、沢瀉 3.5、川芎 3、芍薬 4、茯苓 3.5、白朮 3（蒼朮も可）、人参 1-2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で胃腸が弱く、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

### 155C 当帰芍薬散加附子

〔成分・分量〕 当帰 3、沢瀉 4、川芎 3、加工ブシ 0.4、芍薬 4、茯苓 4、白朮 4（蒼朮も可）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、冷えが強く、貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などがあるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

156 当帰湯

[成分・分量] 当帰 5、半夏 5、芍薬 3、厚朴 3、桂皮 3、人参 3、乾姜 1.5、黃耆 1.5、山椒 1.5、甘草 1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、背中に冷感があり、腹部膨満感や腹痛・胸背部痛のあるものの次の諸症：  
胸痛、腹痛、胃炎

157 当帰貝母苦参丸料

[成分・分量] 当帰 3、貝母 3、苦参 3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下のものの次の諸症：  
小便がしづって出にくいもの、排尿困難

158 独活湯

[成分・分量] 独活 2、羌活 2、防風 2、桂皮 2、大黃 2、沢瀉 2、当帰 3、桃仁 3、連翹 3、防已 5、黃柏 5、甘草 1.5

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度なものの次の諸症：  
腰痛、手足の屈伸痛

159 二朮湯

[成分・分量] 白朮 1.5-2.5、茯苓 1.5-2.5、陳皮 1.5-2.5、天南星 1.5-2.5、  
香附子 1.5-2.5、黃芩 1.5-2.5、威靈仙 1.5-2.5、羌活 1.5-2.5、  
半夏 2-4、蒼朮 1.5-3、甘草 1-1.5、生姜 0.6-1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、肩や上腕などに痛みがあるものの次の諸症：  
四十肩、五十肩

160 二陳湯

[成分・分量] 半夏 5-7、茯苓 3.5-5、陳皮 3.5-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 2-3)、甘草 1-2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、恶心、嘔吐があるものの次の諸症：  
恶心、嘔吐、胃部不快感、慢性胃炎、二日酔

### 160A 枳縮二陳湯

〔成分・分量〕 枳実 1-3、縮砂 1-3、半夏 2-3、陳皮 2-3、香附子 2-3、木香 1-2、草豆蔻 1-2、乾姜 1-2、厚朴 1.5-2.5、茴香 1-2.5、延胡索 1.5-2.5、甘草 1、生姜 1-1.5（ヒネショウガを使用する場合 3）、茯苓 2-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、胃腸が弱いものの次の諸症：  
悪心、嘔吐、胃痛、胃部不快感、胸痛

### 161 女神散（安栄湯）

〔成分・分量〕 当帰 3-4、川芎 3、白朮 3（蒼朮も可）、香附子 3-4、桂皮 2-3、黃芩 2-4、人参 1.5-2、檳榔子 2-4、黃連 1-2、木香 1-2、丁子 0.5-1、甘草 1-1.5、大黃 0.5-1（大黃はなくても可）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、のぼせとめまいのあるものの次の諸症：  
産前産後の神経症、月経不順、血の道症<sup>注)</sup>、更年期障害、神経症

《備考》 注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〔効能・効果に関連する注意〕として記載する。】

### 162 人参湯（理中丸）

〔成分・分量〕 人参 3、甘草 3、白朮 3（蒼朮も可）、乾姜 2-3

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 2-3g 1日 3回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、疲れやすくて手足などが冷えやすいものの次の諸症：  
胃腸虚弱、下痢、嘔吐、胃痛、腹痛、急・慢性胃炎

### 162A 桂枝人参湯

〔成分・分量〕 桂皮 4、甘草 3-4、人参 3、乾姜 2-3、白朮 3（蒼朮も可）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、胃腸が弱く、ときに発熱・悪寒を伴うものの次の諸症：  
頭痛、動悸、慢性胃腸炎、胃腸虚弱、下痢、消化器症状を伴う感冒

### 162B 附子理中湯

〔成分・分量〕 人参 3、加工ブシ 0.5-1、乾姜 2-3、甘草 2-3、白朮 3（蒼朮も可）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、手足の冷えが強く、疲れやすいものの次の諸症：  
胃腸虚弱、下痢、嘔吐、胃痛、腹痛、急・慢性胃炎

### 163 人参養榮湯

〔成分・分量〕 人参 3、当帰 4、芍薬 2-4、地黃 4、白朮 4（蒼朮也可）、茯苓 4、桂皮 2-2.5、黃耆 1.5-2.5、陳皮（橘皮也可）2-2.5、遠志 1-2、五味子 1-1.5、甘草 1-1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱などの次の諸症：

病後・術後などの体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

### 164 排膿散及湯

〔成分・分量〕 桔梗 3-4、甘草 3、大棗 3-6、芍薬 3、生姜 0.5-1（ヒネショウガを使用する場合 2-3）、枳実 2-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎

〔備考〕 注）体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〔効能・効果に関連する注意〕として記載する。】

#### 164A 排膿散

〔成分・分量〕 枳実 3-10、芍薬 3-6、桔梗 1.5-2、卵黄 1 個（卵黄はない場合も可）

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 1.5-4g 1日 1-2 回

(2) 湯（卵黄ははぶくのが普通）

生薬を細末とし 1回量 2-3g に卵黄を加えて、よく攪拌し白湯にて服す。1日 1-2 回頓服として用いる。

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、患部が化膿するものの次の諸症：

化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎

〔備考〕 排膿散の湯液剤は排膿湯の処方と区別するため排膿散料と称する。

#### 164B 排膿湯

〔成分・分量〕 甘草 1.5-3、桔梗 1.5-5、生姜 0.5-1（ヒネショウガを使用する場合 1-3）、大棗 2.5-6

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、患部が化膿するものの次の諸症：

化膿性皮膚疾患・歯肉炎・扁桃炎の初期または軽いもの

### 165 麦門冬湯

〔成分・分量〕 麦門冬 8-10、半夏 5、粳米 5-10、大棗 2-3、人参 2、甘草 2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感があるものの次の諸症：

からせき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しづがれ声

### 165A 竹葉石膏湯

〔成分・分量〕 竹葉 1.2-2、石膏 4.8-16、半夏 1.6-8、麦門冬 3.4-12、人参 0.8-3、甘草 0.6-2、粳米 2-8.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、かぜが治りきらず、たんが切れにくく、ときに熱感、強いせきこみ、口が渴くものの次の諸症：  
からせき、気管支炎、気管支ぜんそく、口渴、軽い熱中症

### 166 八味地黄丸

〔成分・分量〕 地黄 5、6-8、山茱萸 3、3-4、山藥 3、3-4、沢瀉 3、3、茯苓 3、3、牡丹皮 3、3、桂皮 1、1、加工ブシ 0.5-1、0.5-1  
(左側の数字は湯、右側は散)

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 2g 1日 3回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症：  
下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善  
(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

### 166A 杞菊地黄丸

〔成分・分量〕 地黄 5-8、8、山茱萸 3-4、4、山藥 4、4、沢瀉 3、3、茯苓 3、3、牡丹皮 2-3、3、枸杞子 4-5、5、菊花 3、3  
(左側の数字は湯、右側は散)

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 2g 1日 3回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてりや口渴があるものの次の諸症：  
かすみ目、つかれ目、のぼせ、頭重、めまい、排尿困難、頻尿、むくみ、視力低下

### 166B 牛車腎氣丸

〔成分・分量〕 地黄 5-8、山茱萸 2-4、山藥 3-4、沢瀉 3、茯苓 3-4、牡丹皮 3、桂皮 1-2、加工ブシ 0.5-1、牛膝 2-3、車前子 2-3

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 2g 1日 3回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渴があるものの次の諸症：  
下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)

### 166C 知柏地黄丸

〔成分・分量〕 地黄 8、山茱萸 4、山藥 4、沢瀉 3、茯苓 3、牡丹皮 3、知母 3、黃柏 3

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 2g 1日 3回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、口渴があるものの次の諸症：  
顔や四肢のほてり、排尿困難、頻尿、むくみ

### 166D 味麦地黄丸

〔成分・分量〕 地黄 8、山茱萸 4、山藥 4、沢瀉 3、茯苓 3、牡丹皮 3、麦門冬 6、五味子 2

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 2g 1日 3回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、ときにせき、口渴があるものの次の諸症：  
下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、息切れ、からぜき

### 166E 六味丸（六味地黄丸）

〔成分・分量〕 地黄 5-6、4-8、山茱萸 3、3-4、山藥 3、3-4、沢瀉 3、3、茯苓 3、3、牡丹皮 3、3  
(左側の数字は湯、右側は散)

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 2g 1日 3回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、疲れやすくて尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてり、口渴があるものの次の諸症：  
排尿困難、残尿感、頻尿、むくみ、かゆみ、夜尿症、しびれ

### 167 八味疝氣方

〔成分・分量〕 桂皮 3-4、木通 3-4、延胡索 3-4、桃仁 3-6、烏藥 3、牽牛子 1-3、大黃 1、牡丹皮 3-4

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、冷えがあるものの次の諸症：  
下腹部の痛み、腰痛、こむら返り、月経痛

### 168 半夏厚朴湯

〔成分・分量〕 半夏 6-8、茯苓 5、厚朴 3、蘇葉 2-3、生姜 1-2 (ヒネショウガを使用する場合 2-4)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：  
不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感

### 169 半夏散及湯

- 〔成分・分量〕 半夏 3-6、桂皮 3-4、甘草 2-3  
〔用法・用量〕 湯  
〔効能・効果〕 のどの痛み、扁桃炎、のどのあれ、声がれ  
《備考》 注) 体力に関わらず、使用できる。  
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

### 170 半夏瀉心湯

- 〔成分・分量〕 半夏 4-6、黄芩 2.5-3、乾姜 2-3、人参 2.5-3、甘草 2.5-3、大棗 2.5-3、黃連 1  
〔用法・用量〕 湯  
〔効能・効果〕 体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときに恶心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症：  
急・慢性胃腸炎、下痢・軟便、消化不良、胃下垂、神經性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神經症

### 170A 甘草瀉心湯

- 〔成分・分量〕 半夏 5、黄芩 2.5、乾姜 2.5、人参 2.5、甘草 2.5-3.5、大棗 2.5、黃連 1  
〔用法・用量〕 湯  
〔効能・効果〕 体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときにイライラ感、下痢、はきけ、腹が鳴るもの次の諸症：  
胃腸炎、口内炎、口臭、不眠症、神經症、下痢

### 170B 生姜瀉心湯

- 〔成分・分量〕 半夏 5-8、人参 2.5-4、黄芩 2.5-4、甘草 2.5-4、大棗 2.5-4、黃連 1、乾姜 1-2、生姜 1-2 (ヒネショウガを使用する場合 2-4)  
〔用法・用量〕 湯  
〔効能・効果〕 体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、はきけやげっぷを伴うものの次の諸症：  
食欲不振、胸やけ、はきけ、嘔吐、下痢、胃腸炎、口臭

### 171 半夏白朮天麻湯

- 〔成分・分量〕 半夏 3、白朮 1.5-3、陳皮 3、茯苓 3、麦芽 1.5-2、天麻 2、生姜 0.5-2 (ヒネショウガを使用する場合 2-4)、神曲 1.5-2、黃耆 1.5-2、人参 1.5-2、沢瀉 1.5-2、黃柏 1、乾姜 0.5-1 (神曲のない場合も可) (蒼朮 2-3 を加えても可)  
〔用法・用量〕 湯  
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、胃腸が弱く下肢が冷えるものの次の諸症：  
頭痛、頭重、立ちくらみ、めまい、蓄膿症 (副鼻腔炎)

### 172 白朮附子湯

〔成分・分量〕白朮 2-4、加工ブシ 0.3-1、甘草 1-2、生姜 0.5-1（ヒネショウガを用いる場合 1.5-3）、大棗 2-4

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力虚弱で、手足が冷え、ときに頻尿があるものの次の諸症：筋肉痛、関節のはれや痛み、神経痛、しびれ、めまい、感冒

### 173 白虎湯

〔成分・分量〕知母 5-6、粳米 8-10、石膏 15-16、甘草 2

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力中等度以上で、熱感、口渴があるものの次の諸症：のどの渇き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ

### 173A 白虎加桂枝湯

〔成分・分量〕知母 5-6、粳米 8-10、石膏 15-16、甘草 2、桂皮 3-4

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力中等度以上で、熱感、口渴、のぼせがあるものの次の諸症：のどの渇き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ

### 173B 白虎加人参湯

〔成分・分量〕知母 5-6、石膏 15-16、甘草 2、粳米 8-20、人参 1.5-3

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力中等度以上で、熱感と口渴が強いものの次の諸症：のどの渇き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ

### 174 伏竜肝湯

〔成分・分量〕伏竜肝 4-10、ヒネショウガ 5-8（生姜を使用する場合 1.5-3）、半夏 6-8、茯苓 3-5

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕つわり、恶心、嘔吐

《備考》注）体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〔効能・効果に関連する注意〕として記載する。】

### 175 茯苓飲

〔成分・分量〕茯苓 2.4-5、白朮 2.4-4（蒼朮也可）、人参 2.4-3、生姜 1-1.5  
(ヒネショウガを使用する場合 3-4)、陳皮 2.5-3、枳実 1-2

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力中等度以下で、はきけや胸やけ、上腹部膨満感があり尿量減少するものの次の諸症：  
胃炎、神経性胃炎、胃腸虚弱、胸やけ

### 175 A 茯苓飲加半夏

〔成分・分量〕 茯苓 5、白朮 4 (蒼朮も可)、人参 3、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、陳皮 3、枳実 1.5、半夏 4

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、はきけや胸やけが強く、上腹部膨満感があり尿量減少するものの次の諸症：  
胃炎、神経性胃炎、胃腸虚弱、胸やけ

### 175 B 茯苓飲合半夏厚朴湯

〔成分・分量〕 茯苓 4-6、白朮 3-4 (蒼朮も可)、人参 3、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 4-5)、陳皮 3、枳実 1.5-2、半夏 6-10、厚朴 3、蘇葉 2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、気分がふさいで咽喉食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔氣、胸やけ、上腹部膨満感などがあり、尿量減少するものの次の諸症：  
不安神経症、神経性胃炎、つわり、胸やけ、胃炎、しわがれ声、のどのつかえ感

### 176 茯苓杏仁甘草湯

〔成分・分量〕 茯苓 3-6、杏仁 2-4、甘草 1-2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、胸につかえがあるものの次の諸症：  
息切れ、胸の痛み、気管支ぜんそく、せき、動悸

### 177 茯苓四逆湯

〔成分・分量〕 茯苓 4-4.8、甘草 2-3、乾姜 1.5-3、人参 1-3、加工ブシ 0.3-1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱あるいは体力が消耗し、手足が冷えるものの次の諸症：  
倦怠感、急・慢性胃腸炎、下痢、はきけ、尿量減少

### 178 茯苓沢瀉湯

〔成分・分量〕 茯苓 4-8、沢瀉 2.4-4、白朮 1.8-3 (蒼朮も可)、桂皮 1.2-2、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 2.4-4)、甘草 1-1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、胃のもたれ、悪心、嘔吐のいずれかがあり、渴きを覚えるものの次の諸症：  
胃炎、胃腸虚弱

### 179 附子粳米湯

〔成分・分量〕 加工ブシ 0.3-1.5、半夏 5-8、大棗 2.5-3、甘草 1-2.5、粳米 6-8

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、腹部が冷えて痛み、腹が鳴るもの次の諸症：  
胃痛、腹痛、嘔吐、急性胃腸炎

### 180 扶脾生脈散

〔成分・分量〕 人参 2、当帰 4、芍薬 3-4、紫苑 2、黃耆 2、麦門冬 6、五味子 1.5、甘草 1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、出血傾向があり、せき、息切れがあるもの次の諸症：

鼻血、歯肉からの出血、痔出血、気管支炎

### 181 分消湯（実脾飲）

〔成分・分量〕 白朮 2.5-3、蒼朮 2.5-3、茯苓 2.5-3、陳皮 2-3、厚朴 2-3、香附子 2-2.5、猪苓 2-2.5、沢瀉 2-2.5、枳実（枳殼）1-3、大腹皮 1-2.5、縮砂 1-2、木香 1、生姜 1、燈心草 1-2（但し、枳殼を用いる場合は実脾飲とする）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、尿量が少なくて、ときにみぞおちがつかえて便秘の傾向のあるものの次の諸症：

むくみ、排尿困難、腹部膨満感

### 182 平胃散

〔成分・分量〕 蒼朮 4-6（白朮も可）、厚朴 3-4.5、陳皮 3-4.5、大棗 2-3、甘草 1-1.5、生姜 0.5-1

〔用法・用量〕 原則として湯

(1) 散：1回 2g 1日 3回

(2) 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、胃がもたれて消化が悪く、ときにはきけ、食後に腹が鳴って下痢の傾向のあるものの次の諸症：

食べ過ぎによる胃のもたれ、急・慢性胃炎、消化不良、食欲不振

### 182A 加味平胃散

〔成分・分量〕 蒼朮 4-6（白朮も可）、陳皮 3-4.5、生姜 0.5-1（ヒネショウガを使用する場合 2-3）、神曲 2-3、山査子 2-3、厚朴 3-4.5、甘草 1-2、大棗 2-3、麦芽 2-3（山査子はなくても可）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、胃がもたれて食欲がなく、ときに胸やけがあるものの次の諸症：

急・慢性胃炎、食欲不振、消化不良、胃腸虚弱、腹部膨満感

### 182B 香砂平胃散

〔成分・分量〕 蒼朮 4-6 (白朮も可)、厚朴 3-4.5、陳皮 3-4.5、甘草 1-1.5、縮砂 1.5-2、香附子 2-4、生姜 0.5-1 (ヒネショウガを使用する場合 2-3)、大棗 2-3、藿香 1 (藿香はなくても可)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、食べ過ぎて胃がもたれる傾向のあるものの次の諸症：

食欲異常、食欲不振、急・慢性胃炎、消化不良

### 182C 不換金正氣散

〔成分・分量〕 蒼朮 4 (白朮も可)、厚朴 3、陳皮 3、大棗 1-3、生姜 0.5-1 (ヒネショウガを使用する場合 2-3)、半夏 6、甘草 1.5、藿香 1-1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、胃がもたれて食欲がなく、ときにはきけがあるものの次の諸症：

急・慢性胃炎、胃腸虚弱、消化不良、食欲不振、消化器症状のある感冒

### 183 防已黃耆湯

〔成分・分量〕 防已 4-5、黃耆 5、白朮 3 (蒼朮も可)、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3)、大棗 3-4、甘草 1.5-2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症：

肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）

### 184 防已茯苓湯

〔成分・分量〕 防已 2.4-3、黃耆 2.4-3、桂皮 2.4-3、茯苓 4-6、甘草 1.5-2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、手足のむくみや冷えやすい傾向のあるものの次の諸症：

手足の疼痛・しびれ感、むくみ、めまい、慢性下痢

### 185 防風通聖散

〔成分・分量〕 当帰 1.2-1.5、芍薬 1.2-1.5、川芎 1.2-1.5、山梔子 1.2-1.5、連翹 1.2-1.5、薄荷葉 1.2-1.5、生姜 0.3-0.5 (ヒネショウガを使用する場合 1.2-1.5)、荊芥 1.2-1.5、防風 1.2-1.5、麻黃 1.2-1.5、大黃 1.5、芒硝 1.5、白朮 2、桔梗 2、黃芩 2、甘草 2、石膏 2、滑石 3 (白朮のない場合も可)

〔用法・用量〕 原則として湯

(1) 散：1回 2g 1日 3回

(2) 湯

〔効能・効果〕 体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：

高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症

### 186 補氣健中湯（補氣健中湯）

〔成分・分量〕 白朮 3-5、蒼朮 2.5-3.5、茯苓 3-5、陳皮 2.5-3.5、人參 1.5-4、黃芩 2-3、厚朴 2、沢瀉 2-4、麥門冬 2-8

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症：  
腹部膨満感、むくみ

### 187 補中益氣湯

〔成分・分量〕 人參 3-4、白朮 3-4（蒼朮も可）、黃耆 3-4.5、當帰 3、陳皮 2-3、大棗 1.5-3、柴胡 1-2、甘草 1-2、生姜 0.5、升麻 0.5-2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：  
虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

### 188 補肺湯

〔成分・分量〕 麦門冬 4、五味子 3、桂皮 3、大棗 3、粳米 3、桑白皮 3、欬冬花 2、生姜 0.5-1（ヒネショウガを使用する場合 2-3）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下のものの次の諸症：  
せき、しづがれ声

### 189 補陽還五湯

〔成分・分量〕 黃耆 5、當帰 3、芍藥 3、地竜 2、川芎 2、桃仁 2、紅花 2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱なものの次の諸症：  
しびれ、筋力低下、頻尿、軽い尿漏れ

### 190 奔豚湯（金匱要略）

〔成分・分量〕 甘草 2、川芎 2、當帰 2、半夏 4、黃芩 2、葛根 5、芍藥 2、生姜 1-1.5（ヒネショウガを使用する場合 4）、李根白皮 5-8（桑白皮でも可）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、下腹部から動悸が胸やのどに突き上げる感じがするものの次の諸症：  
発作性の動悸、不安神経症

### 191 奔豚湯（肘後方）

〔成分・分量〕 甘草 2、人參 2、桂皮 4、吳茱萸 2、生姜 1、半夏 4

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、下腹部から動悸が胸やのどに突き上げる感じがするものの次の諸症：  
発作性の動悸、不安神経症

## 192 麻黄湯

〔成分・分量〕 麻黄 3-5、桂皮 2-4、杏仁 4-5、甘草 1-1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力充実して、かぜのひきはじめで、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしづしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：

感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

## 193 麻黄附子細辛湯

〔成分・分量〕 麻黄 2-4、細辛 2-3、加工ブシ 0.3-1

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、手足に冷えがあり、ときに悪寒があるものの次の諸症：

感冒、アレルギー性鼻炎、気管支炎、気管支ぜんそく、神経痛

## 194 麻杏甘石湯

〔成分・分量〕 麻黄 4、杏仁 4、甘草 2、石膏 10

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、せきが出て、ときにのどが渴くものの次の諸症：

せき、小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、感冒、痔の痛み

## 194A 五虎湯

〔成分・分量〕 麻黄 4、杏仁 4、甘草 2、石膏 10、桑白皮 1-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、せきが強くできるものの次の諸症：

せき、気管支ぜんそく、気管支炎、小児ぜんそく、感冒、痔の痛み

## 195 麻杏薏甘湯

〔成分・分量〕 麻黄 4、杏仁 3、薏苡仁 10、甘草 2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度なものの次の諸症：

関節痛、神経痛、筋肉痛、いぼ、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）

## 196 麻子仁丸

〔成分・分量〕 麻子仁 4-5、芍薬 2、枳実 2、厚朴 2-2.5、大黃 3.5-4、杏仁 2-2.5  
(甘草 1.5 を加えても可)

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 2-3 g 1日 1-3回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、ときに便が硬く塊状なものの次の諸症：  
便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醸酵・痔などの症状の緩和

197 木防已湯

〔成分・分量〕 防已 2.4-6、石膏 6-12、桂皮 1.6-6、人参 2-4（竹節人参 4 でも可）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、みぞおちがつかえ、血色すぐれないものの次の諸症：

動悸、息切れ、気管支ぜんそく、むくみ

198 楊柏散

〔成分・分量〕 楊梅皮 2、黃柏 2、犬山椒 1

〔用法・用量〕 外用である。細末を混和し、うすい酢又は水で泥状として患部に塗る。

〔効能・効果〕 捻挫、打撲

199 蕙苡仁湯

〔成分・分量〕 麻黄 4、当帰 4、蒼朮 4（白朮も可）、薏苡仁 8-10、桂皮 3、芍薬 3、甘草 2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、関節や筋肉のはれや痛みがあるものの次の諸症：関節痛、筋肉痛、神經痛

200 蕙苡附子敗醬散

〔成分・分量〕 蕙苡仁 1-16、加工ブシ 0.2-2、敗醬 0.5-8

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱なものの次の諸症：

熱を伴わない下腹部の痛み、湿疹・皮膚炎、肌あれ、いば

201 抑肝散

〔成分・分量〕 当帰 3、釣藤鈎 3、川芎 3、白朮 4（蒼朮も可）、茯苓 4、柴胡 2-5、甘草 1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度をめやすとして、神經がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：

神經症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症（神經過敏）、歯ぎしり、更年期障害、血の道症<sup>(注)</sup>

《備考》 注） 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神經症状および身体症状のことである。

【注】 表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

## 201A 抑肝散加芍藥黃連

〔成分・分量〕 当帰 5.5、釣藤鈎 1.5、川芎 2.7、白朮 5.3（蒼朮も可）、茯苓 6.5、柴胡 2、甘草 0.6、芍藥 4、黃連 0.3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上をめやすとして、神經のたかぶりが強く、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：  
神經症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症（神經過敏）、歯ぎしり、更年期障害、血の道症<sup>(注)</sup>

《備考》 注） 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神經症状および身体症状のことである。

【注】 表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

## 201B 抑肝散加陳皮半夏

〔成分・分量〕 当帰 3、釣藤鈎 3、川芎 3、白朮 4（蒼朮も可）、茯苓 4、柴胡 2-5、甘草 1.5、陳皮 3、半夏 5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度をめやすとして、やや消化器が弱く、神經がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：  
神經症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症（神經過敏）、更年期障害、血の道症<sup>(注)</sup>、歯ぎしり

《備考》 注） 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神經症状および身体症状のことである。

【注】 表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

## 202 六君子湯

〔成分・分量〕 人参 2-4、白朮 3-4（蒼朮も可）、茯苓 3-4、半夏 3-4、陳皮 2-4、大棗 2、甘草 1-1.5、生姜 0.5-1（ヒネショウガを使用する場合 1-2）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：  
胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

## 202A 化食養脾湯

〔成分・分量〕 人参 4、白朮 4、茯苓 4、半夏 4、陳皮 2、大棗 2、神麴 2、麦芽 2、山楂子 2、縮砂 1.5、生姜 1、甘草 1

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすいものの次の諸症：  
胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

## 202B 香砂六君子湯

〔成分・分量〕 人参 3-4、白朮 3-4（蒼朮も可）、茯苓 3-4、半夏 3-6、陳皮 2-3、香附子 2-3、大棗 1.5-2、生姜 0.5-1（ヒネショウガを使用する場合 1-2）、甘草 1-1.5、縮砂 1-2、藿香 1-2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、気分が沈みがちで頭が重く、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえて疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：

胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

## 202C 柴芍六君子湯

〔成分・分量〕 人参 3-4、白朮 3-4（蒼朮も可）、茯苓 3-4、半夏 4、陳皮 2-3、大棗 2、甘草 1-2、生姜 0.5-1（ヒネショウガを使用する場合 1-2）、柴胡 3-4、芍藥 3-4

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、神経質であり、胃腸が弱くみぞおちがつかえ、食欲不振、腹痛、貧血、冷え症の傾向のあるものの次の諸症：

胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐、神経性胃炎

## 202D 八解散

〔成分・分量〕 半夏 3、茯苓 3、陳皮 3、大棗 2、甘草 2、厚朴 6、人参 3、藿香 3、白朮 3、生姜 1（ヒネショウガを使用する場合 2）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症：

発熱、下痢、嘔吐、食欲不振のいずれかを伴う感冒

## 203 立効散

〔成分・分量〕 細辛 1.5-2、升麻 1.5-2、防風 2-3、甘草 1.5-2、竜胆 1-1.5

〔用法・用量〕 湯（口に含んでゆっくり飲む）

〔効能・効果〕 齒痛、抜歯後の疼痛

《備考》 注）体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】

## 204 竜胆瀉肝湯

〔成分・分量〕 当帰 5、地黄 5、木通 5、黃芩 3、沢瀉 3、車前子 3、竜胆 1-1.5、山梔子 1-1.5、甘草 1-1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるものの次の諸症：  
排尿痛、残尿感、尿のにごり、こしけ（おりもの）、頻尿

205 荸甘姜味辛夏仁湯

[成分・分量] 茯苓 1.6-4、甘草 1.2-3、半夏 2.4-5、乾姜 1.2-3 (生姜 2 でも可)、杏仁 2.4-4、五味子 1.5-3、細辛 1.2-3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱で、胃腸が弱り、冷え症で薄い水様のたんが多いものの次の諸症：  
気管支炎、気管支ぜんそく、動悸、息切れ、むくみ

206 荸姜朮甘湯

[成分・分量] 茯苓 4-6、乾姜 3-4、白朮 2-3 (蒼朮も可)、甘草 2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、腰から下肢に冷えと痛みがあって、尿量が多いものの次の諸症：  
腰痛、腰の冷え、夜尿症、神経痛

207 荸桂甘棗湯

[成分・分量] 茯苓 4-8、桂皮 4、大棗 4、甘草 2-3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、のぼせや動悸があり神経がたかぶるもの次の諸症：  
動悸、精神不安

208 荸桂朮甘湯

[成分・分量] 茯苓 4-6、白朮 2-4 (蒼朮も可)、桂皮 3-4、甘草 2-3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症：  
立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏

208A 定悸飲

[成分・分量] 李根皮 2、甘草 1.5-2、茯苓 4-6、牡蛎 3、桂皮 3、白朮 2-3 (蒼朮も可)、吳茱萸 1.5-2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、ときにめまい、ふらつき、のぼせがあるものの次の諸症：  
動悸、不安神経症

208B 明朗飲

[成分・分量] 茯苓 4-6、細辛 1.5-2、桂皮 3-4、黃連 1.5-2、白朮 2-4、甘草 2、車前子 2-3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、ときにめまい、ふらつき、動悸があるものの次の諸症：  
急・慢性結膜炎、目の充血、流涙 (なみだ目)

208C 連珠飲

〔成分・分量〕 当帰 3-4、白朮 2-4（蒼朮も可）、川芎 3-4、甘草 2-3、芍藥 3-4、地黃 3-4、茯苓 4-6、桂皮 3-4

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度又はやや虚弱で、ときにのぼせ、ふらつきがあるものの次の諸症：

更年期障害、立ちくらみ、めまい、動悸、息切れ、貧血

209 苓桂味甘湯

〔成分・分量〕 茯苓 4-6、甘草 2-3、桂皮 4、五味子 2.5-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、手足が冷えて顔が赤くなるものの次の諸症：のぼせ、動悸、からぜき、のどのふさがり感、耳のふさがり感

210 麗沢通氣湯

〔成分・分量〕 黃耆 4、山椒 1、蒼朮 3、麻黃 1、羌活 3、白芷 4、獨活 3、生姜 1、防風 3、大棗 1、升麻 1、葱白 3、葛根 3、甘草 1（葱白はなくとも可）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度のものの次の諸症：  
嗅覚異常、嗅覚障害

210A 麗沢通氣湯加辛夷

〔成分・分量〕 黃耆 4、山椒 1、蒼朮 3、麻黃 1、羌活 3、白芷 4、獨活 3、生姜 1、防風 3、大棗 1、升麻 1、葱白 3、葛根 3、甘草 1、辛夷 3（葱白はなくとも可）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度のものの次の諸症：  
嗅覚異常、嗅覚障害、鼻づまり、アレルギー性鼻炎、慢性鼻炎、  
蓄膿症（副鼻腔炎）