


第14章 循環器病対策【問46～問48】

1 脳卒中の主な初期症状の認知度【問46】

【全体の状況】

脳卒中の主な初期症状について、知っているものを複数回答で尋ねたところ、「ろれつが回らない」が87.1%で最も多く、次いで「左右いずれかの腕に力が入らない」が51.8%であった。(図表14-1-1)

図表14-1-1 脳卒中の主な初期症状の認知度（複数回答）



図表14-1-2 脳卒中の主な初期症状の認知度（複数回答）—地域別、性・年代別

(%)

	n	ろれつが回らない	左右いずれかの腕に力が入らない	顔の片側がゆがむ	どれも知らなかった	無回答
全 体	1,285	87.1	51.8	46.8	8.7	1.9
【地 域 別】						
横 浜	503	86.9	55.3	48.5	9.9	1.8
川 崎	163	93.3	49.1	49.7	6.1	-
相 模 原	81	84.0	46.9	45.7	11.1	1.2
横 須 賀 三 浦	93	82.8	52.7	40.9	14.0	-
県 央	130	83.8	52.3	53.8	9.2	4.6
湘 南	182	86.8	48.4	40.7	7.7	2.2
県 西	50	88.0	36.0	44.0	4.0	2.0
【性・年代別】						
男 性	555	86.5	46.1	42.9	10.5	1.6
女 性	638	87.5	56.4	50.5	8.0	1.7
男性18~29歳	25	64.0	32.0	44.0	36.0	-
30 歳 代	51	80.4	31.4	31.4	17.6	-
40 歳 代	101	90.1	43.6	40.6	8.9	-
50 歳 代	134	86.6	40.3	39.6	7.5	3.7
60 歳 代	120	93.3	54.2	45.0	5.8	-
70~74歳	67	89.6	59.7	58.2	6.0	3.0
75歳以上	56	78.6	51.8	42.9	16.1	3.6
女性18~29歳	33	66.7	39.4	24.2	24.2	-
30 歳 代	81	77.8	40.7	37.0	21.0	-
40 歳 代	134	91.0	58.2	50.0	5.2	2.2
50 歳 代	122	91.0	57.4	47.5	4.1	0.8
60 歳 代	131	93.9	71.0	62.6	2.3	0.8
70~74歳	52	90.4	65.4	59.6	9.6	-
75歳以上	83	81.9	45.8	53.0	7.2	7.2


2 脳卒中への適切な対応の認知度【問47】

【全体の状況】


脳卒中は、発症後すぐに救急車を呼ぶなど、医療機関で適切な治療を行えば、後遺症を含めたその後の状態が改善される可能性が高まることを知っているか尋ねたところ、「知っている」が86.3%であった。

一方、「知らなかった」が11.5%であった。(図表14-2-1)

図表14-2-1 脳卒中への適切な対応の認知度



図表14-2-2 脳卒中への適切な対応の認知度
—地域別、性・年代別




3 心臓病の再発防止対策の認知度【問48】

【全体の状況】

心臓病の再発を防ぐためには、治療後の適度な運動療法を中心としたリハビリテーションが重要であるか知っているか尋ねたところ、「知っている」が46.5%であった。

一方、「知らなかった」が51.2%であった。(図表14-3-1)

図表14-3-1 心臓病の再発防止対策の認知度



図表14-3-2 心臓病の再発防止対策の認知度—地域別、性・年代別

