

平成 23 年 11 月 29 日

各保健福祉事務所長 様

薬務課長

抗インフルエンザウイルス薬の使用上の注意に関する注意喚起の  
徹底について（通知）

このことについて、平成 23 年 11 月 22 日付け薬食安発 1122 第 7 号で厚生労働省医薬食品局安全対策課長から、別添のとおり通知がありましたので、御了知ください。

なお、関係団体には、別途通知済です。

また、別添の通知は神奈川県ホームページ「かながわの薬事情報」に掲載しております。

<http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4551/>

（要旨）

抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現について、平成 23 年 11 月 2 日の薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会でこれまでと同様の注意喚起を継続して徹底することとされたため、厚生労働省ホームページで一般の方向けの「インフルエンザ Q & A」で注意喚起を行うとともに、関係製造販売業者に対し注意喚起を継続して徹底するよう指示がなされた。

※通知済み関係団体

社団法人神奈川県医師会  
社団法人神奈川県病院協会  
社団法人神奈川県精神科病院協会  
社団法人神奈川県薬剤師会  
社団法人神奈川県病院薬剤師会  
神奈川県医薬品卸業協会理事  
神奈川県製薬協会

問い合わせ先

薬事指導グループ 久保田

電話 045-210-1111 内線 4968

045-210-4967（直）







薬食安発1122第7号  
平成23年11月22日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長



抗インフルエンザウイルス薬の使用上の  
注意に関する注意喚起の徹底について

抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現につきまして、平成23年11月2日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

(<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000008fcs.html#shingi27>)  
において、新たに得られた情報も踏まえ評価され、これまでと同様の注意喚起を引き続き徹底することが適当とされました。

このため、厚生労働省ホームページの「2011-2012 今冬のインフルエンザ総合対策」専用サイトの一般の方向けの「インフルエンザQ&A」で異常行動について別紙の内容の注意喚起を実施するとともに、関係製造販売業者あて、これまでと同様の注意喚起を引き続き徹底するよう指示しましたのでお知らせします。

なお、貴職におかれても、これらのQ&Aを活用し、インフルエンザ罹患時の対応についての注意喚起に御協力いただけますよう、お願いします。



(別紙)

Q. 10: インフルエンザにかかったらどうすればよいのですか？

具合が悪ければ早めに医療機関を受診しましょう。  
安静にして、休養をとりましょう。特に、睡眠を十分にとることが大切です。  
水分を十分に補給しましょう。お茶やスープなど飲みたいもので結構です。  
咳・くしゃみなどの症状のある時は、周りの方へうつさないために、不織布製マスクを着用しましょう。  
人混みや繁華街への外出を控え、無理をして学校や職場などに行かないようにしましょう。

また、小児、未成年者では、インフルエンザの罹患により、急に走り出す、部屋から飛び出そうとする、ウロウロと徘徊する等の異常行動を起こすおそれがあるので、自宅において療養を行う場合、少なくとも2日間、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮しましょう (Q. 14 を参照して下さい)。

Q. 13: タミフル服用後に、異常行動による転落死が起きているなどの報道がなされていましたが、現在どのような対応が行われているのですか？

タミフル服用後に患者が転落死した事例等が報告されたことを受けて、平成19年3月には、予防的な安全対策として、添付文書(薬に添付されている説明文書)を改訂し、下記の注意を添付文書の警告欄に記載し、「緊急安全性情報」を医療機関に配布しました。

(1) 10歳以上の未成年の患者においては、因果関係は不明であるものの、本剤の服用後に異常行動を発現し、転落等の事故に至った例が報告されている。このため、この年代の患者には、合併症、既往歴等からハイリスク患者と判断される場合を除いては、原則として本剤の使用を差し控えること。

(2) 小児・未成年者については、万が一の事故を防止するための予防的な対応として、本剤による治療が開始された後は、(1) 異常行動の発現のおそれがあること、(2) 自宅において療養を行う場合、少なくとも2日間、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮することについて患者・家族に対し説明を行うこと。

その後、タミフルの服用と転落・飛び降り、またはこれらにつながるような異常な行動や突然死などの関係について、平成19年4月以降、薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において調査・審議が行われ、副作用等報告、非臨床試験(動物実験等)、臨床試験、疫学調査等の結果を検討してきましたが、平成21年6月の同調査会において、

- ・タミフルと異常な行動の因果関係について、疫学調査の解析結果のみから明確な結論を出すことは困難であると判断された。
- ・タミフル服用の有無にかかわらず、異常行動はインフルエンザ自体に伴って発現する場合があることが明確となった。
- ・平成19年3月の予防的な安全対策以降、タミフルの副作用報告において、10代の転落・飛び降りによる死亡等の重篤な事例が報告されていない。

ことから、予防的措置としての上記の対策(枠囲み)について、引き続き、医療関係者、患者、家族等に注意喚起を図ることとされました。調査会の資料は、厚生労働省のホームページの下記アドレスに掲載しています。<http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/06/s0616-5.html>

その後、平成22年8月21日及び平成23年11月2日に行われた安全対策調査会において、その後に得られた副作用情報等の評価を行いました。タミフルと異常行動との因果関係を示す結果は得られていないとして、引き続き、これらの対策を行うことが妥当とされております。

Q.14: タミフル以外の抗インフルエンザウイルス薬を使用した場合にも異常行動（急に走り出す、ウロウロする等）は起こるのでしょうか？ 医薬品を服用しない場合には起こらないのでしょうか？

抗インフルエンザウイルス薬として、タミフルの他にリレンザ、ラビアクタ、イナビル、シンメトレル等の医薬品がありますが、これらの医薬品の服用後にも、急に走り出すなどの異常行動の発生が認められています。

また、インフルエンザ罹患時には、解熱剤のアセトアミノフェンを服用した場合や医薬品を服用しない場合でも、同様の異常行動が現れることが報告されていますので、インフルエンザに罹患して、自宅において療養を行う場合には、突然走り出して2階から転落するなど、危険なことにならないよう医薬品の服用の有無にかかわらず、少なくとも2日間、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮しましょう。

インフルエンザ罹患に伴う異常行動の研究については、厚生労働省ホームページの下記アドレスに掲載されています。

<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000n6tv-att/2r985200000n7ms.pdf>

（異常な行動の例）

突然立ち上がって部屋から出ようとする。

興奮状態となり、手を広げて部屋を駆け回り、意味のわからないことを言う。

興奮して窓を開けてベランダに出ようとする。

自宅から出て外を歩いていて、話しかけても反応しない。

人に襲われる感覚を覚え、外に飛び出す。

変なことを言い出し、泣きながら部屋の中を動き回る。

突然笑い出し、階段を駆け上がろうとする。

