

Part II STIあれこれ

どこに、どんな症状がでるの？

口、性器、肛門から病気が入るよ。
どこを使ってセックスした？


性器は、清潔&症状チェック
を忘れずに！




性器の中で・・・

「それってどこ？」っていう人、このページを見てね。

女性の性器



男性の性器



性器クラミジア感染症

1回のセックスでも
3人に2人は感染するって。

原因 → クラミジア・トラコマーティス

潜伏期間 → 1～3週間

症状は？ →



男性

尿道・子宮頸管^{けいかん}

だけでなく

のども感染するよ。

尿をする時、熱っぽい感じ
尿をする時、ヒリヒリ・違和感の痛み
尿道から、水のようなミルクのような分泌液
だんだん濃くなっていく（少量から中等量）
半分は症状が出ない

菌が奥に入ると 陰のう（ 1 ）が腫れ、痛む

1 中に精巣、精巣上体がある

女性

症状がなくても
感染させるよ。

おりものが増える
月経以外の出血、下腹部の痛みが現れることも
5～8割は症状が出ない

菌が奥に入ると 骨盤の中に炎症がおきて、
下腹部の強い痛み

ふくこうない
卵管や腹腔内に侵入して
不妊症の原因にもなるよ。

検査は → 尿道や子宮頸管^{けいかん}（ 2 ）やのどを綿棒でこすったものや
尿を検査する 2 子宮の入口。膣の奥

治療は → 飲み薬



感染者数、急上昇中!!!

10代後半～20代前半の若者に多い。

10人～15人に1人は感染している。

性器ヘルペス

大人になるまでに5～8割の人が感染！
セックスじゃなくても、だ液で感染もあり。
チュ～で子どもの頃にもらっちゃうんだね。

原因

単純ヘルペスウイルス 型・型

セックスだけでなく接触だけでも感染

潜伏期間

2～10日

7～8割の人は、症状なくてウイルスは
出ている。知らずに感染させてしまう。

症状は？

初めて感染したとき

すぐには症状が出ないこともある。
その場合わりと軽めかな。

陰けい(1)や陰部の粘膜や皮ふ、肛門の周り、
唇など、感染した場所に、1～2mmの水ぶくれができ、数日後に
やぶれ、ただれができる 1ペニス
痛みが強くて、歩くのが大変なことも
発熱があることも

再発のとき

症状は消えても、ウイルスは神経の中で
生きている。

初めの時と同じ場所、おしり、太ももに水ぶくれやただれができる
1週間くらいでよくなる

セックス、月経、心理的落ち込み
疲れ等ストレスで再発。

検査は

水ぶくれやただれの液や中身を検査、血液検査

治療は

初めて感染したとき 飲み薬を5～10日飲む

再発で症状が軽いとき 塗り薬だけのことも

症状の出る場所、
症状なしでも感染、再発・・・と、
コンドームだけで完全予防は
無理！



再発したら **すぐ治療**
何度も再発する人は
精神的**苦痛大**

悩んでる人は一杯いるよ！ こ～んなサイトもあるよ

『Herpes.jp ヘルペス情報サイト』グラクサ・スミ・クライン(株)

<http://herpes.jp/index.html>

りんきんかんせんしょう 淋菌感染症

「りん病」のこと。
男性のSTI第2位だよ！



- 原因 → 淋菌が性行為で感染する
- 潜伏期間 → 2～7日間
- 症状は？ → 感染すると、

1回のセックスでも
3人に1人は感染するって。

- 男性
- 尿道にかゆみ、熱っぽさ
 - 尿をするとき、強い痛み
 - 尿道から、黄色っぽい多量のうみ
- 菌が奥に入ると

精子が外に出られなくなって
『不妊症』になることも。

陰のう(1)がこぶし大に腫れ、痛み、発熱

1 中に精巢、精巣上体がある

- 女性
- 感染しても、症状がないことも多い
 - 尿をするとき、軽い痛み
 - 尿の回数が増える
 - 悪臭のある緑白色や黄色のおりもの
- 菌が奥に入ると

症状がなくても感染
させるよ。

骨盤の中に炎症がおきて、下腹部の痛みや発熱

オーラルセックス² 症状がほとんどない

2 口と性器のセックス。俗称フェラチオ

性器の患者の
3割がのどにも感染。
のども要検査！

検査は → 尿道や子宮頸管(3)や直腸やのどを綿棒でこすったものや
尿から、淋菌を発見 3 子宮の入口、膣の奥

治療は → 注射、飲み薬

薬の効かない菌も多い！
治療後も必ず再検査！
2～3割はクラミジアも感染。
一緒に検査をやっておこう。



尖圭コンジローマ

放っておくと、増えて
カリフラワーみたいになっちゃうよ。

原因 → ヒトパピローマウイルス (HPV)

潜伏期間 → 3 週 ~ 8 ヶ月 (平均 2.8 ヶ月)

症状は? → 陰けい(亀頭部を含む) (1)・陰のう(2)、陰部・
膣等や肛門、尿道近くの皮ふに淡紅色や褐色の
『鶏のとさか』みたいな『イボ』が沢山できる

自覚症状はあまりないよ。(進行してもあまり出ない)

進行して炎症を起こすと、かゆみや痛みがあることも

- 1 ペニス
- 2 中に精巣、精巣上体がある

検査は → 診察で

治療は → 電気で焼く、液体窒素での凍結、
レーザーで焼く、メスで切除
ぬり薬
数週間の間隔で、繰り返し受診&治療のこと！

治療後3ヶ月以内の再発率は、
な~んと！4分の1

このウイルスの種類によっては、長いこと感染し続けると、

子宮頸がんになっちゃうこともある。



広い範囲に病気が出ると
コンドームのみの完全予防は
無理！

えいちあいびい / エ イ ス
HIV/AIDS

原因 → エイチアイブイ ヒ ト 免 疫 不 全 ウィルス
H I V (Human Immunodeficiency Virus)

感染ルートは…


性行為
(感染者の血液・精液・膣分泌液から性行為相手の性器や肛門、口等の粘膜や傷口を通ってうつる。)

血液感染
(感染者の血液・麻薬などの”回しうち”での注射器具の共用からうつる。)


母子感染
(母親が感染者の場合、妊娠中や出産時、母乳などでうつることがある。)

蚊・風呂・プール・便座・手すり・食べ物・飲み物・食器などの共用ではうつらないよ!

母子感染率は昔は30%今はほぼ0%にできる!
早期に予防治療薬の使用、帝王切開などの適切な治療が必要!



症状は? →



検査は

心配があれば**まず血液検査・相談**を...

感染の可能性があるから
3ヶ月以降に再検査を

検査できる場所はいろいろ
保健所等：無料・匿名
詳しくはP14～16
医療機関：1万円くらい

治療は

定期的に受診

HIVの量や免疫力を血液検査でチェック
AIDSを発症する前から薬を飲み始める

薬で、HIVが増えるのを抑える。
体からHIVを完全になくす薬はまだない。
でも、治療がと～っても良くなった。



どんな毎日？どんな気持ち？
それは・・・
P19～を読んでね。

うつす心配だけでなく
「もらわない」ことも
すご～く大事！！
コンドームを使いこなそう。

もしもあなたが感染したら

心が許せる人にだけ話そう。

新たなSTIの感染、HIVの感染を予防！

病院は、早めにかかっておこう。その後の病状のために。

誰かと話したい！相談したい！情報ほしい！ってときは・・・

* 県健康危機管理課のHIVカウンセラー

TEL 045-210-4793

* もちろん保健所・保健福祉事務所もOK TELはP16

* HIV支援団体もいっぱいある

API-NET「エイズ予防情報ネット」<http://api-net.jfap.or.jp/>

「NGO情報」をクリックすると地域ごとに一覧が出る。

Hの病気（性の健康医学財団）<http://plaza.umin.ac.jp/std-com/>

医療費、生活費に困ったときは **使える制度がいくつかあるよ**