

# 病害虫情報(第8号)11月予報

平成29年10月31日  
神奈川県農業技術センター

病害虫防除部 TEL 0463 - 58 - 0333  
インターネット <http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f450002/>

## 【内容】

- I 11月の主な病害虫の発生予想、防除要否、使用する薬剤例 ..... 1  
【水稲、カンキツ、抑制トマト、促成トマト、抑制キュウリ、促成イチゴ、ネギ、キャベツ、ダイコン】
- II 11月の気象予報と病害虫発生予報の根拠 ..... 8

- 農薬使用の際は、必ずラベルの記載事項を確認し、使用基準を遵守するとともに飛散防止に努めましょう。
- 掲載農薬は一般的な場合を想定し、防除効果を優先して選定しています。

※ 農薬に関する情報は、平成29年10月25日までの農薬登録情報に基づいて記載しています。

## I 11月の主な病害虫の発生予想、防除要否、使用する薬剤例

### 【水稲】

| 病害虫名                        | 発生予想<br>(平年比) | 防除要否 | 使用する薬剤例<br>◆防除のポイント  |
|-----------------------------|---------------|------|--|
| 縞葉枯病<br>(ひこばえ、水田内雑草、水田周辺雑草) | —             | —    | ◆ 媒介虫であるヒメトビウンカの越冬場所を減らす目的で次の対策を実施する。<br>①「ひこばえ」や水田内雑草をすき込む。<br>②冬期～春期の畦畔や休耕田の除草を徹底する。   |
| スクミリンゴガイ越冬貝                 | —             | —    | ◆ スクミリンゴガイ越冬貝生存率を下げる目的で次の対策を実施する。<br>①秋冬期に田を複数回耕起すると殺貝効果が高い。貝を破碎し、越冬中の貝を寒気にさらす。耕うんは走行速度を遅くし、回転数を早くする。浅く細かく耕す。<br>②用排水路で越冬している貝の対策として泥上げを行う。地区全体で実施すると効果が高い。<br>③休耕田も発生源になるので、できるだけ①の対策を実施する。 |

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし  
[使用時期] 「収穫\*日前まで」を「\*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

# 病害虫情報

(平成29年・第8号・11月) …………… 神奈川県農業技術センター

## 【カンキツ】 生育: やや早(足柄地区事務所: 普通温州)

| 病害虫名                               | 発生予想<br>(平年比) | 防除要否 | 使用する薬剤例<br>◆防除のポイント   |
|------------------------------------|---------------|------|---|
| 貯蔵病害<br>青かび病<br>緑かび病<br>軸腐病<br>炭疽病 | 並             | ○    | (予・治) ベフトップジンフロアブル<br>みかん:[7日,3回] 1,500倍<br>みかんを除くかんきつ:[前日,2回] 1,500倍<br>☞ ベフトップジンは混合剤。総使用回数に注意する。<br>(予・治) トップジンM水和剤 青かび病、緑かび病、軸腐病<br>[前日,5回] 2,000~3,000倍 等<br>◆ 収穫時に傷を付けないようにし、傷果は貯蔵庫に持込まない。 |
| ミカンハダニ                             | 並             | ○    | オマイト水和剤<br>みかん:[7日,2回] 750倍<br>みかんを除くかんきつ:[14日,2回] 750倍 等<br>◆ 収穫果を長期貯蔵する場合は防除する。   |

[防除要否] ◎: 追加防除が必要 ○: 通常防除 △: 必要に応じて防除 ×: 防除の必要なし  
[使用時期] 「収穫\*日前まで」を「\*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

## 【抑制トマト】

| 病害虫名                      | 発生予想<br>(平年比) | 防除要否 | 使用する薬剤例<br>◆防除のポイント   |           |        |                           |        |                           |        |
|---------------------------|---------------|------|---|-----------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| コナジラミ類<br>タバココナジラミ        | 並             | ○    | アニキ乳剤 [前日,3回]<br>コナジラミ類、ミカンキイロアザミウマ: 1,000~2,000倍   |           |        |                           |        |                           |        |
| アザミウマ類                    | —             | ○    | アルバリン 又は スタークル顆粒水溶剤 [前日,2回]<br>コナジラミ類: 2,000~3,000倍<br>モスピラン顆粒水溶剤 [前日,3回] 2,000倍<br>サンクリスタル乳剤 [前日,-] コナジラミ類: 300倍 等<br>◆ ウィルス病の感染を防ぐためにも害虫の防除が重要。<br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>発生するウィルス病</th> <th>媒介する害虫</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TYLCV(黄化葉巻病)<br/>ToCV(黄化病)</td> <td>コナジラミ類</td> </tr> <tr> <td>TSWV(黄化えそ病)<br/>GSNV(茎えそ病)</td> <td>アザミウマ類</td> </tr> </tbody> </table><br>◆ 栽培終了時は施設内に害虫を残さず、また施設外に出さない。<br>◆ 施設内外の雑草防除を徹底する。 | 発生するウィルス病 | 媒介する害虫 | TYLCV(黄化葉巻病)<br>ToCV(黄化病) | コナジラミ類 | TSWV(黄化えそ病)<br>GSNV(茎えそ病) | アザミウマ類 |
| 発生するウィルス病                 | 媒介する害虫        |      |   |           |        |                           |        |                           |        |
| TYLCV(黄化葉巻病)<br>ToCV(黄化病) | コナジラミ類        |      |   |           |        |                           |        |                           |        |
| TSWV(黄化えそ病)<br>GSNV(茎えそ病) | アザミウマ類        |      |   |           |        |                           |        |                           |        |

[防除要否] ◎: 追加防除が必要 ○: 通常防除 △: 必要に応じて防除 ×: 防除の必要なし  
[使用時期] 「収穫\*日前まで」を「\*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

# 病害虫情報

(平成29年・第8号・11月) …………… 神奈川県農業技術センター

## 【促成トマト】

| 病害虫名               | 発生予想<br>(平年比) | 防除<br>要否 | 使用する薬剤例<br>◆防除のポイント   |           |        |             |        |              |        |           |  |             |        |            |  |
|--------------------|---------------|----------|---|-----------|--------|-------------|--------|--------------|--------|-----------|--|-------------|--------|------------|--|
| コナジラミ類<br>タバココナジラミ | 並             | ○        | <b>【育苗期:粒剤散布】</b><br>アルバリン 又は スタークル粒剤 [育苗期,1回:株元散布]<br>コナジラミ類、ハモグリバエ類:1~2g/株<br><b>【育苗期:散布】</b><br>ベストガード水溶剤 [前日,3回]<br>コナジラミ類、アブラムシ類、アザミウマ類:1,000~2,000倍<br>コルト顆粒水和剤 [前日,3回]<br>コナジラミ類、アブラムシ類:4,000倍<br><b>【育苗期後半~定植時:粒剤施用又は灌注】</b><br>プリロソソ粒剤 [育苗期後半~定植時,1回:株元散布] 2g/株<br>または ベリマークSC [育苗期後半~定植当日,1回:灌注]<br>原液25mlを10~20Lに希釈/400株<br><b>【定植時:粒剤施用】</b><br>モスピラン粒剤 [定植時,1回:植穴土壌混和]<br>コナジラミ類、アブラムシ類、トマトハモグリバエ:1g/株<br>ダントツ粒剤 [定植時,1回:植穴処理土壌混和]<br>コナジラミ類、アブラムシ類、マメハモグリバエ:1~2g/株<br>トマトハモグリバエ:2g/株  |           |        |             |        |              |        |           |  |             |        |            |  |
| アブラムシ類             | —             | ○        |   |           |        |             |        |              |        |           |  |             |        |            |  |
| アザミウマ類             | —             | ○        |   |           |        |             |        |              |        |           |  |             |        |            |  |
| ハモグリバエ類            | —             | ○        |   |           |        |             |        |              |        |           |  |             |        |            |  |
|                    |               |          | ◆ ウイルス病の感染を防ぐためにも害虫の防除が重要。<br><table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>発生するウイルス病</th> <th>媒介する害虫</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CMV等(モザイク病)</td> <td>アブラムシ類</td> </tr> <tr> <td>TYLCV(黄化葉巻病)</td> <td>コナジラミ類</td> </tr> <tr> <td>ToCV(黄化病)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TSWV(黄化えそ病)</td> <td>アザミウマ類</td> </tr> <tr> <td>CSNV(茎えそ病)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ◆ 育苗期のウイルス病感染防止策を徹底するとともに、育苗施設内外の除草を徹底する。<br>◆ 0.4mm目合い以下の防虫ネットを、育苗施設の開口部に展張するか、育苗ベットにトンネル掛けする。<br>◆ 害虫の発生確認や防除のため黄色粘着板や粘着テープの吊下げも効果的。 | 発生するウイルス病 | 媒介する害虫 | CMV等(モザイク病) | アブラムシ類 | TYLCV(黄化葉巻病) | コナジラミ類 | ToCV(黄化病) |  | TSWV(黄化えそ病) | アザミウマ類 | CSNV(茎えそ病) |  |
| 発生するウイルス病          | 媒介する害虫        |          |   |           |        |             |        |              |        |           |  |             |        |            |  |
| CMV等(モザイク病)        | アブラムシ類        |          |   |           |        |             |        |              |        |           |  |             |        |            |  |
| TYLCV(黄化葉巻病)       | コナジラミ類        |          |   |           |        |             |        |              |        |           |  |             |        |            |  |
| ToCV(黄化病)          |               |          |   |           |        |             |        |              |        |           |  |             |        |            |  |
| TSWV(黄化えそ病)        | アザミウマ類        |          |   |           |        |             |        |              |        |           |  |             |        |            |  |
| CSNV(茎えそ病)         |               |          |   |           |        |             |        |              |        |           |  |             |        |            |  |

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし  
 [使用時期] 「収穫\*日前まで」を「\*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

### 薬剤耐性菌の発生を防ぐために(以下の農薬は、病害虫情報に掲載(予定)されているものです。)

- ◎ QoI剤とSDHI剤は、薬剤耐性菌発生リスクが高いため、1作での使用回数を制限することが望ましい農薬です。
- ▶ QoI剤(アミスター20、ファンタジスタ)
  - 単剤あるいはSDHI剤との混用の場合:1作1回
  - SDHI剤以外の殺菌剤との混用もしくは混合剤(アミスターオプティ、ホライズン)の場合:1作2回
- ▶ SDHI剤(アフェット、カンタス)
  - 単剤あるいはQoI剤との混用の場合:1作1回
  - QoI剤以外の殺菌剤との混用の場合:1作2回

# 病害虫情報

(平成29年・第8号・11月) …………… 神奈川県農業技術センター

## 【抑制キュウリ】

| 病害虫名                      | 発生予想<br>(平年比) | 防除要否 | 使用する薬剤例<br>◆防除のポイント  |           |        |             |        |             |        |               |  |                 |        |                       |  |
|---------------------------|---------------|------|--|-----------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--|-----------------|--------|-----------------------|--|
| べと病                       | 並             | ○    | (予・治) ホライズンドライフロアブル [前日,3回] 2,500倍<br>☞ ホライズンは混合剤。総使用回数に注意する。<br>(予・治) エトフィンフロアブル [前日,4回] 1,000倍<br>(予・治) ランマンフロアブル [前日,4回] 1,000~2,000倍 等<br>◆ 草勢低下と夜間の結露等による葉の濡れが発生を助長する。  |           |        |             |        |             |        |               |  |                 |        |                       |  |
| うどんこ病                     | やや多           | ○    | (予) インプレッションクリア [発病前~発病初期,-] 1,000~2,000倍<br>(予・治) ベルクートフロアブル [前日,7回] 2,000倍<br>(予・治) ガッテン乳剤 [前日,2回] 5,000倍<br>(予・治) パンチョTF顆粒水和剤 [前日,2回] 2,000倍 等<br>☞ パンチョは混合剤。総使用回数に注意する。<br>◆ 乾燥で発生が助長されるので、日中の過乾燥に注意する。  |           |        |             |        |             |        |               |  |                 |        |                       |  |
| 褐斑病                       | 並             | ○    | (予・治) ベルクートフロアブル [前日,7回] 2,000倍<br>(予・治) スミブレンド水和剤 [前日,5回] 1,500~2,000倍<br>☞ スミブレンドは混合剤。総使用回数に注意する。 等<br>◆ 多湿状態で施設を密閉すると蔓延しやすく、夜間の結露等による葉の濡れが発生を助長する。  |           |        |             |        |             |        |               |  |                 |        |                       |  |
| コナジラミ類<br>タバココナジラミ        | 並             | ○    | アルバリン 又は スタークル顆粒水溶剤 [前日,2回]<br>コナジラミ類:2,000~3,000倍、アザミウマ類:2,000倍<br>アファームエクセラ顆粒水和剤 [前日,2回]<br>ミナミキイロアザミウマ:1,500倍<br>☞ アファームエクセラは混合剤。総使用回数に注意する。<br>コテツフロアブル [前日,3回] ミナミキイロアザミウマ:2,000倍<br>ウララDF [前日,3回] コナジラミ類:2,000倍 等<br>◆ ウイルス病の感染を防ぐためにも害虫の防除が重要。  |           |        |             |        |             |        |               |  |                 |        |                       |  |
| アザミウマ類<br>ミナミキイロ<br>アザミウマ | やや多           | ○    | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">発生するウイルス病</th> <th style="text-align: center;">媒介する害虫</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CMV等(モザイク病)</td> <td>アブラムシ類</td> </tr> <tr> <td>CCYV(退緑黄化病)</td> <td>コナジラミ類</td> </tr> <tr> <td>BPYV(キュウリ黄化病)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MYSV(キュウリ黄化えそ病)</td> <td>アザミウマ類</td> </tr> <tr> <td>WSMoV(キュウリ灰白色斑紋病(仮称))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table><br>◆ 施設内外の除草を徹底するとともに、栽培に関係のない鉢物等を施設内に持ち込まない。 | 発生するウイルス病 | 媒介する害虫 | CMV等(モザイク病) | アブラムシ類 | CCYV(退緑黄化病) | コナジラミ類 | BPYV(キュウリ黄化病) |  | MYSV(キュウリ黄化えそ病) | アザミウマ類 | WSMoV(キュウリ灰白色斑紋病(仮称)) |  |
| 発生するウイルス病                 | 媒介する害虫        |      |  |           |        |             |        |             |        |               |  |                 |        |                       |  |
| CMV等(モザイク病)               | アブラムシ類        |      |  |           |        |             |        |             |        |               |  |                 |        |                       |  |
| CCYV(退緑黄化病)               | コナジラミ類        |      |  |           |        |             |        |             |        |               |  |                 |        |                       |  |
| BPYV(キュウリ黄化病)             |               |      |  |           |        |             |        |             |        |               |  |                 |        |                       |  |
| MYSV(キュウリ黄化えそ病)           | アザミウマ類        |      |  |           |        |             |        |             |        |               |  |                 |        |                       |  |
| WSMoV(キュウリ灰白色斑紋病(仮称))     |               |      |  |           |        |             |        |             |        |               |  |                 |        |                       |  |

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし  
[使用時期] 「収穫\*日前まで」を「\*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

### 薬剤耐性菌の発生を防ぐために(以下の農薬は、病害虫情報に掲載(予定)されているものです。)

- QoI剤とSDHI剤は、薬剤耐性菌発生リスクが高いので、1作での使用回数を制限することが望ましい農薬です。
  - ▶ QoI剤(アミスター20、ファンタジスタ)
    - 単剤あるいはSDHI剤との混用の場合:1作1回
    - SDHI以外の殺菌剤との混用もしくは混合剤(アミスターオプティ、ファンベル、ホライズン)の場合:1作2回
  - ▶ SDHI剤(アフエット、カンタス)
    - 単剤あるいはQoI剤との混用の場合:1作1回
    - QoI剤以外の殺菌剤との混用の場合:1作2回
- CAA系薬剤は、薬剤耐性菌発生リスクがあるので、1作での使用回数を制限することが望ましい農薬です。
  - 単剤(フェスティバル水和剤)の場合:1作1回
  - CAA系薬剤以外の殺菌剤との混用もしくは混合剤(プロポーズ、ベトファイター)の場合:1作2回

# 病害虫情報

(平成29年・第8号・11月) …………… 神奈川県農業技術センター

## 【促成イチゴ】

| 病害虫名    | 発生予想<br>(平年比) | 防除要否 | 使用する薬剤例<br>◆防除のポイント   |
|---------|---------------|------|---|
| うどんこ病   | 並             | ○    | (予) インプレッションクリア [発病前～発病初期, -] 1,000～2,000倍<br>(予) タフパール [発病前～発病初期, -] 2,000～4,000倍<br>(予) フルピカフロアブル [前日, 3回] 2,000～3,000倍<br>(治) サンクリスタル乳剤 [前日, -] 300～600倍<br>(治) カリグリーン [前日, -] 800～1000倍<br>(予・治) ガッテン乳剤 [前日, 2回] 5,000倍 等 |
| アブラムシ類  | やや多           | ○    | ウララDF [前日, 2回] 2,000～4,000倍<br>サンクリスタル乳剤 [前日, -] 300倍 等   |
| ハスモンヨトウ | 並             | ○    | プレバゾンフロアブル5 [前日, 2回] 2,000倍<br>トルネードエースDF [前日, 2回] 2,000倍<br>カスケード乳剤 [前日, 3回] 4,000倍 等  |
| ハダニ類    | やや多           | ○    | マイトコーネフロアブル [前日, 2回] 1,000倍<br>サンクリスタル乳剤 [前日, -] 300～600倍 等   |

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし  
[使用時期] 「収穫\*日前まで」を「\*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

### ミツバチへの影響

- ▶ 農薬散布の際は、巣箱を施設から出し、巣箱を再導入する前には、換気を十分に行い、薬液が乾いていることを確認すること。

### タフパールと上記掲載剤の散布間隔(メーカー技術資料より抜粋)

- ▶ サンクリスタル、ガッテン、ウララ、トルネード(フロアブル)、カスケード、マイトコーネ:混用事例あり  
フルピカ、カリグリーン:3日以上

### 薬剤耐性菌の発生を防ぐために(以下の農薬は、病害虫情報に掲載(予定)されているものです。)

- ◎ QoI剤とSDHI剤は、薬剤耐性菌発生のリスクが高いため、1作での使用回数を制限することが望ましい農薬です。
  - ▶ QoI剤(アミスター20、ストロビー、ファンタジスタ)
    - 単剤の場合:1作1回
    - その他の殺菌剤との混用もしくは混合剤(ファンベル)の場合:1作2回
  - ▶ SDHI剤(アフェット、カンタス)
    - 単剤の場合:1作1回
    - その他の殺菌剤との混用の場合:1作2回

# 病害虫情報

(平成29年・第8号・11月) …………… 神奈川県農業技術センター

## 【ネギ】

| 病害虫名      | 発生予想<br>(平年比) | 防除要否 | 使用する薬剤例<br>◆防除のポイント   |
|-----------|---------------|------|---|
| さび病       | 並             | ○    | (予・治) アミスター20フロアブル [3日,4回] 2,000倍<br>(予・治) ラリー水和剤 [7日,3回] さび病:2,000倍                      |
| 黒斑病       | 多             | ○    |   |
| ネギアザミウマ   | 並             | ○    | アニキ乳剤 [3日,3回]<br>ネギアザミウマ:1,000倍、  |
| シロイチモジヨトウ | やや多           | ○    | シロイチモジヨトウ:1,000～2,000倍<br>ベストガード水溶剤 [前日,3回] ネギアザミウマ:1,000倍<br>ディアナSC [前日,2回] 2,500～5,000倍 |

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし  
[使用時期] 「収穫\*日前まで」を「\*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

## 【キャベツ;三浦半島地区以外】

| 病害虫名    | 発生予想<br>(平年比) | 防除要否 | 使用する薬剤例<br>◆防除のポイント   |
|---------|---------------|------|---|
| 黒腐病     | やや多           | ○    | (予) Zボルドー [-,-] 500倍<br>(予・治) カセット水和剤 [7日,3回] 1,000倍<br>☞ カセットは混合剤。総使用回数に注意する。<br>◆ Zボルドー:薬害が懸念される場合は、クレフノン(100～200倍)を加用する。結球後に使用すると薬害を生じる可能性があるの<br>で注意する。 |
| 菌核病     | —             | ○    | (予) セイビアーフロアブル20 [3日,3回] 1,000倍<br>(予・治) トップジンM水和剤 [3日,2回] 1,000～1,500倍<br>(予・治) カンタスドライフロアブル [7日,2回] 1,500倍<br>◆ 被害株は感染源になるため、速やかに除去する。                    |
| コナガ     | 多             | ○    | アニキ乳剤 [3日,3回] 1,000～2,000倍<br>アクセルフロアブル [前日,3回]   |
| ハスモンヨトウ | 並             | ○    | コナガ:1,000倍<br>ハスモンヨトウ、オオタバコガ:1,000～2,000倍   |
| オオタバコガ  | 並             | ○    |   |

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし  
[使用時期] 「収穫\*日前まで」を「\*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

# 病害虫情報

(平成29年・第8号・11月) …………… 神奈川県農業技術センター

## ▼ 三浦半島地区野菜 ▼

### 【キャベツ】

| 病害虫名    | 発生予想<br>(平年比) | 防除要否 | 使用する薬剤例<br>◆防除のポイント  |
|---------|---------------|------|--|
| 黒腐病     | 並             | ○    | (予) Zボルドー [ー,ー] 500倍<br>(予・治) カセット水和剤 [7日,3回] 1,000倍<br>☞ カセットは混合剤。総使用回数に注意する。等<br>◆ Zボルドー:薬害が懸念される場合は、クレフノン(100~200倍)を加用する。結球後に使用すると薬害を生じる可能性があるの<br>で注意する。 |
| 菌核病     | ー             | ○    | (予) セイビアーフロアブル20 [3日,3回] 1,000倍<br>(予・治) トップジンM水和剤 [3日,2回] 1,000~1,500倍 等<br>◆ 被害株は感染源になるため、速やかに除去する。  |
| コナガ     | 多             | ○    | アニキ乳剤 [3日,3回] 1,000~2,000倍<br>アクセルフロアブル [前日,3回]  |
| ハスモンヨトウ | 並             | ○    | コナガ:1,000倍<br>ハスモンヨトウ、オオタバコガ:1,000~2,000倍 等  |
| オオタバコガ  | 並             | ○    |  |

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし  
[使用時期] 「収穫\*日前まで」を「\*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

### 【ダイコン】

| 病害虫名           | 発生予想<br>(平年比) | 防除要否 | 使用する薬剤例<br>◆防除のポイント  |
|----------------|---------------|------|--|
| 黒斑細菌病          | 多             | ◎    | (予) Zボルドー [ー,ー] 500倍<br>(予) ヨネポン水和剤[7日,4回]500倍<br>(予・治) カセット水和剤 [14日,3回] 1,000倍<br>☞ カセットは混合剤。総使用回数に注意する。<br>(予・治) カッパーシン水和剤又はカスミンボルドー [14日,3回] 1,000倍<br>☞ カッパーシン、カスミンボルドーは混合剤。総使用回数に<br>注意する。 等<br>◆ 肥料切れしないよう適正な肥培管理をする。<br>◆ Zボルドー:薬害が懸念される場合は、クレフノン(100~200倍)<br>を加用する。 |
| 白さび病<br>(ワッカ症) | 並             | ○    | (予) ヨネポン水和剤[7日,4回]白さび病:500倍<br>(予・治) ランマンフロアブル [3日,3回] 2,000倍 等<br>◆ ワッカ症の防除のために11月上旬に薬剤散布を行う。   |
| ナモグリバエ         | 並             | ○    | アドマイヤーフロアブル [14日,2回] アブラムシ類:4,000倍<br>ディアナSC[前日,2回]  |
| アブラムシ類         | 並             | ○    | コナガ、ハモグリバエ類:2,500~5,000倍 等   |
| コナガ            | 多             | ○    |  |

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし  
[使用時期] 「収穫\*日前まで」を「\*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

# 病害虫情報

(平成29年・第8号・11月)

神奈川県農業技術センター

## II 11月の気象予報と病害虫発生予報の根拠

### (1) 11月の気象予報(気象庁 地球環境・海洋部10月25日発表3か月予報)

#### 〈天 気〉

平年に比べ晴れの日が多いでしょう。降水量は平年並または少ない確率ともに40%です。

#### 〈要素別予報〉

|       | 低い(少ない) | 平年並み | 高い(多い) |
|-------|---------|------|--------|
| 気 温   | 30%     | 30%  | 40%    |
| 降 水 量 | 40%     | 40%  | 20%    |
| 日照時間* | 20%     | 40%  | 40%    |

\*10月26日発表1か月予報による。

### (2) 11月の病害虫発生予報の根拠

| 作物名            | 病害虫名                               | 発生量 |     | 予報の根拠  |
|----------------|------------------------------------|-----|-----|--|
|                |                                    | 程度  | 平年比 |  |
| カンキツ           | 貯蔵病害<br>青かび病<br>緑かび病<br>炭疽病<br>軸腐病 | —   | 並   | 1) 県予察ほ(根府川)では、果実の青かび病、緑かび病等の樹上発病は平年よりやや少ない。(—)<br>2) 本年の着果量は平年並、果皮の厚さは平年並、減酸は平年よりやや遅い。(±)<br>3) 軸腐病と同じ病原菌である黒点病の発生は、巡回調査では平年よりやや少なく(—)、県予察ほ(根府川)では平年並。(±)<br>4) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(+) |
|                | ミカンハダニ                             | —   | 並   | 1) 巡回調査では、発生が平年並。(±)<br>2) 県予察ほ(根府川)の慣行防除園では、発生が平年よりやや少ない。(—)<br>3) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(±)  |
| 抑制トマト<br>促成トマト | タバココナジラミ                           | 少   | 並   | 1) 抑制トマトの巡回調査では、発生が8年平均より少ない。(—)<br>2) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(+)   |
| 抑制キュウリ         | べと病                                | 少   | 並   | 1) 巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(—)<br>2) 10月中旬の降水量は平年よりかなり多く、日照時間は平年よりかなり少なかった。(+)<br>3) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(±)   |
|                | うどんこ病                              | 中   | やや多 | 1) 巡回調査では、発生が平年並。(±)<br>2) 10月中旬の降水量は平年よりかなり多く、日照時間は平年よりかなり少なかった。(+)<br>3) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(±)   |
|                | 褐斑病                                | 少   | 並   | 1) 巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(—)<br>2) 10月中旬の降水量は平年よりかなり多く、日照時間は平年よりかなり少なかった。(+)<br>3) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(±)   |
|                | タバココナジラミ                           | 少   | 並   | 1) 巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(—)<br>2) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(+)   |
|                | ミナミキイロアザミウマ                        | 少   | やや多 | 1) 巡回調査では、発生が平年並。(±)<br>2) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(+)   |

※「発生量」……………程度:甚>多>中>少>無 平年比:多>やや多>並>やや少>少  
「予報の根拠」……………(+):多発要因 (—):少発要因



# 病害虫情報

(平成29年・第8号・11月)

…… 神奈川県農業技術センター

| 作物名                       | 病害虫名      | 発生量 |     | 予報の根拠  |
|---------------------------|-----------|-----|-----|--|
|                           |           | 程度  | 平年比 |  |
| 促成イチゴ                     | うどんこ病     | 少   | 並   | 1) 巡回調査では、発病は見られず、発生が平年よりやや少ない。(－)<br>2) 10月中旬の降水量は平年よりかなり多く、日照時間は平年よりかなり少なかった。(＋)<br>3) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(±)   |
|                           | アブラムシ類    | 少   | やや多 | 1) 巡回調査では、発生が平年並。(±)<br>2) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(＋)   |
|                           | ハダニ類      | 少   | やや多 | 1) 巡回調査では、発生が平年並。(±)<br>2) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(＋)   |
| ネギ                        | さび病       | 少   | 並   | 1) 巡回調査では、発病は見られず、発生が平年よりやや少ない。(－)<br>2) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(±)   |
|                           | 黒斑病       | 中   | 多   | 1) 巡回調査では、発生が平年より多い。(＋)<br>2) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(±)  |
|                           | ネギアザミウマ   | 中   | 並   | 1) 巡回調査では、発生が平年より少ない。(－)<br>2) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(＋)   |
|                           | シロイチモジヨトウ | －   | やや多 | 1) フェロモントラップへの誘殺数は、三浦は平年より多く(＋)、横浜は平年並(±)、伊勢原は8年平均より少ない(－)。<br>2) 県予察ほ(上吉沢)のフェロモントラップへの誘殺数は、平年並。(±)<br>3) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(＋)                                |
| キャベツ<br>(三浦半島地区を除く)       | 黒腐病       | 少   | やや多 | 1) 巡回調査では、発生が平年より多い。(＋)<br>2) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(±)  |
|                           | コナガ       | 少   | 多   | 1) 巡回調査では、発生が平年よりやや多い。(＋)<br>2) フェロモントラップへの誘殺数は、横浜は平年並(±)、伊勢原は8年平均並(±)。<br>3) 県予察ほ(上吉沢)のフェロモントラップへの誘殺数は、平年より多い。(＋)<br>4) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(＋)                 |
| 露地野菜<br>全般<br>(三浦半島地区を除く) | ハスモンヨトウ   | －   | 並   | 1) ダイコンの巡回調査では、発生が平年よりやや少ない(－)。<br>2) フェロモントラップへの誘殺数は、横浜は平年より多く(＋)、伊勢原は8年平均よりやや少ない(－)。<br>3) 県予察ほ(上吉沢)のフェロモントラップへの誘殺数は、平年より少ない。(－)<br>4) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(＋) |
|                           | オオタバコガ    | －   | 並   | 1) キャベツの巡回調査では、寄生は見られず、発生が平年よりやや少ない。(－)<br>2) フェロモントラップへの誘殺数は、横浜、伊勢原ともに平年より少ない(－)。<br>3) 県予察ほ(上吉沢)のフェロモントラップへの誘殺数は、平年並。(±)<br>4) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(＋)         |

※「発生量」……………程度:甚>多>中>少>無 平年比:多>やや多>並>やや少>少  
「予報の根拠」……………(＋):多発要因 (－):少発要因

# 病害虫情報

(平成29年・第8号・11月) …… 神奈川県農業技術センター

三浦半島地区野菜

| 作物名    | 病害虫名    | 発生量 |     | 予報の根拠  |
|--------|---------|-----|-----|--|
|        |         | 程度  | 平年比 |  |
| キャベツ   | 黒腐病     | 少   | 並   | 1) 巡回調査では、発病は見られず、発生が平年並。(±)<br>2) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(±)   |
|        | コナガ     | 少   | 多   | 1) 巡回調査では、発生が平年より多い。(+)<br>2) フェロモントラップへの誘殺数は、三浦では平年よりやや多い。(+)<br>3) 県予察ほ(三浦)のフェロモントラップへの誘殺数は、平年より少ない。(－)<br>4) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(＋)            |
| ダイコン   | 黒斑細菌病   | 少   | 多   | 1) 巡回調査では、発生が平年より多い。(+)<br>2) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(＋)  |
|        | 白さび病    | 少   | 並   | 1) 巡回調査では、発病は見られず、発生が平年並。(±)<br>2) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(±)   |
|        | ナモグリバエ  | 少   | 並   | 1) 巡回調査では、発生が平年並。(±)<br>2) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(±)   |
|        | アブラムシ類  | 少   | 並   | 1) 巡回調査では、寄生は見られず、発生が平年より少ない。(－)<br>2) 県予察ほ(三浦)の調査では、黄色水盤への飛来量は、平年よりやや多い。(+)<br>3) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(±)   |
|        | コナガ     | 少   | 多   | 1) 巡回調査では、発生が平年より多い。(+)<br>2) フェロモントラップへの誘殺数は、三浦では平年よりやや多い。(+)<br>3) 県予察ほ(三浦)のフェロモントラップへの誘殺数は、平年より少ない。(－)<br>4) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(＋)            |
| 露地野菜全般 | ハスモンヨトウ | －   | 並   | 1) キャベツの巡回調査では、寄生は見られず、発生が平年よりやや少ない。(－)<br>2) フェロモントラップへの誘殺数は、三浦では平年並。(±)<br>3) 県予察ほ(三浦)のフェロモントラップへの誘殺数は、平年より少ない。(－)<br>4) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(＋) |
|        | オオタバコガ  | －   | 並   | 1) キャベツの巡回調査では、発生が平年より多い。(+)<br>2) フェロモントラップへの誘殺数は、三浦では平年並。(±)<br>3) 県予察ほ(三浦)のフェロモントラップへの誘殺数は、平年より少ない。(－)<br>3) 気温は平年より高く、降水量は平年並か少ない予報。(＋)            |

※「発生量」…………… 程度:甚>多>中>少>無 平年比:多>やや多>並>やや少>少  
「予報の根拠」…………… (+):多発要因 (－):少発要因