

防除情報(病害虫情報 号外 第6号)

令和3年7月13日
神奈川県農業技術センター

イネツトムシ(イチモンジセセリ)の防除適期

今年の第2世代幼虫の孵化最盛日は、県平均では「平年並」(7月22日頃)予測です(表1)。ただし、地域によって予測日が異なりますので、近くの観測地点の予測日を参考にしてください。なお、今後の気象変動によって予測日は変わる可能性があります。

[防除]

防除適期は、粒剤では孵化最盛日の5日前、その他の薬剤では孵化最盛日から5日後程度です。

各地点における孵化最盛日の予測は、表1のとおりです。薬剤の剤型にあわせて適期に防除を行ってください。

常発地では特に注意し、防除を行うようにしてください。

[防除薬剤]

薬剤名	倍率又は散布量(10a)	使用時期及び回数
パダン粒剤4	3~4kg	30日、6回
パダンSG水溶剤	1,500倍	21日、6回
スミチオン乳剤	1,000倍	21日、2回

* 上記薬剤を飼料用米栽培に使用する場合は、次の対策に留意すること。

(1)飼料用米について、出穂以降(ほ場において出穂した個体が初めて確認される時点以降をいう。以下同じ。)に農薬の散布を行う場合には、家畜へは糞糺りをして玄米で給餌すること。

(2)籾米のまま、もしくは籾殻を含めて家畜に給餌する場合は、出穂以降の農薬の散布は控えること。

表1 有効積算温度によるイチモンジセセリ第2世代予測孵化最盛日(2021年7月9日現在)

地点	2021年予測日 ²⁾	(平年比)	平年値	観測地点の概要
横浜市中区	7/20	(並)	7/20	横浜地方気象台
海老名市中新田	7/21	(並)	7/20	アメダス
小田原市扇町	7/24	(並)	7/23	アメダス
藤沢市辻堂	7/22	(並)	7/22	アメダス
平塚市寺田縄	7/19	(並)	7/20	農業技術センター水田ほ場
厚木市七沢	7/24	(並)	7/26	自然環境保全センター
県平均(6地点平均)	7/22	(並)	7/22	

z:5月5日を越冬世代の蛹化最盛日(平成12年度神奈川県農林水産関係試験成績成果資料)とし、有効積算温度684.94日度に到達した日を予測日とした(江村・内藤 埼玉農試研究報告第43号:36-43(1988))。

病害虫防除部 TEL 0463-58-0333

インターネット <http://www.pref.kanagawa.jp/docs/cf7/cnt/f450002/>

○ 農薬使用の際は、必ずラベルの記載事項を確認し、使用基準を遵守するとともに飛散防止に努めましょう。