

平成 2 8 年度

病害虫発生予察注意報(第 1 号)

平成 2 8 年 6 月 3 0 日
神奈川県農業技術センター

病害虫名：ハスモンヨトウ

作物名：野菜類、花き類

- 1 発生地域：県内全域
- 2 発生量：多
- 3 注意報発令の根拠

- (1) 当センター病害虫防除部で横浜市神奈川区、三浦市初声町、伊勢原市下谷に設置しているフェロモントラップへの雄成虫誘殺数は6月第2半旬から平年を上回り、6月第3半旬から急激に増加している(図参照)。6月第1～5半旬の雄成虫誘殺数は、横浜市神奈川区、三浦市初声町のフェロモントラップでは過去25年間で最も多く、伊勢原市下谷のフェロモントラップでもトラップ設置以来8年間で最も多い。
- (2) 当センター生産環境部および三浦半島地区事務所が所内に設置しているフェロモントラップへの雄成虫誘殺数も平年に比べ多い。
- (3) 向こう1か月の気象予報によると、気温は平年より高く、今後も本種の発生に好適な条件が続くと予想される。




図 フェロモントラップへのハスモンヨトウ雄成虫誘殺数

4 防除対策

- (1) 中～老齢幼虫に対する薬剤の防除効果は低い場合が多いので、体長1cm位までの若齢幼虫を対象に早期防除に努める(写真参照)。
- (2) 若齢幼虫は葉裏に群生していることが多いので、薬剤散布は薬液が葉裏や株元にも届くよう丁寧に行う。
- (3) 薬剤抵抗性を発達させないため、同じ系統の薬剤は連用せず、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。なお、防除の際は必ずラベルの記載事項を確認し、使用基準を遵守する。



(写真1：ハスモンヨトウ孵化直後)



(写真2：ハスモンヨトウ若齢幼虫)

神奈川県農業技術センター
病虫害防除部

〒259-1204 平塚市上吉沢1617

TEL 0463-58-0333

FAX 0463-59-7411

<http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f450002/>