

# 防除情報

(病害虫情報 号外 第3号)

平成25年5月23日  
神奈川県農業技術センター所長

病害虫防除部 TEL 0463-58-0333  
テレフォンサービス TEL 0463-58-6612

※ テレフォンサービスは、平成26年5月末で終了します。

インターネット <http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f450002/>  
\*農薬に関する情報は、平成25年5月15日までの農薬登録情報に基づいて記載しています。


山北町や松田町、秦野市における茶のクワシロカイガラムシの防除適期は5月下旬～6月上旬です。  
クワシロカイガラムシが発生しているほ場では、必ず防除を行いましょう。

農業技術センター足柄地区事務所の調査では、県内各地の茶園で卵から幼虫へのふ化が進んでいます。

標高が200mより高い地域の茶園では、これからが防除適期となります。表1、図1を参考に、ふ化最盛日の2日後から5日後までに防除を行うようにしてください。

表1 地点・標高別第1世代ふ化最盛予測日<sup>1)</sup> (標高：m 平成25年5月23日現在)

予測基準地点名	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380
① 相模原市緑区寸沢嵐	5/18	5/19	5/20	5/20	5/21	5/22	5/22	5/23	5/24	5/25
② 厚木市七沢	5/20	5/21	5/22	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28
③ 海老名市本郷	5/19	5/20	5/21	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27
④ 平塚市上吉沢	5/19	5/20	5/21	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27
⑤ 山北町皆瀬川	5/19	5/20	5/21	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27
⑥ 山北町谷ヶ <sup>2)</sup>	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29
⑦ 南足柄市塚原 <sup>2)</sup>	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	6/2
⑧ 小田原市扇町	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30
⑨ 小田原市根府川	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/31



予測基準地点名	400	420	440	460	480	500	520	540
① 相模原市緑区寸沢嵐	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	6/2
② 厚木市七沢	5/29	5/30	5/31	6/1	6/3	6/4	6/5	6/6
③ 海老名市本郷	5/28	5/29	5/30	5/31	6/2	6/3	6/4	6/5
④ 平塚市上吉沢	5/28	5/29	5/30	6/1	6/2	6/3	6/5	6/6
⑤ 山北町皆瀬川	5/28	5/30	5/31	6/1	6/2	6/4	6/5	6/6
⑥ 山北町谷ヶ <sup>2)</sup>	5/31	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7
⑦ 南足柄市塚原 <sup>2)</sup>	6/3	6/4	6/5	6/6	6/6	6/7	6/8	6/9
⑧ 小田原市扇町	5/31	6/1	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8
⑨ 小田原市根府川	6/1	6/2	6/3	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9

1) ふ化時期に降雨が続く場合は、実際のふ化最盛日が予測日より遅れることがあります。

2) 最終温度調査日：⑥・⑦は5/20まで。その他は5/22まで。

[主な防除薬剤]

薬剤名	希釈倍率等	使用時期及び回数
アルバリン粒剤	12kg/10a	7日, 2回
スタークル粒剤	12kg/10a	7日, 2回
アプロード水和剤	1000倍	14日, 2回
アプロードエースフロアブル	1000倍	21日, 1回
カルホス乳剤	1500倍	21日, 1回
スプラサイド乳剤40	1000～1500倍	14日, 1回
ダズバン乳剤40	1000倍	14日, 2回
コルト顆粒水和剤	2000～3000倍	7日, 2回